

Kąpiele borowinowe w domu.

MATTONIEGO
WYCIĄGI BOROWINOWE
SOL BOROWINOWA.
ŁUG BOROWINOWY.

Jedyny sposób
do zastąpienia mineralnych
borowinowych kąpiel
łatwo i dogodnie
w domu i w każdej porze roku.

HENRYK MATTONI

Francensbad, Karlsbad,
WIEDEN, Tschlauben, Mattonihof, BUDAPESZT.

W Niemczech nieulegają wyciągi borowinowe
oceleniu.

Paczka $\left. \begin{matrix} (50 \text{ Pf. Porto}) \\ (30 \text{ kr. } ") \end{matrix} \right\}$ zawiera 4 skrzyneczki po 1 kil.
solu borowinowej.

MATTONI's

GISSHÜBLER

reinsten
alkalischer
SAUERBRUNN

Zdrojowisko uznane od wieków jako skuteczne w chorobach dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, w dnie, niezycie żołądka i pęcherza. — Nadaje się szczególnie dla dzieci, rekonwalescentów i pośród ciąży.

HENRYK MATTONI

Giesshübl-Puchstein

koło Karlsbadu (w Czechach)

Wiedeń, Francensbad, Budapeszt.

Mattoniego zdrojowisko

Giesshübl-Puchstein

koło Karlsbadu w Czechach.

Zdrojowisko i zakład wodoleczniczy.

Leczenie pneumatyczne i zapomocą wzięwań.

Dla chorób nerwowych i piersiowych, ozdrowieńców w nieżytych, gościu i t. d.

Najstrawniejsza
ze wszystkich wód zawierających arsen i żelazo
Naturalna mineralna

Woda Gubera
zawierająca
żelazo i arsen
ze Srebrenicy w Bośni

Według analizy, którą przeprowadził c. k.
z. a. prof. chemii lekarskiej radca dworu
Dr Ernest Ludwig, zawiera owa mineralna
woda na 10.000 części.

bezwodnika kwasu arsenowego 0.061
siarkanu żelazawego 3.734

Wylączne prawo rozsyłki posiadają firmy:

HENRYK MATTONI

Francensbad, Wiedeń, Kalrsbad, Budapeszt.

W Niemczech nieulegają wody mineralne
oceleniu.

Paczka (50 Pf. Porto)
(30 kr. „) zawiera 6 flaszek wody
źródła Gubera.

ŻEGIESTÓW

Zakład zdrojowo-kąpielowy nad Popradem

miejscowość odsłonięta tylko od południa, wyniesiona 486 mtr.
nad poziom morza.

Stacya kolei żelaznej, poczta i telegraf w miejscu.

Najsilniejsza szczawa żelazista,
kąpiele borowinowe, mineralne, popradowe i hydro-
patyczne, znakomita górska stacya klimatyczna,
mleko, żentyca.

Pora kąpielowa trwa od 20 Maja do końca Września.

Wskazania lecznicze:

Zboczenia w odżywieniu i przemianie pierwiastków,
choroby układu nerwowego, dróg oddechowych,
przewodu pokarmowego, narządu moczopłciowego,
choroby kobiece, przewłoczne zatrucia (Rtęć, alko-
holizm, morfinizm), przewłoczne choroby zakaźne.

**Woda Żegiestowska przyjemna jako na-
pój zastępuje Francensbadską**


jest do nabycia we wszystkich składach wód mine-
ralnych i aptekach tak w Galicyi, jak i w Kró-
lestwie Polskiem.

Wysyłka rozpoczyna się z dniem 15 Marca i trwa aż do zimy.

Skrzynia zawierająca 40 flaszek kosztuje na dworcu
w Żegiestowie 7 Złr. 50 ct., skrzynia o 20 flasz. 4 Złr.

Woda Żegiestowska zawiera w 1000 częściach:

Dwuwęglanu litowego	0,0244
» wapniowego	1,5828
» żelazowego	0,0544
Kwasu węglowego istotnie wolnego	2,9961

 **Wszelkich bliższych wyjaśnień udziela na
żądanie Zarząd Zakładu.**

ZAKŁAD

zdrojowo-klimatyczny

W SZCZAWNICY

poleca się gorąco

obywatelskiemu poparciu PT. Panów
Lekarzy z ordynacją wód ze źródeł

Józefiny i Magdaleny

silniejszych od tego rodzaju szczaw
alkaliczno sodowo-słonawych zagra-
nicznych, jak wody Emskie, Gleichen-
bergskie, a zwłaszcza Selterska i
Giesshübelska.

Dzierżawca i zarządca

Feliks Wiśniewski.

KALENDARZ LEKARSKI

KRAKOWSKI

NA ROK

1896.

Na wezwanie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

ułożył

Dr Jan Raczyński.



W KRAKOWIE,

NAKŁADEM KSIĘGARNI K. S. KRZYŻANOWSKIEGO.

1896.

SPIŚ RZECZY.

Kalendarz kościelny.	Str.
Skorowidz do podręcznika terapeutycznego.	
Spis środków lekarskich, zawartych w podręczniku terap.	
Podręcznik terapeutyczny I—IX	1—128
Rozbiór chemiczny moczu	129
Otrucia ostre i sposób ratowania w tychże	133
Tablica brzemiennosci	140
Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich	141
Szkodliwe połączenia leków	142
Warunki przyjmowania chorych obłąkanych do zakładów publicznych lub krajowych	143
Spis środków lekarskich officynalnych i ważniejszych nie-officynalnych	145
Wiadomości zawodowe	201
Poszukiwanie prątków gruźliczych	225
„ „ błoniczych	226
O stosowaniu surowicy przeciwbłoniczej	227
Uwagi sądowo-lekarskie	229
Uwagi o oględzinach i sekcji sądowej zwłok	231
Ważniejsze kraj. i zagraniczne zakłady	234
Naczelne władze sanitarne	255
Władze sanitarne w Galicyi	255
C. k. krajowa Rada zdrowia	256
Izby lekarskie	257
Służba zdrowia w Galicyi	259
Spis alfabetyczny lekarzy	275
Alfabetyczny spis chirurgów	282
Ogólne przepisy pocztowe	284
Poradnik telegraficzny	287
Skala stemplowa	288
Notatki (4 kwartalniki w osobnych książkach)	

42879

Biblioteka Jagiellońska



1003120817

W KRAKOWIE.

W DRUKARNI „CZASU“ FR. KLUCZYCKIEGO I SPÓŁKI
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.



Styczeń.

Janwar.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Nowy Rok. Mieczysława	20 Ihnatia jep. mucz.
2 C.	Makarego i Martyn.	21 Julianyi mucz.
3 P.	Daniela m. i Genowefy p.	22 Anastazyia mucz.
4 S.	Tytusa i Eugeniusza	23 Muczen. 10 w Kry.
5 N.	2 po Boż. Nar. Emiliana p.	24 N. 4 Adw. Wigil. do Rożdest.
6 P.	Trzech Króli	25 Rożdest. Chryst.
7 W.	Juliana i Lucyana mm. ☾	26 Sobor Pr. Bohor.
8 S.	Seweryna i Maksyma b.	27 Stefana mucz.
9 C.	Mareyanny panny m.	28 20 tysiacz. Muczen.
10 P.	Wilhelma b. i Jana Dobr.	29 14 tysiacz. ubit. Mład.
11 S.	Higiniusza b. i Leone.	30 Anysyi prepod.
12 N.	1 po 3 Kr. Honoraty p.	31 N. 1 p. R. Melanyi Rymianki
13 P.	Hilarego bisk. i Gotfryda	1 Janwar. Obr. Hospod.
14 W.	Feliksa męcz. ☼	2 Sylwestra papy Rym.
15 S.	Pawła 1 púst. i Maura	3 Małachia proroka
16 C.	Marcellego p. i Ottona w.	4 Sobor 70 apost.
17 P.	Antoniego op. wyzn.	5 <i>Wig. do Bohojawlenia</i>
18 S.	Kat. ś. Piotra w Rz.	6 Bohójawlenie Hospod.
19 N.	2 po 3 Kr. Imię Jezusa	7 N. 1 po B. Sobor S. Joanna
20 P.	Fabiana i Sebastjana m.	8 Heorhia prep.
21 W.	Agnieszki panny męcz.	9 Połyjewkta mucz.
22 S.	Wincentego i Anastaz.	10 Hryhoria jepisk.
23 C.	Zaślubien. N. Maryi P. ☾	11 Fteodosya prepod.
24 P.	Tymoteusza bisk. m.	12 Tatyanny mucz.
25 S.	Nawrócenie św. Pawła	13 Jermyła mucz.
26 N.	3 po 3 Kr. Batyldy i Pauli	14 N. 2 po B. SS. Otec w Synai
27 P.	Jana Złotoustego b. w.	15 Pawła Ftyweysk.
28 W.	Karola W. i Walerego b.	16 Petra Weryhy
29 S.	Franciszka Sal. i Sabin.	17 Antonyia Welykaho
30 C.	Hiacynty i Martyny p. ☼	18 Aftanasya i Kyryła
31 P.	Ludwiki i Albertonii wd.	19 Makarya prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

16 — 1 **Schebat.**

30 — 15 Dzień radości.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 7 g. 4 m. 24 popoł.

☾ dnia 23 g. 3 m. 42 rano.

☼ dnia 14 g. 11 m. 19 wiecz.

☼ dnia 30 g. 9 m. 55 rano.

Luty.

Fewrał.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	<i>Wigil.</i> Ignacego bisk.	20	Jeuftymya Welykaho
2 N.	4 Staroz. Oczyszcz. NMP.	21	N. 3 po B. Maxyma prep.
3 P.	Błażeja bisk. męcz.	22	Tymoftea apost.
4 W.	Weroniki panny.	23	Kłymenta jepisk.
5 S.	Agaty panny męcz.	24	Xenyi prepod.
6 C.	Doroty panny męcz. ☾	25	Hryhorya bohosił.
7 P.	Romualda opata	26	Xenofonta prepod.
8 S.	Jana z Mathy	27	Joanna Złatoust.
9 N.	5 Mięsop. Apolonii p.	28	N. 4 po B. Jefrema prepod.
10 P.	Scholastyki i Sylwiana	29	Ihnatia jepisk. mucz.
11 W.	Hipolita i Eufrozyny	30	Tryech Swiatytel.
12 S.	Modesta m. i Eulalii p.	31	Kyra i Joanna mucz.
13 C.	Juliana i Katarzyny R. ☼	1	Fewrał. Tryfona mucz.
14 P.	Walentego kapł. męcz.	2	Strytenye Hospod.
15 S.	Faustyna i Jowity mm.	3	Symeona bohopr.
16 N.	6 Zapustna. Julianny p.	4	N. Syrop. Isydora prepod.
17 P.	Sabina bisk. i Sylwina	5	<i>Post Wel.</i> Ahaftyi mucz.
18 W.	Symeona i Konstancyi p.	6	Wukola prepod.
19 S.	<i>Popielec.</i> Konrada w.	7	Parftenya prepod.
20 C.	Leona p. i Zenobiusza	8	Fteodora mucz.
21 P.	Eleonory panny ☾	9	Nykyfora mucz.
22 S.	Katedry ś. Piotra w Ant.	10	Charałampia mucz.
23 N.	1 Wstępna. Florentego	11	1 Wstupna. Własya jep. m.
24 P.	Eberharda wyzn.	12	Mełetya archiep.
25 W.	<i>Macieja apostola</i>	13	Martyniana prepod.
26 S.	<i>Such.</i> Wiktoryna męcz.	14	Auxentia prepod.
27 C.	Aleksandra b. i Nestora	15	Onysyma apost.
28 P.	<i>Such.</i> Anastazyi panny ☼	16	Pamfyla mucz.
29 S.	<i>Such.</i> Romana opata	17	Fteodora mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

15 — 1 Adar.	28 — 14 Purim.
21 — 7 Śmierć Mojżesza.	29 — 15 Schuschan-Purim.
27 — 13 Post. Estery.	

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 6 g. 1 m. 38 rano.	☾ dnia 21 g. 10 m. 14 wiecz.
☼ dnia 13 g. 5 m. 12 wiecz.	☼ dnia 28 g. 8 m. 51 wiecz.

Marzec.

Mart.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 N.	2 Sucha. Albina i Anton.	18 N. 2 Postu. Lwa Papy R.
2 P.	Heleny ces. i Amalii	19 Archyppa apost.
3 W.	Kunegundy c. i Tycyana	20 Lwa episk.
4 S.	Kazimierza król. pol.	21 Tymoftea prepod.
5 C.	Fryderyka opata	22 SS. MM. w Ewhen.
6 P.	Kolety p. i Maryana b. ☉	23 Polykarpa jep. mucz.
7 S.	Tomasza z Akwinu	24 Obr. Gławy Joanna Kre.
8 N.	3 Głucha. Jana Bożego	25 N. 3 Postu. Tarasia archiep.
9 P.	Franciszki Rzym. wd.	26 Porfiryra prep.
10 W.	40 Męczenników	27 Prokopia archiep.
11 S.	Konstantego Wielk.	28 Wasyliya prep.
12 C.	Grzegorza Wielk. pap.	29 Kasyana Sergia
13 P.	Krystyny panny	1 Mart. Jewdoki mucz.
14 S.	Zacharyasza i Matyldy ☽	2 Fteodota mucz.
15 N.	4 Srodop. Izabelli i Leone.	3 N. 4 Postu. Jewtropia m.
16 P.	Cyryaka dyakona	4 Harasyrna prepod.
17 W.	Gertrudy p. i Patrycego	5 Konona mucz.
18 S.	Aleksandra i Edwarda	6 SS. 42 męczenników
19 C.	<i>Józefa obłubieńca NMP.</i>	7 Wasyliya mucz.
20 P.	Eufemii i Teodozyi mm.	8 Fteofylakta mucz.
21 S.	Benedykta opata w.	9 SS. 40 Męczenników
22 N.	5 Biała. Katarzyny kr. ☾	10 N. 5 Postu. Kondrata mucz.
23 P.	Wiktoryana i Oktawiana	11 Sofronia prepod.
24 W.	<i>Wigil.</i> Gabryela archan.	12 Fteofana prepod.
25 S.	Zwiastowanie N. Maryi P.	13 Nikyfora patryar.
26 C.	Teodora biskupa	14 Wenedykta prepod.
27 P.	<i>7 Bol. NP.</i> Jana pusteln.	15 Ahapia mucz.
28 S.	Sykstusa pap. wyzn.	16 Sawyna mucz.
29 N.	6 Kwietnia. Eustazego ☽	17 N. 6 Postu. Alexia prepod.
30 P.	Kwiryna m. i Zozyma	18 Kyrylla archiep.
31 W.	Balbiny i Kornelii pp.	19 Chrysanfta mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

15 — 1 Nisan.	30 — 16 Drugie św. Paschy.
28 — 14 Przeddzień do Paschy.	31 — 17 Półświęta.
29 — 15 Święto Paschy.	

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 6 g. 12 m. 29 popoł.	☾ dnia 22 g. 12 m. 56 popoł.
☽ dnia 14 g. 11 m. 47 rano.	☽ dnia 29 g. 6 m. 21 rano.

Kwiecień.

Apriel.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Hugona bisk. i Teodory	20 Pr. Otec. w Ob. S.
2 C.	<i>Wiecz. Pańska</i> Franciszk.	21 Jakowa prepod.
3 P.	<i>Wielki.</i> Pankracego	22 Piatok wełyki. Wasylija jep.
4 S.	<i>Wielka.</i> Izydora bisk. w.	23 Nykona prepod.
5 N.	Wielk. Zmartw. Wincent. ☾	24 N. Woskresenye. Zacharyi
6 P.	P. Wielkan. Celestyna p.	25 Pon. swiaty. Błahowiszcze
7 W.	Epifaniasza męcz.	26 Wt. swiaty. Sobor Hawryła
8 S.	Dyonizego bisk. w.	27 Matrony mucz.
9 C.	Maryi Kl., siostry NP.	28 Ilariona prepod.
10 P.	Ezechiela proroka	29 Marka prepod.
11 S.	Leona papieża wyzn.	30 Joanna Listwycz.
12 N.	1 Przew. Juliusza pap.	31 N. 1 po W. Ipatya jepisk.
13 P.	Justyna męcz. i Idy p. ☾	1 Apriel. Maryi Jehyp.
14 W.	Waleryana i Maksyma	2 Tyta prepod.
15 S.	Ludwiny i Kasyldy pp.	3 Nykyty prepod.
16 C.	Lamberta męcz.	4 Josyfa prepod.
17 P.	Rudolfa bisk. męcz.	5 Fteodula mucz.
18 S.	Apoloniusza męcz.	6 Jewtychia jepisk.
19 N.	2 po W. Grobu Jez. Jerzego	7 N. 2 po W. Heorhia prep.
20 P.	Agnieszki z Pol. ☾	8 Irodiona apost.
21 W.	Anzelma bisk. wyzn.	9 Jewpsyhia jepisk.
22 S.	Sotera i Kaja męcz.	10 Terentia mucz.
23 C.	<i>Wojciecha arcybiskupa</i>	11 Antypy jepiskopa
24 P.	Jerzego m. i Saby żołn.	12 Wasylija prepod.
25 S.	Marka ewangelisty	13 Artemona jepisk.
26 N.	3 po W. Opieki ś. Józefa	14 N. 3 po W. Martyna papy.
27 P.	Anastazego p. i Teofila ☾	15 Arystarcha apost.
28 W.	Witalisa i Waleryi mm.	16 Ahapii mucz.
29 S.	Piotra męczennika	17 Symeona prepod.
30 C.	Katarzyny Sen. panny	18 Joanna prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 18 Półświęta.	14 — 1 Ijar.
2 — 19 " "	20 — 7 Post.
3 — 20 " "	23 — 10 Post.
4 — 21 Siódme święto.	27 — 14 Passah-Scheni.
5 — 22 Koniec Paschy.	

ODMIANY KSJĘŻYCA.

☾ dnia 5 g. 1 m. 24 rano.	☾ dnia 20 g. 11 m. 46 rano.
☾ dnia 13 g. 5 m. 22 rano.	☾ dnia 27 g. 2 m. 47 popoł.

Maj.

Maj.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA BUSKIE.
1 P.	<i>Filipa i Jakóba apost.</i>	19	Joanna prepod.
2 S.	Zygmunta i Atanaz.	20	Fteodora prepod.
3 N.	4 po W. <i>Znalez. ś. Krzyża</i>	21	N. 4 po W. Januaria mucz.
4 P.	Floryana m. i Moniki ☉	22	Fteodora Sykeota
5 W.	Gotarda b. i Fiusa V. p.	23	Heorhia mucz.
6 S.	Jana w oleju i Benedykty	24	Sawwy mucz.
7 C.	Flawii i Domicelli pp.	25	Marka Apost.
8 P.	Stanisława bisk. Krak. m.	26	Wasylyia mucz.
9 S.	Grzegorza N. i Dyzmy	27	Symeona jep. mucz.
10 N.	5 po W. † <i>NP. Łaskawej</i>	28	N. 5 po W. Jasona apost.
11 P.	Beatryksy panny	29	Dewiat muczennikow
12 W.	† Nereusza i Pankrac. ☉	30	Jakowa proroka
13 S.	† Hilarego i Serwacego	1	Mai. Jeremia proroka
14 C.	Wniebowst. P. Bonifacego	2	Wozn. Hosp. Aftanasya Weł.
15 P.	Zofii i trzech jej córek	3	Tymoftea mucz.
16 S.	Jana Nep. i Ubalda b.	4	Pelahyi mucz.
17 N.	6 po W. Paschalisa w.	5	N. 6 po W. Iryny mucz.
18 P.	Feliksa kapuc. i Eryka	6	Jowa Prawednaho
19 W.	Piotra Celest. i Pudenc.	7	Wospom. Kresta
20 S.	Bernardyna Sen. w. ☉	8	Joanna Bohoś.
21 C.	Heleny królowej	9	Pren. M. Nykoł.
22 P.	Julii panny męcz.	10	Symona Apost.
23 S.	<i>Wigil.</i> Dezyderyusza b.	11	Mokia mucz.
24 N.	Zesł. Ducha ś. Joanny wd.	12	N. Sosz. S. Ducha. Jepyfania
25 P.	Świąteczny. Urbana p.	13	SSS. Trojcy. Hlykeryi m.
26 W.	Filipa Nereusza w. ☉	14	Isydora mucz.
27 S.	<i>Such.</i> Jana pap. męcz.	15	Pachomya Weł.
28 C.	Maryi-Magdaleny dē Pa.	16	Fteodora prepod.
29 P.	<i>Such.</i> Maksyma i Teodoz.	17	Andronika apost.
30 S.	<i>Such.</i> Feliksa pap. w.	18	Fteodora prepod.
31 N.	1 po S. SSS. Trójcy. Petr.	19	N. 1 po S. Patrykia jepisk.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 18	Święto szkolne.	18 — 6	Zielone Święto.
13 — 1	Sivan.	19 — 7	Drugie święto.
17 — 5	Przeddz. Ziel. Świąt.		

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 4 g. 4 m. 25 popoł.	☾ dnia 20 g. 7 m. 21 rano.
☿ dnia 12 g. 8 m. 46 wiecz.	☿ dnia 26 g. 10 m. 56 wiecz.

Czerwiec.

Ijun.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Nikodema męcz.	20 Ftałatea męcz.
2 W.	Eugeniusza p. i Erazma	21 Konstantyna i Jeleny
3 S.	Klotyldy król. i Pauli	22 Wasyliya męcz.
4 C.	Boże Ciało. Saturniny	23 Tyło Chryst. Michaiła prep.
5 P.	Florenceyi panny	24 Symeona prepod.
6 S.	Norberta i Klaudyusza	25 Tretye Obritenyie Hła.
7 N.	2 po S. Roberta i Sabiny	26 N. 2 po S. <i>Post do Petra.</i> Karp.
8 P.	Medarda bisk. wyzn.	27 Fteraponta jep.
9 W.	Felicyana męcz.	28 Nykyty prepod.
10 S.	Małgorzaty król. p.	29 Fteodosyi męcz.
11 C.	Barnaby apostoła	30 Isaaka prepod.
12 P.	<i>Serca Jezus.</i> Onufrego w.	31 Jermia apost.
13 S.	Antoniego z Padwy w.	1 Ijun. Justyna męcz.
14 N.	3 po S. Bazylego W. bisk.	2 N. 3 po S. Nykyfora patr.
15 P.	Wita i Modesta mm.	3 Łukifyana męcz.
16 W.	Justyny p. i Benona w.	4 Mytrofana patryarchy
17 S.	Adolfa b. i Marcyana m.	5 Doroftea jep. m.
18 C.	Marka i Marcelina mm.	6 Wyssariona prepod.
19 P.	Gerwazego i Protaz. m.	7 Fteodora jepisk.
20 S.	Reginy i Florentyny pp.	8 Fteodora męcz.
21 N.	4 po S. Alojzego Gonz.	9 N. 4 po S. Kyrylla arch.
22 P.	Paulina i Konsoreyi	10 Tymoftea jep. męcz.
23 W.	Agrypiny i Wandy pp.	11 Warftołomea apost.
24 S.	<i>Narodzenie św. Jana</i>	12 Onufrya prepod.
25 C.	Wilhelma w. i Łucyi p.	13 Akityny męcz.
26 P.	Jana i Pawła braci m.	14 Jelyssea proroka
27 S.	<i>Wigilia.</i> Władysława kr.	15 Amosa proroka
28 N.	5 po S. Leona pap.	16 N. 5 po S. Tychona prep.
29 P.	Piotra i Pawła apostołów	17 Manuiła męcz.
30 W.	Emilii i Lucyny mm.	18 Leontia męcz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

12 — 1 **Thamuz.**

28 — 17 Tekufah.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

dnia 3 g. 9 m. 2 rano.

dnia 18 g. 12 m. 40 popoł.

dnia 11 g. 9 m. 42 rano.

dnia 25 g. 7 m. 54 rano.

Lipiec.

Ijuł.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Teobalda op. i Aarona	19 Judy Ftad. apost.
2 C.	<i>Nawiedz. NMP.</i> i Eugen.	20 Meftodia jepiskopa
3 P.	Alfreda i Anatolego b. ☾	21 Jułyana mucz.
4 S.	Józefa Kalas. i Prokopa	22 Jewsewya jep. mucz.
5 N.	6 po S. Cyrylla i Metod.	23 N. 6 po S. Ahrypiny mucz.
6 P.	Izajasza i Dominiki	24 Rozdest S. Joanna Krest.
7 W.	Estery kr. i Klaudysza	25 Fewronyi prepod.
8 S.	Elżbiety królowej wd.	26 Dawyda prepod.
9 C.	Cyrylla b. i Anatolii	27 Sampsona prepod.
10 P.	Amalii p. i 7 braci m. ☉	28 Kyra i Joanna
11 S.	Pelagii, Sabina i Norb.	29 Petra i Pawła Apost.
12 N.	7 po S. Jana z Dukli	30 N. 7 po S. SS. Apost. 12.
13 P.	Małgorzaty panny m.	1 Ijuł. Kosmy i Dam.
14 W.	Bonawentury dra w.	2 Położ. Ryzy. Preś. Boh.
15 S.	Rozesł. Ap. i Henryka	3 Jakynfta mucz.
16 C.	<i>NP. Szkapł.</i> i Rajnolda m.	4 Andreia archiepisk.
17 P.	Aleksego w. i Berty p. ☾	5 Aftanasia Afron.
18 S.	Szymona z Lipnicy w.	6 Sysoa prepod.
19 N.	8 po S. Wincentego a P.	7 N. 8 po S. Ftomy prepod.
20 P.	Czesława i Kassyana	8 Prokopya mucz.
21 W.	Daniela prór. i Praksedy	9 Pankratya jep. mucz.
22 S.	Maryi - Magdaleny	10 45 Muczen.
23 C.	Teoфіła m. i Apolinarego	11 Jewfymyi mucz.
24 P.	Krystyny panny męcz. ☾	12 Prokta mucz.
25 S.	<i>Jakóba ap.</i> i Krzysztofa	13 Hawryła archan.
26 N.	9 po S. Kunegundy i <i>Anny</i>	14 N. 9 po S. Akyły apost.
27 P.	Natalii i Liliozy pp.	15 Kyrika mucz.
28 W.	Innocentego i Wiktora	16 Aftynohema jepisk.
29 S.	Marty gosp. p. i Lucylli	17 Maryny mucz.
30 C.	Julitty p. i Heleny wd.	18 Jemyłyana mucz.
31 P.	Ignacego Lojoli wyzn.	19 Makryny prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

11 — 1 **Ab.**

7 — 26 Tekufah.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 3 g. 2 m. 23 rano.

☾ dnia 17 g. 5 m. 4 popoł.

☉ dnia 10 g. 8 m. 34 popoł.

☾ dnia 24 g. 6 m. 45 popoł.

Sierpień.

Awhust.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Piotra w Okowach m. ☾	20 Ryi proroka
2 N.	10 po S. NMP. Anielskiej	21 N. 10 po S. Symeona prep.
3 P.	Znalez. ś. Szczepana	22 Maryi Mahdałyny
4 W.	Dominika wyzn.	23 Trofyma mucz.
5 S.	N. Maryi P. Śnieżnej	24 Chrystyny mucz.
6 C.	Przemienienie Pańskie	25 Uspen. S. Anny
7 P.	Kajetana w. i Alberta	26 Jermolaja mucz.
8 S.	Cyryaka i Maryana m.	27 Pantaleimona mucz.
9 N.	11 po S. Kamilla z Lel. ☾	28 N. 11 po S. Prochora apost.
10 P.	Wawrzyńca i Filomeny	29 Kałynyka mucz.
11 W.	Zuzanny panny męcz.	30 Syły apost.
12 S.	Klary i Hilaryi pp.	31 Zapust do Uspenya
13 C.	Hipolita m. i Kassyana	1 Awhust. Proischozd. kr.
14 P.	Wigilia. Euzebiusza m.	2 Stefana mucz.
15 S.	Wniebowzięcie N. M. P. ☾	3 Isaaka prepod.
16 N.	12 po S. Jacka i Rocha w.	4 N. 12 po S. Sedny Otrokow
17 P.	Anastazego b. i Mirona	5 Jewsychnya mucz.
18 W.	Heleny Szwedzkiej m.	6 Preobraż. Hospoda.
19 S.	Benigny p. i Sebalda w.	7 Demetrya prepod.
20 C.	Bernarda i Samuela	8 Jemetyana jepisk.
21 P.	Joanny Fremiot wdowy	9 Matfya apost.
22 S.	Symforyana i Tymot.	10 Ławrentya mucz.
23 N.	13 po S. Zacharyasza ☾	11 N. 13 po S. Jewpła mucz.
24 P.	Bartłomieja apostoła	12 Fotya mucz.
25 W.	Ludwika króla franc.	13 Maxyma prepod.
26 S.	Aleksandra m. i Zefryna	14 Michea proroka
27 C.	Róży i Przen. ś. Kazim.	15 Uspenye Pr. Bohorodycy
28 P.	Augustyna biskupa	16 Nerukotworen. Obraz.
29 S.	Ścięcie ś. Jana i Sabina	17 Myrona mucz.
30 N.	14 po S. Poc. NP. Feliksa	18 N. 14 po S. Flora i Ławra
31 P.	Rajmunda wyzn. ☾	19 Andrea mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

10 — 1 Elul.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 1 g. 7 m. 34 popoł.

☾ dnia 9 g. 6 m. 2 rano.

☾ dnia 15 g. 10 m. 2 wiecz.

☾ dnia 23 g. 8 m. 4 rano.

☾ dnia 31 g. 11 m. 55 rano.

Wrzesień.

Sentiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 W.	Idziego opata wyzn.	20 Samuila proroka
2 S.	Stefana kr. i Kaliksty m.	21 Ftaddea apost.
3 C.	Eufemii i Bronisławy	22 Ahaftonyka mucz.
4 P.	Rozalii panny	23 Łuppa mucz.
5 S.	Wawrzyńca i Urbana p.	24 Jewtychia mucz.
6 N.	15 po S. Joach. i Zachar.	25 N. 15 po S. Warfłomea ap.
7 P.	<i>Wigilia.</i> Reginy p. m. ☉	26 Adryana m. i Natalii m.
8 W.	Narodzenie N. Maryi Panny	27 Pimena prepod.
9 S.	Gorgoniego i Sergiusza	28 Moysea muryna
10 C.	Mikołaja z Tolent. w.	29 Usikn. Gławy S. Joanna
11 P.	Prota, Jacka i Teodory	30 Alexandra patriyar.
12 S.	Tobiasza w. i Gwidona	31 Położ. Poiasz. P. Bohor.
13 N.	16 po S. Im. NMP. Aurel.	1 Sentiabr. N. 16 po S. Sym.
14 P.	<i>Podwyższenie ś. Krzyża</i> ☾	2 Mamanta mucz.
15 W.	Nikodema i Emila m.	3 Anftyma mucz.
16 S.	<i>Such.</i> Ludmiły i Edity	4 Wawyły Swiaszcze.
17 C.	Piętna św. Franciszka	5 Zacharyi proroka
18 P.	<i>Such.</i> Józefa z Kopert.	6 Wosp. Cud. S. Mychaila
19 S.	<i>Such.</i> Januarego męcz.	7 Zozonta mucz.
20 N.	17 po S. Eustachego b.	8 N. 17 po S. Roźdestwo Pr. Boh.
21 P.	Mateusza ap. ewang. ☿	9 Joakima i Anny
22 W.	Maurycego i Tomasza	10 Mynodory prepod.
23 S.	Tekli panny męcz.	11 Fteodory prepod.
24 C.	Gerarda bisk. męcz.	12 Awtenoma mucz.
25 P.	Kleof. z Tow. i Aurel.	13 Kornyla mucz.
26 S.	Jozefata b. i Cypryana	14 Wozdwyżenye S. Kresta
27 N.	18 po S. Władysł. z Gieln.	15 N. 18 po S. Nykity mucz.
28 P.	Wacława męcz.	16 Josafata archiep.
29 W.	<i>Michała archaniola</i>	17 Sofii mucz.
30 S.	Hieronima dra wyzn. ☾	18 Jewmenia prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

7 — 29	Przeddz. Now. Roku.	17 — 10	Święto pojednania.
8 — 1	Tischri. Nowy Rok	21 — 14	Przeddz. św. kuczek.
	5657.	22 — 15	Święto kuczek.
9 — 2	Drugie święto.	23 — 16	Drugie św. kuczek.
10 — 3	Post. Gedaljach.	28 — 21	Święto palmowe.
11 — 4	Post.	29 — 22	Koniec kuczek.
16 — 9	Przeddzień św. pojed.	30 — 23	Radość z praw.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 7 g. 2 m. 43 popoł.	☿ dnia 21 g. 11 m. 49 popoł.
☾ dnia 14 g. 5 m. 9 rano.	☾ dnia 30 g. 2 m. 58 rano.

Październik.

Octiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	Remigiego biskupa w.	19	Trofyma mucz.
2 P.	Aniołów Stróżów	20	Jewstafya mucz.
3 S.	Kandyda i Lukrecyi p.	21	Kondrata apost.
4 N.	19 po S. NMP. Różańc.	22	N. 19 po S. Foky mucz.
5 P.	Flawii i Charytyny pp.	23	Zaczat. s. Joanna Krest.
6 W.	Brunona biskupa w. ☉	24	Ftekly mucz.
7 S.	Justyny p. i Helana w.	25	Jewfrosini prepod.
8 C.	Brygidy wd. i Pelagii	26	Joanna Bohosław.
9 P.	Dyonizego Ar. i Publii	27	Kałystrata mucz.
10 S.	Franciszka Borg. w.	28	Charytona prepod.
11 N.	20 po S. Wincent. Kadł.	29	N. 20 po S. Kyryaka prep.
12 P.	Maksymiliana biskupa	30	Hryhorya jep. mucz.
13 W.	Edwarda króla wyzn. ☾	1	Octiabr. Pokr. Pr. Bohor.
14 S.	Kaliksta p. i Fortunaty	2	Kypriana jepisk.
15 C.	Jadwigi, Teresy i Aurel.	3	Dyonysya mucz.
16 P.	Pawła opata wyzn.	4	Jeroftea jepisk. mucz.
17 S.	Florentego i Małgorzaty	5	Charytyny mucz.
18 N.	21 po S. Łukasza Ewang.	6	N. 21 po S. Ftomy apost.
19 P.	Piotra z Alkantary w.	7	Sergia i Wakha
20 W.	Przenies. ś. Wojciecha	8	Pelachii prepod.
21 S.	Urszuli panny męcz. ☿	9	Jakowa apost.
22 C.	Korduli i Alodii pp. m.	10	Jewłampya mucz.
23 P.	Jana Kapistr. i Seweryna	11	Pyłypa apost.
24 S.	Rafała archanioła	12	Prowa mucz.
25 N.	22 po S. Jana Kantego	13	N. 22 po S. Karpa i Papyta
26 P.	Ewarysta pap. i Fulki	14	Nazarya mucz.
27 W.	Iwona w. i Sabiny m.	15	Jewftymya prepod.
28 S.	Szymona i Tadeusza ap.	16	Łonhyna mucz.
29 C.	Narcyza b. i Euzebiei ☾	17	Osyi proroka
30 P.	Marcelego papieża	18	Łuki jew. apost.
31 S.	Wigilia. Wolfganga b.	19	Joiła proroka

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

6 — 29 Tekufah.	15 — 8}	Post.
8 — 1 Marcheschwan.	19 — 12}	
12 — 5 Post.		

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 6 g. 11 m. 18 wiecz.	☿ dnia 21 g. 5 m. 17 popoł.
☾ dnia 13 g. 3 m. 47 popoł.	☾ dnia 29 g. 4 m. 20 popoł.

Listopad.

Nojabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 N.	23 po S. Wszystk. Świętych.	20 N. 23 po S. Artemia mucz.
2 P.	<i>Dzień Zaduszny.</i> Wikt.	21 Hariona prepod.
3 W.	Huberta b. i Sylwii wd.	22 Awerkia jepisk.
4 S.	Karola Borom. i Modesty	23 Jakowa apost.
5 C.	Elżbiety Matki N. M. P. ☽	24 Arefty mucz.
6 P.	Leonarda wyzn.	25 Markiana mucz.
7 S.	Herkulana i Amaranta	26 Demetria mucz.
8 N.	24 po S. Opieki N. M. P.	27 N. 24 po S. Nestora mucz.
9 P.	Teodora żołn. i Ursyna	28 Terentia mucz.
10 W.	Andrzeja z Aw. i Nimfy	29 Anastasyi mucz.
11 S.	Marcina bisk. wyzn.	30 Zynowia mucz.
12 C.	Marcina papieża w. ☾	31 Stachya apost.
13 P.	Homobona i Dydaka	1 Nojabr. Kosmy i Damian.
14 S.	Serafiona m. i Hipacego	2 Josafata Archiep. mucz.
15 N.	25 po S. Stan. K. i Leop.	3 N. 25 po S. Akepsymy m.
16 P.	Edmunda i Pawła	4 Joannyka prepod.
17 W.	Salomei królowej p.	5 Hałaktyona mucz.
18 S.	Pośw. Kośc. Rz. i Grzeg.	6 Pawła archiep.
19 C.	Elżbiety król. i Placydy	7 MM. 33 w Melyty
20 P.	Feliksa de Valois w. ☿	8 Mychajła archan.
21 S.	<i>Ofiarowanie N. Maryi P.</i>	9 Onysyfora mucz.
22 N.	26 po S. Cecylii p. m.	10 N. 26 po S. Szesty apost.
23 P.	Klemensa i Lukrecyi	11 Myny mucz.
24 W.	Jana od Krzyża i Flory	12 Joanna Myłostyw.
25 S.	<i>Katarzyny panny męcz.</i>	13 Joanna Złatoust.
26 C.	Piotra Aleks. i Konrada	14 Pyłypa apost. <i>Zapust.</i>
27 P.	Waleryana bisk. m. ☼	15 Hurya i Samon mucz.
28 S.	Rufina m. i Grzegorza p.	16 Matфеa jewanhel.
29 N.	1 Adw. Saturnina i Illum.	17 N. 27 po S. Hryhoria jep.
30 P.	<i>Andrzeja apostoła</i>	18 Płatona mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

6 — 1 Kislev.	29 — 24 Wzniesienie światła.
25 — 20 Dzień prośby o deszcz.	30 — 25 Pośw. świątyni.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 5 g. 8 m. 27 rano.	☿ dnia 20 g. 11 m. 24 rano.
☾ dnia 12 g. 6 m. 40 rano.	☼ dnia 27 g. 3 m. 43 rano.

Grudzień.

Dekabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 W.	Eligiusza b. i Natalii wd.	19	Awdyja proroka
2 S.	Post. Chryzologa i Aurel.	20	Prokla i Hryhory
3 C.	Franciszka Ksaw. w.	21	Wchod. Pr. Bohorodycy
4 P.	Post. Barbary panny ☉	22	Fylymona apost.
5 S.	Sabby opata wyzn.	23	Amfylochya jepisk.
6 N.	2 Adw. Mikołaja i Leone.	24	N. 28 po S. Jekatyryny m.
7 P.	<i>Wigilia.</i> Ambrożego b.	25	Kłymenta papy
8 W.	Niepok. Pocz. N. Maryi P.	26	Alypya prepod.
9 S.	Post. Leokadyi i Waleryi	27	Jakowa mucz.
10 C.	<i>N. Maryi P. Loretańskiej</i>	28	Stefana mucz.
11 P.	Post. Damazego papieża	29	Paramona mucz.
12 S.	Aleksego i Pawła ☾	30	Andrea apost.
13 N.	3 Adw. Łucyi i Otylii p.	1	Dekabr. N. 1 Adwentu.
14 P.	Nikazego b. i Spiridiona	2	Awwakuma pror.
15 W.	Ireneusza m. i Waler.	3	Sofonia proroka
16 S.	<i>Such.</i> Euzebiusza bisk.	4	Warwary mucz.
17 C.	Łazarza b. i Wiwiny	5	Sawwy Oswiaszcze.
18 P.	<i>Such.</i> Gracyana i Olimpii	6	Nykołaja jepisk.
19 S.	<i>Such.</i> Faustyna i Nemez.	7	Amwrosia jep. medyoł.
20 N.	4 Adw. Teofila męż. ☿	8	N. 2 Adwentu. Patapia prep.
21 P.	<i>Tomasza apostoła</i>	9	Zaczą. Bohoro.
22 W.	Zenona męż.	10	Myny Jermoh mucz.
23 S.	Post. Wiktoryi panny	11	Danyła Stołpny
24 C.	<i>Wigilia.</i> Adama i Ewy	12	Spyridona jepisk.
25 P.	Boże Narodzenie	13	Ewstratia jepisk.
26 S.	Szczepana pierwszego m.	14	Ftyrsa mucz.
27 N.	1 po Boż. N. Jana ew. ☾	15	N. 3 Adwentu. Jelewftesya
28 P.	Młodzianków męż.	16	Ahhea proroka
29 W.	Tomasza Kantuaryjsk.	17	Danyła proroka
30 S.	Dawida kr. i Sabina	18	Sewastyana mucz.
31 C.	Sylwestra p. i Melanii	19	Wonyfatya mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

6 — 1 **Tebeth.**
7 — 2 Koniec pośw. świąt.

15 — 10 Post. Oblęż. Jerozol.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 4 g. 6 m. 51 popoł.

☾ dnia 12 g. 1 m. 29 rano.

☿ dnia 20 g. 5 m. 5 rano.

☾ dnia 27 g. 1 m. 8 popoł.

**Creosot silnie drażniący
trujący!**

tymczasem

Creosotal

(Creosotcarbonat)

**„niedrażniący, nietrujący
Creosot“!**

zawiera 92% Creosot Ph. G. III,
posiada **własności lecznicze kreo-**
sotu, bez działania ubocznego, jest
nietrujący, tak że może być zaży-
wany łyżkami. Obojętny olej, bez
zapachu i własności żrących, pra-
wie bez smaku.

Oдноśną literaturę, sposób uży-
cia i t. d. przesła

Dr. F. v. Heyden Nachfolger,
Radebeul bei Dresden.

Odznaczone medalem brązowym na krajowej Wy-
stawie we Lwowie w 1894 roku.

PIERWSZA PRACOWNIA I SKŁAD
instrumentów chirurgicznych
i maszyn ortopedycznych
pod firmą:

L. Georgeon i J. Trepczyński
we Lwowie, ul. Ruska l. 1.

przyjmuje wszelkie zamówienia w zakres zawodu
tego wchodzące, podejmuje się wszelkich reparacyj
tak narzędzi jak i maszyn ortopedycznych, wyko-
nuje wszelkie roboty tego rodzaju, jakoto: ostrze-
nie, szlifowanie, polerowanie, niklowanie, wypalanie
i t. p. na sposoby zagraniczne, dokładnie i punktu-
alnie po cenach przystępnych.

P. T.

Zawodowa rutyna, doświadczenie i wprawa na-
byte we wielkich fabrykach Leitera, Tuerrigla we
Wiedniu, Schmida w Berlinie, we Wrocławiu i t. d.
pozwalają nam mieć niepłonną nadzieję, że godnie
odpowiemy położonemu w nas zaufaniu a sumienną,
uczciwą i punktualną pracą zjednamy sobie uznanie
i poparcie WW. PP. Lekarzy.

Polecając firmę naszą ogółowi WW. PP. Lekarzy

kreślimy się z należnym szacunkiem

L. Georgeon i J. Trepczyński,
Lwów, ulica Ruska l. 1.

Apteka „pod białym Orłem“

A. SIEDLECKIEGO

W KRAKOWIE.

Telefon Nr 207.

Utrzymuje na składzie wszelkie przetwory lecznicze krajowe i zagraniczne. Pomiędzy niemi własnego wyrobu:

Kołaczyki (tabletki): Sublimatowe rozpuszczalne w zimnej wodzie a 1 i $\frac{1}{2}$ gr. — z Rheum, Kaskary, senesu, antipiryny, guajacolum carbonicum i wiele innych.

Własnego wyrobu **Extractum filicis maris aetherum** zawsze świeże (przesyłanem być może od 10 gr.).

Wina lecznicze wyrabiane na **maladze** i na **Scherry**, Chinowe, Chinowe z żelazem, Condurango Kaskarowe z Rheum. **Wino borówkowe** ważne jako środek przeciwbiegunkowy mający swoje działanie na przewód pokarmowy polecane przez lekarzy krakowskich.


Borogliceryna z lanoliną własnego wyrobu. Środek służący do desinfekcyi rąk i twarzy, i chroniący przed spierzchnięciem. W praktyce położniczej i ginekologicznej, jako maść antyseptyczna do badania rodzącej lub chorej.

Dentol zawierający formalin, najnowszy środek antyseptyczny dla jamy ust i zębów.

Hegary kauczukowe ważne w praktyce położniczej, albowiem można je pomieścić wygodnie w torbie z instrumentami, objętości jednego litra.

Opatrunki chirurgiczne. — Szkiełka mikroskopowe.

Wszelkie zamówienia uskutecznią się odwrotną pocztą.



Optyczny Instytut
C. REICHERT

WIEDEŃ VIII., Bennogasse 24—26.

Mikroskopy, Mikrotomy
Przyrządy polaryzacyjne
Hämometry.

Illustrowane cenniki darmo i oplatnie.

Pierwsza krajowa fabryka
opatrunków chirurgicznych
M. L. Dobrowolskiego
magistra farmacyi,
w **PODGÓRZU**, ulica Kalwaryjska,
Telefon 200

nagrodzona medalem srebrnym na Wystawie krajowej
1887 roku,

premiowana dyplomem honorowym
na Wystawie przyrodniczo-lekarskiej 1888 roku
zostająca pod kontrolą

Komisji Przemysłowej krak. Tow. lekarskiego,
polecona przez

krakowskie Towarzystwo lekarskie,
wyrabia i sterylizuje wszystkie opatrunki
antyseptyczne, a dostarcza je niżej cen
fabryk zagranicznych. Sporządza też nie-
które przetwory farmaceutyczne oraz środki
dezynfekcyjne, jak: **wapno karbolowe, torf
karbolowy i sublimatowy**, a oblicza je przy
hurtownym odbiorze nadzwyczaj tanio.

Cennik przesyła na żądanie.

PP. Aptekarzom, Lekarzom i Zarządcom szpi-
tali przy znacznych stałych odbiorach opa-
trunków robi specjalne niskie oferty.

Fabryka narzędzi chirurgicznych i przyrządów ortopedycznych, opasek

(założona w r. 1840)



H. REINER

Wiedeń

IX., van Sviatengasse 10,
Niederlage: I., Franzensring 22.



Wszystkie w chirurgii i w ogóle w medycynie używane narzędzia i przyrządy potrzebne do pielęgnowania chorych, wreszcie opatrunki w doborowym gatunku, po umiarkowanych cenach.

Wyłączna fabryka Termokauterów Dra Paquelin'a.

Illustrowany cennik, oprawny w płótno, zawierający 1800 rysunków i tekst objaśniający, przesyła za opłatą 3 złr. w. a. Przy zamówieniu powyżej 30 złr. załącza się katalog bezpłatnie.

Na podstawie koncesyi
Wys. c. k. Namiestnictwa we Lwowie
założony

Prywatny Zakład położniczy

i dla chorób kobiecych

Dra Stanisława Brauna

Docenta położnictwa i ginekologii
w Uniwersytecie Jagiell. w Krakowie

przeniesiony na ul. Dietla l. 95

przyjmuje nadal kobiety ciężarne do
odbycia porodu i kobiety dotknięte
chorobami ginekologicznymi.

Bliższych objaśnień udziela właściciel
i kierownik Zakładu

*Doc. Dr St. Braun,
w Krakowie ul. Dietla l. 95.*

Zakład wodoleczniczy
„KLEMENSÓWKA“

Dra W. Piaseckiego
w Zakopanem.

Uroczę ustronie wśród lasów świerkowych, przeciętych drogą krajową i rzeką Bystrą. Kuchnia wyborna we własnym zarządzie. Łazienki i pokoje kompletne i z komfortem urządzone. Naokoło dworu leczniczego kryte galerye do przechadzek podczas deszczu. Osobna sala gimnastyczna, osobny park spacerowy przy zakładzie, a w nim oddział do chodzenia boso po rosie. W sali gościnnej dobór gazet najpoczytniejszych, fortepiany, bilard i kręgielnia do użytku gości bezpłatnie. Środki lecznicze: hydroterapia, kąpiele słoneczne i parowe, gimnastyka lecznicza z ortopedyą i mięsieniem, elektroterapia i hipnoza.

Zakład po spaleniu na nowo odbudowany, rozszerzony i wedle najnowszych wymagań urządzony.



SKOROWIDZ

DO PODRĘCZNIKA TERAPEUTYCZNEGO.

	str.	str.
I. Choroby wewnętrzne.		
Bronchitis acuta	1	Peritonitis 21
„ chronica.	2	Icterus „ 21
„ foetida	2	Cholelithiasis 22
Asthma bronchiale	2	Cirrhosis hepatis 23
Emphysema pulm.	3	Morbus Brighti 23
Bronchiectasia	3	Pyelitis 24
Oedema pulmon.	4	Nephrolithiasis 24
Haemoptoe	4	Meningitis cerebrospinalis 25
Pneumonia	5	Apoplexia cerebri 25
Gangraena pulm.	6	Myelitis 25
Tubercul. pulm.	6	Tabes dorsualis 26
Pleuritis	8	Neuralgia intescost. 26
Pericarditis	9	„ trigemini 26
Endocarditis	9	Ischias 27
Vitia cordis	10	Migraena 28
Stenocardia	11	Agrypnia 28
Cardiopalmus	11	Singultus 29
Morbus Basedovii	12	Chorda 29
Gingivitis	12	Pollutiones 29
Catarrh. ventric. acutus	12	Hysteria 29
„ chronicus	13	Epilepsia 30
Ulcus ventriculi	13	Tetanus 31
Haematemesi	14	Paralysis agitans 31
Carcinoma ventr.	15	Alcoholismus 32
Dilatatio ventr.	15	Mania 32
Dyspepsia nervosa	16	Melancholia 32
Cardialgia	17	Rheumatismus artic. acutus 32
Catarrhus intestin acutus	17	„ „ chron. 32
„ „ chronicus	17	„ „ musc. 33
Proctitis	18	Typhus abd. 33
Obstipatio alvi habitualis	18	„ exanth. 34
Typhlitis Perityphlitis	18	Dysenteria 35
Ulcera intest. tuberc.	19	Cholera 36
Haemorrhoids	20	Erysipelas 37
Ileus	20	Intermittens 38
		Influenza 38

	Str.		Str.
Chlorosis	38	Pneumonia crouposa	75
Anaemia	39	„ chronica	75
Leukaemia	40	Tuberculosis pulm.	75
Scorbutus	40	Atelectasis pulm.	76
Diabetes insip.	41	Pleuritis	76
„ melitus	41	Pertussis	77
Oxularia	42	Eclampsia inf.	78
Arthritis urica	42	Meningitis simplex.	78
Najwyższe dawki środków lecniczych 43—44		Meningitis tuberculosa	79
II. Choroby kobiece i położnictwo 46—63		Hydrocephalus	79
Choroby sromu	46	Trismus et tetatus neon.	79
Choroby macicy	46—48	Chorea minor.	80
Choroby macicy	48—52	Enuresis nocturna	80
Nowotwory macicy	52—54	Ascaris lumbricoides	81
Zmiany czynność. macicy 54—57		Oxyuris vermicul	81
Choroby części dodatkow. 57—59		Morbilli	81
Choroby ciążarn. i położn. 59—63		Scarlatina	82
III. Choroby dzieci od 63		Variola	83
Anaemia et chlorosis	63—63	Varicella	84
Rhachitis	64	Tabela wzrostu i ciężaru dziecka	85
Scrophulosis	65	Prawidłowe zębowanie	86
Stomatitis catarrh.	66	Dawki przeciętne leków dla dzieci	87
„ ulcerosa	66	IV. Choroby oczu 88—100	
Aphtae	67	V. Choroby skórne 100—118	
Dyspepsia	67	VI. Choroby wener. 108—118	
Colica flatulenta.	67	Rzerzączka	108—111
Obstipatio habitualis	68	Powikłania rzerzączki 111—112	
Catarrhus intest. et ventric acutus	68	Syphilis acquisita	113—117
Cholera infantum	69	Syphilis congenita	118
Catarrh. intest. chron.	70	Ulcus molle	118
Enteritis follicul.	70	VII. Choroby nosa, gar- dła, krtani 119	
Prolapsus ani.	71	Choroby jamy nosowej	119
Coryza-Ozaena	71	„ gardła i krtani 120—121	
Laryngitis acuta	71	„ uszu.	121—123
Laryngitis croup.	71	VIII. Choroby zęb. 123—115	
Angina dipht.	73	IX. Kosmesyki 125—183	
Bronchitis acuta et chron.	74		
Bronchopneumonia	75		

SPIS ŚRODKÓW LEKARSKICH

ZAWARTYCH

W PODRĘCZNIKU TERAPEUTYCZNYM.

- Acidum agaric.* 59.
— *arsenic.* 444, 819, 820.
— *benzoic.* 40, 539, 615, 659.
— *boricum* 508, 616, 674.
— *carbol.* 203, 352, 390, 391, 409, 410, 438, 581, 584, 670, 818.
— *hydrochlor. v. muriatic.* 9, 19, 28, 124, 125, 139, 140, 148, 149, 516, 518, 577.
— *hyperosmicum* 247.
— *lacticum* 347, 390, 365, 793.
— *muriaticum* 341, 342, 343, 516.
— *pyrogall.* 743.
— *pyrolignos.* 419, 439.
— *salicylic.* 330, 415, 418, 519, 583, 592, 671, 673, 700, 706, 708, 772.
— *tannic.* 350, 660, 799, 801, 803.
— *tartaric.* .
Aconitin. 298, 303.
Adonis 90.
Aether acet. 41, 346, 376, 571, 580.
— *sulphur.* 50, 208, 350, 374, 407, 571, 657, 753.
Aethylenum brom. 286.
Agaricin. v. ac. agaric. .
Aloe 169, 174, 363, 493, 528.
Alumen 333, 336, 415, 667, 673, 768.
Alumnol zob. 758.
Ammon. boracicum zob. Nowe leki.
Ammon. brom. 265, 278, 280, 467, 470, 603.
— *chlorat.* 572, 740.
— *muriatic.* 564, 587, 794.
— *sulphoichtylol.* 302, 420, 427, 458, 459, 462.
Amylnitrit. 21.
Amylum 711, 713.
Analgen 243, 251.
Antifebrin 13.
Antinervin 254.
Antipyrin 197, 236, 244, 248, 256, 290, 314, 392, 573, 609, 612, 654.
Antispasmin 619.
Apocodein 2.
Apomorphin 7, 9, 19, 28, 42, 118.
Aqua calcis 504, 549.
— *foeniculi* 549.
— *laurocerasi* 8, 93, 122, 200, 385, 535, 587, 672.
— *pyrophosphatis* 486.
Arbutin 225.
Argentum nitric. 231, 334, 515, 679, 755, 768.
Arnica 39, 94.
Arsenic. . Acid. arsen. et natr. arsen. 291, 378, 383.
Artemisia 282.
Asaprol 296.
Atropin 47, 285, 637, 690, 691.
Balsam peru. 34, 697, 722, 734, 736, 749.
Belladonna int. et ext. . Extr. et Tra. 24, 26, 32, 180, 192, 201, 209, 211, 283, 309, 588.
Benzonaphtol 184, 548.
Benzoës flor. 95, 538, 724.
Benzosol zob. Nowe leki.
Betol 252.
Bismut. salicyl. 161, 184, 339, 340, 349, 553, 554, 616.

- Bimut. subnitric.* 133, 154, 155, 159, 188, 194, 321, 323, 344, 469, 491, 549, 550, 718, 733, 761.
 — *valerianic.* 159.
Blauda pigulki 361.
Borax 115.
Bromoform 614.
Butylchloral 227, 241.
Butyrum cacao 181, 193, 196.
Calcium carbonic. 121, 777.
 — *phosphoric.* 381, 489, 490.
Calomel. 79, 194, 214, 329, 521, 540, 541, 559, 623, 624, 643, 683, 739, 781.
Camphora 39, 40, 95, 275, 277, 322, 326, 346, 350, 352, 374, 389, 639, 579, 658, 701, 767.
Capsicum 703, 765.
Cardinum zob. Nowe leki.
Carpainum zob. Nowe leki.
Cascarilla 185, 520.
Cascara Sagrada 170, 524.
Castoreum 153, 268, 279.
Cerium oxalicum 471.
 — *valerianicum* 472.
Chamomilla ol. 547.
China 46, 356, 364.
China cortex (decoct.) 66, 509, 557, 576, 588, 599.
Chininum ferrocitric. 373, 633.
 — *muriatic.* 237, 255, 312, 316, 319, 322, 341, 353, 354, 356, 359, 382, 383, 484, 572, 606, 653, 672.
 — *sulphuric.* 46, 257, 263, 312, 321, 660.
 — *tannic.* 340, 552, 661.
Chloramid 269.
Chloralcroton 238.
Chloralhydrat. 203, 265, 272, 326, 447, 523, 603, 620, 621, 627, 631, 668.
Chloroform 67, 127, 158, 232, 233, 235, 266, 307, 308, 309, 401, 411, 738.
Chrysarobin 192, 704, 741, 745.
Cocain mur. 25, 141, 157, 177, 195, 199, 342, 343, 412, 422, 473, 474, 477, 599, 604, 685.
Coccionella 608.
Cognac 478, 535.
Codein 123, 132, 133, 388, 393, 611, 649.
Coffein citric. 77, 100, 260.
 — *natrobenz.* 75, 84, 87.
 — *natro salicyl.* 111, 255, 256, 314, 315, 322.
Colchicum Tra 393, 408.
Collodium salicyl. 407.
Collyrium adstr. 675.
Colombo 166, 185, 187, 520, 550.
Condurango 142, 143.
Convallaria maj. 87, 105, 110.
Coto Tra 529.
Cotoin 164.
Creolin 416, 440.
Creosot 62, 63, 64, 342, 505, 506, 543, 544, 593, 594, 618.
Cuprum arsenic. 370.
 — *sulphuricum* 561, 681, 774, 796.
Curare 281.
Dermatol 716, 717, 769.
Diaphtherin 305.
Digitalis infus. 30, 46, 74, 75, 79, 80, 82, 216, 664.
 — *pulv.* 263.
Diuretin 200.
Dover p. pulv. Dov. 319, 339, 552, 553, 554.
Emplastr. cerussae 773.
 — *Hydrargyri* 775.
 — *saponat.* 775.
Equisetum 665.
Ergotin 45, 46, 294, 385, 431, 435.
Eserin 693.
Euphorin 249, 259.
Exalgin 99, 245, 304, 636.
Extr. cannab. ind. 258.
 — *bellad.* 24, 32, 180, 192, 338, 402, 423, 424, 528, 639, 770, 771.
 — *cascarae v. Cascara.* 524.
 — *chamamellis* 196.
 — *chinae* 638.
 — *Gelsemii* 242.
 — *hydrastis v. hydrastis can.* 43, 60, 426, 433, 446.
 — *hyosc. v. hyosciamus.* 11, 46, 233, 284, 610, 650.
 — *nucis kola* 482.
 — *nucis vom.* 152, 159, 364, 557, 639.
 — *opii* 23, 26, 165, 193, 234, 299, 320, 425, 456, 463, 464.

- Extr rhois arom.* 641.
 — *secalis v. secale corn.* 137, 191, 429, 430, 434, 449, 450, 468.
 — *viburni* 466, 467.
Ferrum aceticum v. tinct. 371.
 — *albumin.* 372, 377, 479, 484.
 — *carbon. sacchar.* 152, 365, 383, 434, 481, 483, 502.
 — *hydrog. reduct.* 364, 378.
 — *jodatum sacchar.* 789.
 — *lacticum* 111, 370.
 — *oxydatum* 366, 368.
 — *pyrophosphoric.* 371, 488.
 — *reductum* 367.
 — *sesquichlorat.* 136, 386, 441, 510, 585, 663.
 — *sulphuric.* 361, 362, 363, 444.
Flores benzoës vid. ac. benz. 538.
 — *sulphur.* 586, 706.
Guajacol 65, 158, 595, 596.
Gummi gutti 30.
Haemoglobin 380, 381.
Hydrargyr. praecip. album 695, 796.
 — *praecip. flavum* 684, 696, 782.
 — *praecip. rubr.* 559, 776.
 — *Salicyl.* 783.
Hydrastis canad. extr. fluid. 426.
Hydrastinin 44.
Hyosciam extr. 33, 67, 233, 284, 448, 609.
Hyosciamin 291, 293.
Hyoscini 270.
Ichtyol 360, 391, 351, 420, 728, 757.
Ipecacuanh. inf. 52, 116, 560, 562, 567, 570, 587, 589, 590, 651.
Ipecac. pulv. 2, 32.
Jodum purum 771, 798.
Jodoform 70, 202, 230, 299, 396, 461, 686, 797.
Juglans fol. 551.
Juniperus 73, 217.
Kali arsenicosum 501.
 — *acetic.* 73, 74, 77, 216, 501, 600, 664, 665.
 — *bromat.* 108, 265, 268, 278, 280, 282, 447, 470, 498.
 — *carbon.* 361, 362, 460, 608.
 — *caustic.* 821.
 — *chloricum* 508, 509, 546, 562.
 — *hypermang.* 437, 445, 511, 733, 756.
Kali hydrojodic v. jodatum 20, 23, 179, 180, 217, 460, 498, 503, 632, 771, 788, 798.
 — *sozodolic.* 800.
Lac sulphur. 698, 727.
Lanolin 402, 648, 652.
Laudanum v. Opium. 61, 160, 161, 162, 163, 198, 224, 234, 320, 330, 331, 340, 666.
Linimentum volatile 232.
Liparin 496.
Liquor. alumin. acet. v. liquor. Burovi. 712.
 — *ammon anis.* 4, 53, 94, 536, 569, 651, 657.
 — *ferri albumin.* 372, 377.
Lithion carbon. 69, 228, 399, 400, 404.
Lupulin 276, 277, 767.
Magister. bismuthi v. bism. subnit. 133, 499, 549, 556, 718, 733, 761.
Magnesia carbon. 120, 123, 145, 155, 173, 367.
 — *usta* 120, 129, 204, 324, 519.
Mannit 398.
Melissa 530.
Menthol 35, 37, 55, 212, 262, 475, 571, 736.
Morphium mur. 1, 6, 28, 29, 47, 49, 122, 130, 131, 134, 136, 154, 178, 181, 194, 195, 200, 201, 210, 246, 338, 605, 770, 802, 804.
Myrtol 38, 57.
Naphthalin 165, 183, 321, 531, 647.
Naphthol 323, 324, 701, 726, 731, 732, 747, 750.
Natr. benzoic. 12, 53, 54, 522, 545.
 — *hiborac.* 1, 120.
 — *bicarbon.* 6, 29, 121, 123, 126, 129, 130, 132, 145, 173, 306, 394, 398, 399, 400.
 — *bromatum* 96, 109, 265, 278, 280, 325, 387, 470, 603, 620, 625, 626, 627, 633.
 — *carbon.* 365, 805.
 — *chlorat.* 126.
 — *dithyosalic.* 405.
 — *jodatum.* 306, 588, 789.
 — *nitros.* 22, 98.
 — *salicyl.* 66, 206, 211, 213, 240, 258, 313, 331, 332, 576, 655, 656,

- Natr. sozodol.* 586.
 — *subsulph.* 410.
 — *sulphoichtyol.*
 — *sulphur.* 126, 206, 213.
Nitroglycerin 88, 106, 107.
Nucleinum zob. Nowe leki.
Oesypus. zob. Nowe leki.
Ol. caryophyl. 809.
 — *camphor.* 375.
 — *eucalypti* 14, 382.
 — *fagi* 722, 748.
 — *jecor. aselli* 492, 493, 499, 504, 505, 734.
 — *ligni Santal.* 223.
 — *lavandulae* 14.
 — *rusci* 721, 727, 734.
 — *terebinth.* 31, 35, 578, 689.
Ononis spin. 68.
Opium purum 114, 135, 153, 175, 176, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 299, 303.
 — *v. Tra.* 307, 311, 330, 337, 341, 343, 344, 346, 394, 425, 456, 529.
Papayotin 517.
Paulinia sorb. 572.
Pepsin 125, 139, 148, 364, 517, 518, 577.
Phenacetin 257, 260, 315.
Phenocollum hydrochl. 355.
Phenosatyl zob. Nowe leki.
Phosphor 494, 495, 496, 497.
Pichi-Pichi extr. zob. Nowe leki.
Pilocarpin 273, 289, 397, 561, 567, 577, 694, 808.
Piperinum 382.
Piperazin 229, 306.
Plumb. acet. 49, 61, 193, 414, 413, 676, 680, 759.
Podophyllin 174, 207.
Praecip. alb. v. Hydr. p. a. flaf. rubr. 686, 674, 782.
Propylamin 635.
Pulv. Doveri 10, 339, 552, 553, 554.
Quebracho 371.
Quillaya 4.
Resorcín 161, 184, 186, 513, 530, 546, 547, 582, 701, 707, 723, 728, 773.
Rheum 145, 151, 152, 170, 174, 204, 363, 643.
 — *tinct.*
Rhus arom. 641.
Sabina frond. 772, 773.
Saccharin 512.
Sal. therm. Carol. 119, 128, 146, 172, 190.
Salep 162, 318.
Salipyrin 1, 295.
Salol 160, 226, 253, 328, 407, 533, 541, 554, 754, 765.
Salophen 250, 279.
Santonin 642, 643.
Secale corn. 137, 191, 429, 430, 432, 434, 435, 449, 450, 468.
Semen lini 763, 766.
Senega v. Polygala 235, 369.
Sol. ars. Fovleri 150, 239, 264, 291, 306, 356, 357, 358, 368, 485, 630, 742.
 — *Burowi v. liquor B.*
Sozodol 601 *vide Natrum et Kali Soz.*
Sparteín 76, 86, 1025.
Spir. lavandul. 697, 753.
 — *Sapon. Kalin.*
Stibium sulph. aur. 28, 30, 40.
Strontium bromat. 120, 147.
 — *lacticum* 221.
Strophantus v. Tra Str.
Strychnin int. 756, 274, 294, 381, 640.
 — *inj.* 155.
Styrax 749.
Sublimat v. Hydr. bichlor. 566, 678, 740, 778, 787, 791, 791.
Sulphonal 267, 287, 618, 634, 669.
Sulphur aur. ant. 6.
 — *praecip.* 697, 698, 700, 701, 706, 799.
Syrup ferri iod. 500, 601.
Tannin 113, 135, 165, 183, 196, 224, 335, 350, 421, 448, 554, 555, 667, 682, 729.
Tartar. stib. 117, 560.
Terebinth v. Ol. Ter. 35, 48, 56.
Terpinol 27, 36, 54.
Terpinkhydrat 609.
Teucrinum zob. Nowe leki.
Thallinum 317.
Theobromin 85, 103, 215, 220.
Therebint. ven. 208, 578.
Thiol v. Nowe leki.
Thymol 617, 816.
Tinct. absynth. 149.

- Tinct. acon.* 12, 303, 607, 701.
 — *amara* 124, 151.
 — *bellad.* 309, 448, 520, 588, 602, 639.
 — *benzoes* 16.
 — *canellae* 349.
 — *cantharid.* 709.
 — *capsici* 442, 703, 705.
 — *chinae comp.* 141, 341, 357, 360, 480, 485, 504, 595.
 — *cinamon.*
 — *colchici* 303.
 — *Colombo* 185, 542.
 — *convallaria* 105.
 — *coto* 529.
 — *digitalis* 81.
 — *eucalypti* 15, 358.
 — — *chlorati* 487.
 — *ferri pomati* 150, 264, 480, 630.
 — — *gallarum* 114, 457.
 — *jodi* 457, 503, 584, 703.
 — *lobeliae* 18, 23, 93, 97.
 — *malat. ferri* 360, 742.
 — *myrrhae* 575, 581.
 — *Nerii Oleandri* 92.
 — *nuc. vom.* 140, 141, 271, 279, 341, 482, 526.
 — *opii* 114, 153, 163, 175, 176, 182, 303, 307, 311, 318, 332, 337, 341, 343, 344, 346, 465, 520, 522, 529.
Tinct. rhei 141, 168, 504, 526.
 — *rhuris arom.* 392.
 — *ratanh.* 114, 544.
 — *strammon.* 20, 448.
 — *strophanti* 72, 78, 83, 104.
 — *valerianae* 97, 109, 110, 153, 271, 341, 345, 387, 448.
 — *veratri* 101.
Trifolium fol. 205.
Tumenol 718.
Unguent diachylon 720.
 — *Hebrae* 719.
 — *hydrarg.* 563, 688.
Urethanum 288, 523, 622, 628.
Valerian inf. 41, 50, 288, 534.
Valerian v. Tinct.
Veratrin 255, 246, 310.
Viburnum prunif. 466, 467.
Vinum Condurango 143.
 — *stibiat.* 42.
Zincum
 — *oxydat.* 284, 699, 700, 713, 716, 717, 769.
 — *sulphur.* 415, 417, 674, 759.
 — *sulphocarb.* 760.
 — *sozodol.* 1558.



DOM ZDROWIA

dla umysłowo chorych

Dra Karola Żuławskiego

Docenta Psychiatrii

w Krakowie, ulica Długa Nr. 82

Telefon Nr 159,

konces. przez Wys. c. k. Namiestnictwo galic.

Przyjmuje osoby dotknięte chorobą umysłową, alkoholistów, morfinistów, jakoteż osoby dotknięte wszelkiego rodzaju nerwicami, połączonemi ze zboczeniem umysłu.

Leczenie odpowiednio do postępów nauki, hydro- i elektroterapia w miarę potrzeby.

Dom zdrowia urządzony z komfortem, nie ustępuje w niczem pierwszorzędnym podobnym Zakładom zagranicznym, położony w najzdrowszej dzielnicy miasta wśród ogrodów. Dla przyjemności chorych jest czytelnia, fortepian, rozmaite gry, wspólna sala jadalna. Staranna opieka, wszelkie wygody i towarzyskie życie wśród rodziny są zapewnione.

Ceny wraz z opieką lekarską i zupełnem utrzymaniem od 5 do 10 Złr. dziennie, stosownie do umowy i wymagania.

Właściciel zakładu przesyła na żądanie program, jakoteż udziela wyjaśnień ustnych lub pisemnych.

PODRĘCZNIK TERAPEUTYCZNY.

I. CHOROBY WEWNĘTRZNE.

Bronchitis acuta.

Wskazane jest przedewszystkiem utrzymanie jednostajnej ciepłoty ciała, u starców leżenie w łóżku, szczególnie wobec Bronchit. capillar. oraz środki odwozzące na klatkę piersiową (bańki suche). Wewnętrznie środki rozdzielające, wykrztuśne, wobec silnego kaszlu suchego, środki odurzające, wody mineralne alkaliczne. — Szczawnicka, Giesshübel, Bilińska, Selterska, Em-ska.

1. *Natri bicarb.* 5'00,
Morph. mur. 0'10,
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.
2. *Inf. rad. Ipec.* 0'50:200'00,
Syr. cort. aurant. 15'00.
MDS. Co godzina łyżkę.
3. *Inf. Seneg. e* 6'00:200'00,
Syr. simpl. 20'00.
DS. Co godzina łyżkę.
4. *Inf. rad. Quillajae*
e 5'00 *ad* 200'00,
Liq. ammon. anis. 2'00,
Syr. Seneg. 20'00.
DS. Co godzina łyżkę.
5. *Vini stibiiati* 15'00.
DS. 3 razy dnia po 10 kropli.

6. *Natri bicarbon.* 5'00,
Sulph. aur. antimon. 0'24,
Morph. mur. 0'10,
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.
7. *Morph. mur.*
Apomorphin mur. āā. 0'10,
Aqu. dest. 15'00,
MD. in vitr. nigr.
S. 3—4 r. dnia po 10 kropli.
8. *Apocodein mur.* 0'10.
Aq. lauroc. 10'00.
MDS. Po 10 kropli.
9. *Apomorphin hydrochl.* 0'05,
Acid. hydrochl. gtts. 10,
Aq. menth. pip. 50'00,
Syr. simpl. 15'00.
MDS. Co 2 godz. $\frac{1}{2}$ —1 łyżecz.
10. *Pulv. Doveri,*
Sacch. albi āā. 3'00,
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.
11. *Extr. hyosc.* 0'15,
Aq. dest. 70'00,
Syr. simpl. 20'00.
S. Co 2 godz. łyżeczkę.
12. *Natri benzoici* 10'00,
Trae aconiti gtts. 20,
Aqu. amygd. amar. 8'00,
Syrup codeini,
Syrup de Tolu āā. 30'00,
Aqu. dest. 110'00.
DS. Co 2 godz. łyżkę.

13. Antifebrin 0'25 pro dosi.

Co 2 godziny proszek.

Tłumi B. bardzo szybko.

B. chronica. Dobre powietrze, unikanie dymu, kurzu, pożywna dyeta, środki lekko przeczyszczające. Jeżeli można, wysłać na zimę do cieplejszego klimatu, w lecie pobyt na wsi lub zdrojowiskach. Inhalacye soli (2%) z dodatkiem Ol. terpent. Ol. pini pumilionis. Picie wód Szczawnickich, Giesshübler, Selters., Ems. Expectorantia: Ipeka, Apomorphin. Przy Bronchoblenorrhoea: Ol. Terebinth. dziennie dwa razy po 5—10 kropli z mlekiem, lub w kapsułkach. W razie duszności bańki suche, synapizmy.

*B. foetida:***14. Ol. eucalypti 15'00,***Ol. lavandul. gtts. 5.*

S. Po 10 kropli do inhalacji.

15. Tinct. eucalypti alcohol. 2'00,*Syr. codeini 20'00,**Syr. tolu 20'00,**Aq. 80'00.*

DS. Po łyżeczce wyżyć w ciągu 24 godzin.

16. Tinct. benzoës 1'00,*Mixt. gummos. 120'00.*

DS. Jak wyżej.

Asthma bronchiale.

Przedewszystkiem należy usunąć przyczynę (np. polipy w nosie, choroby kobiece).

Podczas samego napadu, chorego rozebrać, (zwłaszcza zdjąć stanik lub gorset), umieścić go w przestronym pokoju, gdzie dobre świeże powietrze. Najprędzej działają narcotica, podać więc na wewnątrz albo Chloralhydrat 2'00 na raz, lub wstrzyknąć morfinę. Mniej pewnie działa morfina na wewnątrz. Polecieć choremu podczas napadu mocną

czarną kawę wypić, gorące okłady lub synapizma na klatkę piersiową i łydki. Kilka kropli Amylnitritu do wachania, lub Pyridyn na spodeczek wylać i tem oddychać, używają też papierosów z tytoniu według recepty Nr. 26 podanej przez Trousseau. Polecają też Jodkaliu w dawkach 1—3'00 na dzień, lub Extr. Quebracho. Jeżeli narcoticum nie może być podane a wśród napadu słycać liczne rżenia i świsty i furczenia, to podać należy emeticum n. p. apomorfine podskórnio lub na wewnątrz. W ciężkich napadach można się uciec do narkozy chloroformowej. Po przejściu napadu leczyć chorobę główną i pozostały zwykły po napadzie nieżyt oskrzelowy, odpowiednimi środkami.

17. Extr. fluid. Quebr. 25'00.

DS. 2—3 łyżeczki dziennie.

18. Vini stibiat.*Tinct. lobel. infl. āā. 15'00,**Morph. mur. 0'10.*

ES. 3 r. na dz. po 15 kropli.

19. Apomorphin chlor. 0'05,*Acidi hydrochl. dil. gtts. X.**Aq. menth. pip. 50'00,**Syrup 20'00.*

MDS. Co 2 godz. 1/2 łyżeczki.

20. Kali jodati 10'00,*Tinct. Stramm. 8'00,**Extr. liquir. 4'00,**Syrup Scill 30'00,**Aqu. dest. 250'00.*

S. 3 r. dz. łyżkę w szklance wody.

21. Amylnitrit. 5'00,*Ol. foenicul. 10'00.*

S. W napadzie 2—5 kropli nałożyć na chustkę i wdychać.

22. Natri nitrosi 2'00,*Aq. dest. 120'00.*

DS. 4 r. na dz. łyżeczkę.

23. Kali jodati*Tinct. lobel. infl. āā. 10'00,**Extr. opii 0'10,**Aq. destil. 180'00.*DS. Co 2 godz. $\frac{1}{2}$ łyżki.**24. Extr. Bellad.***Pulv. Belladon. āā. 0'30,**f. pil. Nr. 30.*

Na wieczór 1—2 do pigulek.

Radzą też w początku napadu, pędzlować w głębi nosa:

25. Cocain 1'00,*Aq. dest. 20'00.*

DS. Do pędzlowania.

26. Folior. Belladon. 0'3,— *Hyoscym. 0'15,*— *Stromm. 0'15,**Extr. Opii aquos. 1'5,**Aq. laurocer. 0'5.*MDS. Jako tytoń do papie-
rosów.**Emphysema pulmonum.**Przeważnie leczenie sympto-
matyczne.Unikanie zaziębień, przemo-
czenia nóg, w ogóle wszystkiego,
co może spowodować lub powie-
kszyć nieżyt oskrzelowy. Głó-
wne zadanie leczyć nieżyt o-
skrzelowy przez pobyt na świe-
żem górskim powietrzu, picie
wód w Ems, Reichenhall, Nau-
heim, Szczawnicy; na wewnątrz
Pulv. Doveri, Amonium muriat,
Tannina z morfiną, Stibium sul-
phurat. aurant. z morfiną, apo-
morphin, Inf. Ipecacuanhae lub
radix Senegae, przetwory balsa-
miczne jak: Balsam peruv. to-
lutanum, ol. terebinth. terpinol,
terpinhydrat (3'00: na 30 pigu-
lek, z tego 1—3 pig. dziennie).Leczenie w gabinetach pneu-
matycznych lub za pomocą przy-
rządów Waldenbura lub Geigla
i Majera (Würzburg) lub Schniz-
lera, lub w Truskawcu w zakła-
dzie inhalacyjnym.U ludzi otyłych można polecić
picie wód Karlsbadzkich lub
Kissingen. Przy osłabieniu akeji
serca, podawać obok środków
wykrztuśnych i nasercowe. Uwa-
żać na wypróżnienia, w razie
braku tychże, podać odpowiednie
środki.Dyeta pożywna, ale nie wzdy-
mająca.**27. Terpinoli 3'00,***Extr. et pulv. liquir. q. s.**ut. f. pil. N. 30.*

S. 3—4 pig. dziennie.

28. Apomorph. hydrochl. 0'05,*Morphii mur. 0'03,**Acidi mur. gtts. X.**Aqu. dest. 180'00,**Da in vitro nigro.*

S. Co 3 godziny łyżkę.

29. Stibii sulph. aurant. 0'30,*Morph. mur. 0'10,**Natri bicarb. 5'00,**Mfp. div. in dos. N. XV.*

S. 2—3 proszki dziennie.

30. Guttii*Fol. digit.**Bulb. Scillae**Stibii sulphur. aurant.**āā. 1'50,**Extr. Pimpinellae q. s. ut. f.**pil. N. 60.*

DS. Co 2 godziny pigułek.

31. Ol. terebinth. 2'00,*Aqu. menth. pip. 150'00,**Mucil. g. arab. 30'00.*

DS. Co 2—3 godz. łyżkę.

32. Extr. Belladon. 0'1,*Pulv. rad. Ipec. 0'2,**Sacch. alb. 3'0,**Mfp. pulv. Div. in dos. N. X.*

S. 3 proszki dziennie.

33. Extr. Hyoscym. 0'15,*Aqu. dest. 70'00,**Syr. simpl. 10'00.*

DS. Co 2—3 godz. łyżeczkę.

Bronchiectasia.Świeże i dobre powietrze, je-
żeli można na wsi lub w górach.

Odżywianie dobre chorego, odpoczynek od zajęć, unikanie kurzu i dymu.

Leczenie nieżytu oskrzelowego. Jeżeli suchy nieżyt, dawać środki wykrztuśne, apomorphin senega, ipecacuanh. stib. sulph. aurant. z dodatkiem morfiny. Jeżeli wydzielina b. obfita, to środki ściągające, jak tanina, alun, plumb. acet. na wewnątrz lub do wziewań, albo też środki balsamiczne, ol. terebinth.

34. *Bals. peruv.* 5'00,
Aq. dest. 12'00,
Syrup amygdalini,
Mucil. g. arab. āā. 10'00.
DS. Co 2 godziny łyżkę.

35. *Ol. terebinth.* 0'5—2'0,
Menthol. 0'25,
Aqu. dest. 120'00.
DS. Do inhalacyi.

36. *Terpinol* 3'00,
Extr. et pulv. liquir. q. s.
Utf. pil. N. 30.
S. 4—5 pig. na dzień.

37. *Mentholi* 2'00,
Sacchari
Gum. arab. āā. 1'00,
Unguent. Glicer. q. s. f. pil.
Nr. 20 obduc. gelatin.
S. 3—4 pig. dziennie.

38. *Myrtoli* 0'15,
c. glicer. q. s.
ut f. capsul. gelat. N. 20.
S. 3—4 kapsułki na dzień.

Wreszcie pobyt nad morzem, lub w miejscach klimatycznych.

Oedema pulmonum.

Leczenie głównej choroby w odpowiedni sposób.

Przy pierwszych objawach obrzęku płuc ostrego, podać środki podniecające akcyę serca jak: czarna kawa, cognac, grog, wino, kamfora, piżmo. Podskórnie wstrzyknąć eter, ol. camphoratum lub coffeinę.

Zewnętrznie położyć na piersi i łydki synapizma, rozcierać nogi i ręce, dać choremu kąpiel i zlewać głowę i piersi zimną wodą.

Jeżeli chory jest krwisty, można puścić krew, zwłaszcza w obrzęku płuc wśród spraw zapalnych.

Nadto można dać lewatywę ze środków ostrych jak: Decoct colocynt., octu, rozczyntu soli itp.

Jeżeli niebezpieczeństwo na razie minęło, dawać cardiaca i digitalis, coffeinę, theobrominę, Sparteinę, Tra stroph. — Po tem leczyć główną chorobę i zwracać uwagę na pierwsze objawy zastoinowe.

39. *Infus. flor. arnicæ*
e 15'00 *ad* 120'00,
Camphor. trit. 1'25,
Mucil. g. mimos. 20'00.
Mf. emulsio. S. Co $\frac{1}{2}$ godziny łyżkę.

40. *Acidi benzoici* 3'00,
Camphor. pulv.
Stibii sulph. aurant āā. 0'50,
Sacch. alb. 5'00.
Mfp. div. in dos. X.
S. Co 2 godz. proszek.

41. *Inf. rad. Valerian. e* 10'00
ad 150'00,

Aeth. acet. 2'00,
Syr. Seneg. 15'00.

DS. Co godz. łyżkę.

42. *Apomorphin. mur.* 0'10,
Aq. dest. 10'00.

DS. 1—2 strzykawki podsk.

Haemoptoe.

Bezwzględny spokój, ułożenie chorego na wznak w łóżku, w pokoju o miernej ciepłocie, przykryć chorego lekko.

Nie pozwolić mu się ruszać i mówić — zwolna oddychać.

Pokarmy tylko płynne, zupełnie chłodne, (najlepiej mleko). Wstrzymywać się od kaszlu, a

jeżeli kaszel trwa, to spore dawki morfiny 1—2 etg. na raz. Chorego nie badać. Na piersi lód w worku gumowym lub pęcherzu; połykać małe kawałki lodu. Obok tego do zażywania: Plumb. acet. cum opium aa. 0'03 na dawkę, lub też Liq. terri sesquichl. 25 kropli na $\frac{1}{2}$ szklanki wody, z tego łyżkami; lub też Extr. Secal. cornuti. Pulv. secal. corn. aa. 2'00 na 30 pigułek, z tego co 2 godz. pigułek.

W cięższych krwotokach wstrzyknąć ergotyne Bombelon $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki na raz lub podać atropinę w dawce 0'0002 lub wstrzyknąć $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki z roztworem 0'01:10'0.

Przy podniesionej aktywności serca, radzą Inf. digitalis, przez Leydena jednak przeciwwskazane.

43. Extr. fluidi hydr. canad. 10'00.
S. Po 20—30 kropli, kilka razy dziennie.

44. Hydrastinin 0'25,
Sacch. lact. 3'00,
Mfp. div. in dos. X.
d. in charta cerat.
S. 3 pr. dziennie (następnie 2—1).

45. Ergotin dialys. Bombelon 2'00,
Aqu. dest. 20'00,
Acid. carbol. gtts. tres.
MDS. Do wstrzykiwań (1 strzykawka Prawatza zawiera 1 decigr.).

46. Ergotin
Chinin. sulph. aa. 2'00,
Pulv. fol. digit.
Extr. hyosc. aa. 0'20,
Mf. pil. N. XX.
S. Co 2 godziny pigułek.

Polecają też wstrzykiwania z Atropiną np.

47. Atrop. sulfur. 0'01,
Morph. mur. 0'20,
Aqu. dest. 10'00.
D. $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki wstrzyknąć.

48. Ol. terebinth. 0'30,
Dtal. dos. N. XX. in caps. gelat.
S. Co 2 godz. kapsułkę.

49. Plumb. acet. 0'5,
Morph. mur. 0'05,
Sacch. q. s.
ut f. p. Div. in dos. N. X.
S. Co 2—3 godz. proszek.

Pneumonia.

Leków swoistych przeciw pneumonii nie posiadamy. Leczenie więc przeważnie dyetetyczne. Chorego powinien leżeć w dużym pokoju o jednostajnej temperaturze, dyeta tylko płynna: bulion, rosół, mleko, winna polewka, wino, rosół z jajem, do picia jakiś kwas lub lemoniada.

W pierwszym okresie zapalenia płuc można postawić suche bańki, zwłaszcza, jeżeli jest kłócie w piersiach, przy bardzo silnym kłóciu nawet 2—3 pijałek lub cięte bańki i okład lodowy lub wstrzyknięcie morfiny. Przy silniejszym kaszlu, męczącym chorego, nieznaczne dawki narkotyków. Jeżeli gorączka bardzo wysoka lub trwa długo, należy przeciwdziałać przez zmywanie ciała letnią wodą lub pół na pół wodą z octem, podawać środki przeciwgorączkowe jak: antipyrinę 1'00—2'00 lub phenacetinę, ale lepiej z dodatkiem kofeiny 0'15—0'20 na dawkę, lub też obok tych przetworów dać jeszcze cognac lub mocne wino. Przy słabym tętnie, takież aktywności serca, podać digitalis, strophanthus lub sparteinę.

W objawach zapadu, podać kamforę 0'1 w kieliszku wina lub podskórnie strzykawką ol. camphorat.; wreszcie, podskórnie eter.

- 50.** *Infus Valerianae*
e 5'00 ad 200'00,
Aether sulph. 2'00,
Syr. aurant. 20'00.
S. Co godzinę łyżkę.

Chorem, przyzwyczajonemu do nadużywania wyskoku, należy nie szczędzić wina, cognacu, ażeby nie wybuchło delirium.

- 51.** *Cognaci optimi*
Aq. melissae āā. 60'00,
Syr. cort. aur. 40'00,
Vitel. ovi N. duo.
MDS. Co 2 godz. łyżkę.

W razie delirium: opium, morfina lub chloralhydrat (2—3 grm.).

W okresie rozdzielania się nacieku: środki wykrztuśne, rozdzielające jak: woda giesshübel-ska, sełterska, szczawnicka.

- 52.** *Infus ipecac.*
e 0'30 ad 180'00,
Aqu. lauroc. 2'00,
Syr. altheae 20'00.
DS. Co 2 godziny łyżkę.

- 53.** *Infus senegae*
e 10'00 ad 200'00,
Natri benzoici 2—3'00,
Liquor ammon. anis. 2'00,
Syrup simpl. 20'00.
S. Co 2 godziny łyżkę.

Pulv. Doveri 0'25, 2 lub 3 dawki,
Stib. sulphur. aurant 0'01—0'02
na dawkę, 2—3 razy na dzień itp.
W razie trudnego rozdzielania
się nacieku: okłady wysychające,
okłady ciepłe, kataplazmy, dyeta
pożywna, wino, cognac.

Gangraena pulmonum.

Świeże powietrze, częste przewietrzanie pokoju; chory powinien leżeć w łóżku na stronie chorej, dyeta pożywna i podniecająca (przetwory wysokokowe), jeżeli niema przeciwskazania.

Podawać na wewnątrz środki wykrztuśne i balsamiczne (bals. peruv. bals. tolutan.) obok nie-

wielkich dawek chininy, oraz robić częste wziewania z ol. terebinth. 1,0—3,0 na 200 wody lub ol. pini pumilionis polonicae po 10—15 kropli na kieliszek wody do maszyny inhalacyjnej Siegla. Lub też kwas karbolowy 2% do wziewań, ale w takim razie uważać na mocz, czy nie wystąpi zabarwienie ciemne. Również wziewania z Thymolu 0'20 z dodatkiem kwasu borowego 3'0 na 100 wody.

Na wewnątrz podać n. p.:

- 54.** *Terpinol.* 3'00,
Natr. benzoici 2'00,
Sacch. albi q. s. ut f. pill.
N. 30.

S. Co 2 godziny pigułkę.

- 55.** *Menthol.* 3'00,
Sacch. albi
Gum. arab. āā. 2'00,
Aqu. dest. q. s. ut. f. pil.
N. XX.

S. Co godzinę pigułkę.

Lub menthol podawać w kapsułkach wyrobu Zahradnika po 1'0 grm. z dodatkiem ol. olivar. 2'0.

- 56.** *Ol. terebinth. rect.* 3'00,
Mucill. gum. arab.
Syr. simpl. āā. 25'00.
Sensim terendo affunde
Aqu. dest. ad 150'00.

S. Co 2 godziny łyżkę.

- 57.** *Myrtoli* 0'20,
Dtal. dos. N. X. in caps. gel.
S. 3 razy dn. po jednej kap.

Do spluwaczki przykrywanej szczególnie wlewać 5% kw. karbolowy lub 2% kreoline.

Tuberculosis pulmonum.

W przypadkach gruźlicy dziecięcej, należy zwrócić całą uwagę na higieniczne wychowanie, przebywanie jaknajwięcej na świeżym powietrzu, gimnastykę, wysypianie się, do-

bre odżywianie, nie obciążanie pracą umysłową lub fizyczną, unikanie zaziębień, hartowanie skóry przez zimne nacierania słoną wodą, zwłaszcza: szyi i klatki piersiowej.

W pierwszych początkach suchot przedewszystkiem uważać na podniesienie odżywienia chorego, forsownie go żywić. Polecieć picie mleka w lecie, tranu w zimie, tłuszczy jak największej o ile tylko żołądek znośi. Pobyt kilkomiesięczny w górskim powietrzu podczas lata, na zimę zaś polecieć wyjazd do jednej ze stacyj klimatycznych najbardziej zalecanych: Davos (zakład Dra Turbana), Zakopane (zakład Dra Chramca i Dra Chwistka), Meran, Arco, Bordighera, Mentona, Nizza i t. p.

Ze środków leczniczych stosować kreozot, guajakol, kreozot. carbonic. 6:00 pro die, arsen, zresztą leczenie symptomatyczne jak przy bronchitis.

W późniejszych okresach obok powyższych poleceń pilnie uważać na pojawiające się krwioplucia i stosownie je wstrzymywać. Zmniejszać wydzielanie płwocin przez środki balsamiczne, usuwać gorączkę przez podawanie miernych dawek leków przeciwgorączkowych, jak antypiryny po 0:50, 2—3 pr. na dzień, w razie potrzeby. Toż samo phenacetiny lub antifebriny po 0:25.

58. *Salipyrin 1:00,*
Dtur. tal. dos. 15.

S. Co 2 godz. pr. (do 7 dzien.).

Usuwanie nocnych potów przez zmywanie ciała winnym octem, cognakiem, wodą kolońską lub na wewnątrz cognac z mlekiem, lub atropina po 0:001 na noc, Agaricin bardzo słabo działa, z nowszych środków polecają: Kalium telluricum po 0:01 na noc, dochodząc do 0:05.

59. *Acidi agaricin 0:01—0:05,*
Sacchari 0:30,
Mfp. dtur. tal. dos. X.
S. 2 proszki dziennie.

60. *Extr. fluid. hydr. Canad.*
10:00.
S. Na wieczór 30 kropli.

W razie krwotoków bezwzględny spokój, okład lodowy na piersi, połykanie lodu, pokarmy tylko chłodne, wstrzyknięcie Ergotini Bombelon 0:50 do 1:0 na raz, podanie większych dawek morfiny dla zapobieżenia kaszlowi.

Przy tętnie przyspieszonym dać: Fol. Digitalis 0:05 z morfiną 0:01 co 2—3 godz. proszek.

W ciężkich przypadkach krwotoku, wstrzyknąć atropinę 0:10: 10:0 z tego pół strzykawki na raz, lub Acid. sclerotinici 1:10: wody, z tego co godzinę strzykawkę.

Przeciw biegunce leki osłaniające z dodatkiem opiatów:

61. *Plumb. acet.*
Laudani aa. 0:03.
Mfp. dtur. tal. dos. 10.
S. 2—3 razy dziennie.

Pigułki kreozotowe używać bez balsamu tolutańskiego. Dziennie można dojść do 5—6 grm.

Z wyrobów krajowych pigułki Zahradnika i Mańkowskiego, z zagranicznych dobre są Jaspersa (Berlin). W rozczyynie dobrze jest zapisywać kreozot z Tra amara lub Tra gent.

62. *Kreozoti e bit. fagi 3:00,*
Trae gent. 30:00.
DS. Po jedzeniu 20—30 kr. w kieliszku wody lub wina.

63. *Kreozoti e bit. fagi 1:00,*
Trae gent. 2:50,
Spir. vini rectif. 25:00,
Vini Xerens 100:00.
DS. 3 razy dziennie po łyżeczce w szklance wody.

64. Creozot. carbon. 40'00.

S. 3 r. na dzień po $\frac{1}{2}$ —1 łyż.
(przetwórn drogi grm. 8—9 ct.).

65. Gnajacoli 2'00,

Spir. vini 20'00,

Tinct. gentian 10'00,

Extr. Coffe. conc. 20'00,

Aqu. dest. 200'00.

MDS. 2—4 łyżek dziennie.

Pigułki guajakolowe po 0'05
wyrobu Zahradnika, w tych sa-
mych dawkach co kreozot.

Pleuritis.

Chory ma leżeć w łóżku, po-
żywienie płynne, zwłaszcza je-
żeli jest gorączka. Suche bańki
na okolicę zajętą zapaleniem
opłucnej, jeżeli bardzo silny
ból, to nawet 4—6 pijawek lub
wstrzyknięcie morfiny. Po tem
okład lodowy, lub wysychający.
Zresztą leczenie wyczekujące,
co najwyżej jakiś kwasek do
picia, małe dawki chininy. W ra-
zie męczącego kaszlu morfina.
Jeżeli się wypocina nie wytwa-
rza, to pozostać przy tem lecze-
niu, co najwyżej pędzlowanie
przez kilka dni cum Tra jodi
i nie pozwalać choremu wycho-
dzić, dopóki tarcie istnieje i stan
podgorączkowy się utrzymuje.
Z resztą trzeba leczyć chorobę
zasadniczą, najczęściej nacieki
szczytowe. Jeżeli zaś jest już
znaczna wypocina, to obok okła-
dów wysychających można zale-
cić ciepłe kąpielizmy. W okre-
sie, kiedy już wypociny nie przy-
bywa, pędzlowanie jodyną, ve-
sicantia, stosowane co 2—3 dni
na inne miejsce. Na wewnątrz
Natr. salicylicum po 3—4 grm.
dziennie, diuretica jak: Inf. di-
gitalis, Theobrom. natro salicyl.
po 4—5 grm. dziennie, Coffe-
inum natro salic. 1—1'5 dziennie,
Calomel, Adonis vernalis 6'00
na 200'00., Tra. stroph., Kali ni-
tricum itp. Nadto można próbo-

wać środków przeczyszczają-
cych, jeżeli nie ma przeciwska-
zania: Kali jodat. 10'00:200'00
zażywać 2—3 łyżek pro die.

Tam, gdzie wypocina ropna,
należy zrobić resekcję żebra i
ropę wypuścić, jeżeli zaś chory
nie chce, to przynajmniej punk-
cję i aspirację płynu przyrzą-
dem Potaina lub Dieulafoya.
Punkcja nadto jest wskazana,
jeżeli znaczna bardzo duszność
grozi życiu chorego.

Po przebyciu zapalenia opłu-
cnej, wyjazd na świeże powie-
trze, w góry do Zakopanego,
Davos, Gleichenbergu, odżywia-
nie forsowne, gimnastyka odpow-
iednia i leczenie w gabinetach
pneumatycznych.

Zresztą leczyć należy chorobę
główną, która dała powód do
zapalenia opłucnej, a tą jest naj-
częściej gruźlica płuc.

66. Dect. cort. chinæ

e 10'00 ad 150'00,

Natri salicyl 3'00,

Syrup aurant. 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Dzieciom Natr. salic. 0'10—0'30
pro dosi. Co 2—4 godz.

67. Chloroformii 10'00.

Ol. hyosc.

Ol. olivar. aa. 20'00.

S. Do nacierañ.

Przy pozostałym exsudacie:

68. Decoct. ononidinis

e 15'00 ad 200'00,

Oxymel Scillæ 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

69. Natr. chlorat. 5'00,

Lithii chlorat. 1'00,

Aqu. petroselin 13'00,

Syrup menth. 200'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

70. Jodoform 2'00,

Unguenti simpl. 50.

Ol. Bergamott. gtts. III.

S. Do wcierań w kl. p.

Pericarditis.

Przedewszystkiem spokój, chory powinien leżeć w łóżku, mało się ruszać, na okolicę serca worek lodowy. W razie silnych bólów parę pijawek, suche bańki, pędzlowanie c. Tra. jodi. Na wewnątrz Inf. digitalis e. 1'00 ad 200'000. co godzinę łyżkę, lub inne cardiacum. W razie silnej gorączki podawać antipyrinę, phenacetinę lub antifebrynę w połączeniu z coffeiną dla uniknięcia zapadu. Jeżeli bóle trwają, dać morfinę, chloralhydrat, lub sulfonal na noc. Dyeta przy tem płynna niepodniecająca, uważać na regularne stolce. — Jeżeli okres zapalny minął, stosować resorbentia: okłady ciepłe, pędzlowanie jodyną, diuretica, jak: coffeina, diuretyna, digitalis, Tra strophanti itp. a dyeta wówczas posilna, lekko podniecająca.

W uporeczywych przypadkach można zrobić punkcję i aspirację przyrządami Potaine'a lub Dieulafoy, lecz rzadko kiedy chory się na to zgodzi.

71. *Infus. fol. digit.*

e 1'00 ad 180'00,

Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co 2 godz. 2 łyżki.

72. *Tinct. Strophanti* 10'00.

DS. 3 razy dz. po 10 kropli.

Po ustaniu gorączki, gdy exsudat zostaje:

73. *Infus. juniperi* e 15'00

ad 200'00,

Liqu. Kali acet.

Oxygel Scillae āā. 15'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

74. *Infus. hb. digitalis*

e 1'00 ad 150'00,

Kali acet. 5'00,

Syrup simpl. 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

75. *Pulv. fol. digit.* 0'5,

Coff. natrobenz. 1'00,

Sacch. lactis

Elosacch. Colomi āā. 1'5.

Mfp. Div. in dos. N. X.

S. 3 proszki dziennie.

76. *Sparteini* 0'02,

Sacch. albi 0'20,

Mfp. Dtal. dos. N. X.

S. 3 proszki na dzień.

Endocarditis.

Leczenie objawowe a więc:

Spokojne leżenie w łóżku dyeta płynna, niepodniecająca. Na okolicę serca okłady zimne lub worek z lodem.

Na wewnątrz cardiacą, zwłaszcza digitalis, strophantus, wraz z bólu mierne dawki morfiny.

Przy znacznem osłabieniu: kawa czarna z cognakiem, wino mocne, kamfora lub eter podskórnice wstrzyknięty. Coffeina lub Theobromina po 0'10 na dawkę, 1'00 pro die, obok innych środków nasercowych jak Convalaria, Spartaina i t. d.

Przy gorączce wysokiej, mierne dawki antipyretyków, z obawy groźnego zapadu najlepiej razem z Coffeiną lub Theobrominą.

77. *Infus. fol. digit.* e 1'50

ad 150'00,

Coffeini citrici 5'00,

Liquor. Kali acet. 50'00,

Succ. liquir. 10'00.

S. W ciągu 2 dni użyć.

78. *Tinct. Strophanti*

Aq. lauroc. āā. 10'00.

S. 3 r. dz. po 10—20 kropli.

W zaparcie stolca:

79. *Pulv. fol. digit.*

Calomelanos āā. 0'40,

Sacchari 3'00,

Mfp. div. in dos. 10.

S. Co 3 godz. proszek (dla dzieci).

Vitia cordis.

Stosowne żywienie, mleko, mięso bez korzeni, osobom chudym więcej tłuszczów, otyłym tychże zabronić.

Wzbronione również napoje wyskokowe, prócz lekkich win. Ruch, a mianowicie po równi, lub po miernych wzniesieniach gór, z wyjątkiem, gdy chorzy dostają duszności, zawrotów głowy, lub nieregularności tętna, gimnastyka lecznicza, kąpiele solne letnie. Unikać wzruszeń. Uregulować stolec.

Wobec braku wyrównania:

80. *Infus. digitalis* e 1'00
ad 150'00,
Syrup simpl. 20'00.
MDS. Co 2 godz. łyżkę.

81. *Trac. digital.* 2'50,
Aqu. lauroc. 8'00.
MDS. 3 razy dziennie po 15 kropli.

82. *Pulv. fol. digitalis*
0'50—1'00,
Sacchari 3'00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
S. Co 2 godziny proszek.

Jeżeli po użyciu Digital. tętno mocniejsze, regularniejsze, ilość moczu większa, to przestać na parę dni podawać.

83. *Trac. strophanti*
Aqu. lauroc. āā. 10'00.
S. 3 razy dzień. po 10 kropli.
(Dzieciom od 5—10 lat do 5 kropli dziennie).

84. *Coffeini natrobenz.* 2'00,
Sacchari 5'00,
Mfp. div. in dos. 20.
S. 5—8 pr. dziennie.

85. *Theobromin natrobenz.* 0'10,
Sacchari albi 0'20,
Mfp. d. tal. dos. 20.
S. Co 2 godz. proszek.

86. *Sparteini* 0'02,
Sacch. albi 0'30.
Mfp. dtal. dos. N. X.
S. 2—3 proszk. dziennie.

87. *Inf. conval. maj.* e 6'00
ad 180'00,
Coff. natrobenzoic. 1'00,
Syr. simpl. 20'00.
D. Co 2 godz. łyżkę.

88. *Trochisci Nitroglycerin*
à 0'001,
Tal. dos. 10.
S. W razie napadu duszności osłabienia akeyi serca $\frac{1}{2}$ —1 pastylki.

89. *Kali jodati* 10'00,
Aqu. dest. 200'00.
DS. Rano i wiecz. $\frac{1}{2}$ —1 łyżki.

90. *Infus. adonis. vern.* e 5'00,
ad 180'00,
Syrup rubid. 200'00.
S. Co 2 godz. łyżkę.

91. *Sparteini. sulphur.* 0'10,
Aqu. dest. 180'00,
Syrup sacchar. 20'00.
MDS. Co 2 godz. łyżkę.

92. *Tinct. fruct. immat.*
Nerii Oleandri 10'00.
DS. 2—3 r. dzień. po 20 kropli.

Przeciw puchlinie nacięcia obrzęklej skóry, jużto lancetem lub małym trójgrańcem po czem opatrunek aseptyczny. W razie duszności, gorczycznik, na okolicę serca, moczenie nóg w gorącej wodzie, wstrzykiwanie morfiny, w razie silnego bicia serca, blaszanka z zimną wodą na okolicę serca.

93. *Tinct. lobeliae* 5'00,
Aqu. lauroc. 10'00.
DS. Co godz. 10 kropli.

Przy objawach obrzęku płuc:

94. *Inf. flor. arnicae* e 7'50
ad 150'00,
Liquor ammonii anis. 2'00,
Syrup aurant. 15'00.
MDS. Co godzinę łyżkę.

- 95.** *Flor. benzoës* 2'00,
Camphor. 0'50,
Sacchar. 3'00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
 S. Co 3 godziny proszek.

Na pobudzenie apetytu, środki gorzkie (*Tra amar. Tinct. chin. comp.*) *acid. mur.* Przy omdleniach, zawrotach głowy skutkiem anaemii mózgu, wino, eter.

Stenocardia.

Leczenie samego napadu polega na wygodnem ułożeniu chorego w jasnym niedusznym pokoju, usunięciu uciskającego ubrania, podaniu choremu trochę czarnej kawy, łyżkę wina lub cognacu.

Podskórnie wstrzyknąć morfinę lub wziewać trochę chloroformu.

Na okolicę serca synapizma, okład gorący, rozcierać kończyny, dać lewatywę z soli. Można też wziewać kilka kropli Amylnitritu, Pyridin lub Aethyljodür (według Seé).

Polecają też wewnątrznie wśród napadu: Nitroglicerynę w roztworze 0'01 na 10'0 z tego 10—20 kropli na raz, lub pastylki nitroglicerynowe po 0'001 wyrobu Mutniańskiego i innych.

Następnie leczyć chorobę przyczynową, najczęściej więc: wady sercowe, choroby nerwowe i zatrucia przewlekłe tytoniem, kawą i herbatą.

- 96.** *Natri brom.* 5'00,
Aqu. dest. 150'00.
 DS. Co 2 godz. łyżkę.
- 97.** *Tinct. lob. infl.*
 — *Valer. aeth. aā.* 10'00.
 DS. 10—20 kropli podczas napadu.
- 98.** *Natr. nitrosi* 0'5,
Sacch. albi 3'00.
Mfp. Div. in dos. X. in capsul. omylaceis.
 S. 1—2 proszki dziennie.

- 99.** *Exalgin* 2'50,
Alcohol menth. 15'00,
Aqu. dest. 190'00,
Syrup 30'00.
 DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Cardiopalms, Hyperkinesis cordis.

Usunięcie przyczyny, najczęściej stan ogólnie nerwowy, osłabienie, lub zatrucie kawą, herbatą i tytoniem. Nadto leczenie: niedokrewności i ogólnego osłabienia zwykłymi środkami. Podczas napadu przy silnej akcji serca, okład lodowy na serce, spokój, wstrzymanie się od wszelkich podniecających napitków, natomiast przy słabym działaniu serca, podać wino, cognac, czarną kawę, herbatę, nadto:

- 100.** *Coffein citrici* 0'10,
Dtur. tal. dos. N. 4.
 S. W razie napadu 1 proszek.
- 101.** *Tinct. Veratri virid.* 1'00,
Aqu. dest. 80'00,
Syr. cort. aur. 20'00.
 S. 3 łyżki dziennie.
- 102.** *Sparteini sulph.* 0'05,
Sacchari 0'30,
Mfp. d. tal. dos. tres.
 S. W razie napadu 1—2 pr.
- 103.** *Theobromin* 0'10,
Sacchari 0'20,
Mfp. dtur. tal. dos. 10.
 S. 4—5 pr. dziennie.
- 104.** *Trae strophanti,*
Trae digital. aā. 5'00.
 DS. Podczas napadu 10—15 kropli raz lub dwa dzień.
- 105.** *Tinct. convall. maj.* 8'00,
Tr. digital. 2'00.
 DS. 3 r. dz. po 10 kropli.
- 106.** *Trochisci nitroglyc.* 0'001.
 S. W napadzie pół pastylki lub całą zażyć.

107. Nitroglycerin 0·20,*Spir. vini 20·00.*

MDS. Zacząć od 1 kropli do 10 kropli 3 razy dzien. (w łyżce wody).

Osobom zaś nerwowym:

108. Kali bromat. 1—2 gram.
na raz lub też:**109. Trae Valerian. aeth. 10·00.**
S. 3 r. dz. po 15—20 kropli.

Podskórne wstrzyk. morfiny
 $\frac{1}{2}$ —1 cthr.

Morbus Basedowi.

Regularne, higieniczne życie unikanie zmęczenia fizycznego i umysłowego. wstrzymanie się od nadużywania a nawet od picia wysoku, herbaty, kawy, nadmiernego palenia. Pobyt na świeżem powietrzu, zwłaszcza w górach Davos, St. Moritz, Zakopane, Szmeks lub nad morzem.

Na okolicę serca okład zimny lub lód, zwłaszcza podczas silniejszej akcyi serca, oraz digitalis lub strophantus w miernych dawkach.

U chorych osłabionych anemicznych: żelazo, chinina, arsen, zabiegi wodolecznicze, obok systematycznego stosowania prądu galwanicznego na sympaticus (ganglion supremum i processus mastoidei).

Przetwory bromowe i nervina, woda Gubera, Levico, Roncigno, Żegiestów, Krynica, Elster, Francensbad, obok należytego odżywiania i psychicznego spokoju.

110. Natri brom.*Aq. amygd. am. āā. 15·00,**Trae convall. maj. 12·00,**Aq. dest. 60·00.*

DS. 2—3 łyżeczek na dzień.

111. Ferri lactici 1·00,*Coff. natr. sal. 1·5,**Eleosacch. foen. 5·00.**Mfp. Div. in dos. N. XX.*

S. 2—3 proszki dziennie.

Gingivitis.

Leczenie przyczyn (Periodontitis, Epulis, Stomatitis mercurialis, Stomacacae). Częste płukanie ust.

112. Kali hypermang. 0·05,*Aqu. fontis 200·00.*

DS. Płukanie.

113. Tannini 3·00,*Spirit. vini rectific. 80·00,**Bals. Hoffman. 20·00.*

MDS. Łyżeczkę na szklanke do płukania.

114. Tinct. Ratanhae*Tinct. Gallar. āā. 10·00,**Tinct. opii 1·00.*

MDS. Do płuczowania.

115. Borac. venet. 5·00,*Mel. Rosor. 50·00.*

S. Do płuczowania.

Gatarrhus ventriculi acut.

Ostry niezbyt żołądka tylko wtedy nadaje się lekowaniu, gdy domyślamy się, że w żołądku jest jeszcze treść, która takowy wywołała; dawniej stosowano w takim razie środki wymiotne a po tem przeczyszczające, dziś stosowniej robić przepłukanie żołądka, po czem chory najmniej 24 do 48 godzin musi zachowywać ścisłą dyetę. W razie gdy przypuszczamy, że treści w żołądku niema, wystarcza ścisła dyeta, i tylko gdy cierpieniu temu żołądka towarzyszy tak sama zmiana w jelitach, wskazane są środki przeczyszczające. Zresztą leczenie jest czysto przypadowe, gdy silne bóle w okolicy żołądka występują, wskazane są środki odurzające, w razie pragnienia: kwaski, woda sodowa, Giesshübelska etc.

Jako środki wymiotne:

116. Pulv. rad. Ipecac. 2·00,*Div. in dos. VI.*

DS. Co kadrans proszek aż do wystąpienia wymiotów.

117. *Tartari stibiati* 0'05,
Aqu. dest. 50'00.
 W 2-ch porcyach w przeciagu
 10-ciu minut zażyć.

118. *Apomorphini mur.* 0'10,
Aqu. dest. 10'00.
 DS. Podskórn. $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.

Catarrhus ventriculi chronicus.

1. *Acidus.*

Dyeta pożywna lekko strawna, z wykluczeniem potraw korzennych, kwaśnych, tłuszczów, jarzyn, napoi wysokowych i CO₂ zawierających. Wewnętrznie wskazane są środki alkaliczne, woda Karlsbadzka, Vichy lub Szezawnica źródło Magdaleny, przepłukiwania żołądka rozczy-nami soli alkalicznych, lub woda Karlsbadzka, w razie silniejszych bólów w dołku podsercowym środki odurzające.

Cat. ventr. chronicus 2) (mu-cosus).

Wskazana jest dyeta lekko drażniąca, a więc nieco napojów wysokowych, kwasków organicznych, mięso w możliwym rozdrobnieniu, najlepiej więc siekane. Wewnętrznie środki gorzkie i kwas solny. Masaż żo-łądka, elektryzowanie.

Ad. 1.

119. *Sal. therm. Carolin faetic.*
 lub *originalis* 100'00.
 S. Na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$
 szklanki ciepłej wody.

120. *Natrii biboracici*
Magn. nstae
Strontii bromati āā. 5'00.
 MD. 3 razy na dzień na ko-niec noża — $\frac{1}{2}$ łyżeczki
 w godzinę po jedzeniu.

121. *Natri bicarb.* 15'00,
Magn. carbon. 10'00,
Calcar. carbon. 5'00,
MD. in scatula.
 S. 3 razy dnia na koniec noża
 zażyć.

W razie bólów:

122. *Morph. mur.* 0'10,
Aquae laurocer. 10'00,
MD. in vitr. nigro.
 S. W razie bólu 10 kr. zażyć,

123. *Codeini* 0'02,
Natri bicarb. 0'25,
Magnes. carb. 0'10,
Mfp. d. tal. dos. X.
 S. W razie bólu 2—3 pr. dz.
 Ad 2.

124. *Trae Amar.*
Acid. hydrochl. dil. āā. 15'00.
 MDS. Po każdym jedzeniu 20
 kropli w łyżce wody zażyć.

125. *Acid. hydrochl.* 3'00,
Pepsin solub. german. de Ro-
stock 2'00,
Aqu. dest. 200'00,
Syr. cort. aurant. 15'00.
 MDS. Po każdym jedzeniu 2
 łyżki zażyć.

Ulcus ventriculi. Wrzód żo- łądka okrągły.

Przy świeżym wrzodzie zale-cić ścisłą dyetę co $\frac{1}{2}$ godziny łyżkę kw. mleka, woda białkowa z cukrem, okłady lodowe na żo-łądek, spokój bezwzględny, opi-um. Dalsze leczenie polega na podawaniu środków alkalicz-nych, czy to w postaci wód mi-neralnych, czy też soli alkali-cznych.

Korzystne wyniki leczenia da-ją przepłukiwania wodą karls-badzka lub rozczy-nami soli karls-badzkiej prawdziwej lub sztu-cznej, które mają i tę zaletę, że je stosować można i w razach, gdzie picie wody karlsbadzkiej z innych powodów jest przeciw-wskazanem.

- 126.** *Natri bicarbon* 40'00,
Natri sulphur. 40'00,
Natri chlorati 20'00.

Mfp. S. Łyżeczkę na litr wody do przepłukania żołądka.

W razie silnych bólów lub wymiotów są wskazane środki odnurzające, w razie krwotoków żołądkowych postępowanie lecznicze jak przy Haematemesis. Obok tego postępowania leczniczego dyeta powinna być pożywna a lekko strawna z wykluczeniem wszelkich napojów wysokokowych lub CO₂ zawierających, kwasów, tłuszczów i pokarmów korzennych. Gdy chorego z powodu silnych bólów, gwałtownych wymiotów lub żołądkowych krwotoków nie można stosownie żywić, wskazane są lewatywy odżywcze.

Często towarzyszące zaparcie stolca usuwać należy lewatywami.

- 127.** *Chloroformii* 1'00,
Aqu. dest. 120'00,
Bismuth subnitr. 3'00.

D. Co godz. łyżkę.

- 128.** *Sal. therm. Carolin.* 100'00.
 DS. Co dzień na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki letniej wody zażyć.

- 129.** *Natr. bicarb.*
Magn. ustae āā. 15'00.

MDS. 3—4 razy dziennie na koniec noża zażyć.

- 130.** *Natr. bicarb.* 5'00,
Morph. mur. 0'10,
Mfp. div. in dos. XII.
 DS. 3 proszki dziennie.

- 131.** *Morph. muriat.* 0'10—
Aqu. laurocer. 10'00.
 DS. W razie bólów 10 kr. zażyć.

- 132.** *Codeini* 0'02,
Natr. bicarb. 0'50,
f. p. dent. t. dos. XII.
 S. 2—3 proszki dzien. zażyć.

- 133.** *Magister. bismuth.* 5'00,
Codeini 0'20,
Mfp. div. in dos. X.
 S. 3 proszki dziennie.

- 134.** *Morph. mur.* 0'10,
Aqu. dest.
Glycerini āā. 5'00.

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań. W jednej strzykawce 0'01 morfiny.

Haematemesis.

Przedewszystkiem należy uwzględnić przyczynę krwotoku. Chory powinien jaknajspokojniej leżeć i wstrzymać się od przyjmowania pokarmów przynajmniej 24 godzin, a nieraz 1—2 tygodni.

Jeżeli osłabienie jest znaczne, lub chory od pokarmów wstrzymuje się dłużej, należy podawać odżywcze lewatywy.

Na okolicę żołądka okład lodowy, kawałki lodu do polykania i środki przeciw-krwotoczne, obok laudanum, cocainy lub morfiny w takich dawkach, aby znieść całkiem pobudliwość żołądka.

W razie zapadu eter podskórnie, lub ol. camphoratum lub też roztwór soli jako hypodermielgia.

Gdy wzmagająca się ostra niedokrewność wskazuje, że krwotok nie ustępuje, wstrzykiwania podskórne przetworów sporyszowych.

Po ustąpieniu krwotoków dłuższy czas spokojne leżenie w łóżku, dyeta płynna, mleko zimne łyżkami, a obok tego leczenie przyczynowe.

- 135.** *Tannini puri* 0'50,
Opii puri 0'10,
Sacchar. albi 3'00,
Mfp. div. in dos. N. V.

S. Co 2 godziny proszek, lub opium w czopkach.

136. *Liqu. ferri sesquichlor.*
guttas 10.

Aqu. dest. 200'00,

Morph. mur. 0'05,

Syr. simpl. 15'00.

MDS. Co godzina łyżkę.

137. *Extr. Secal. cornut* 2'00,
Spir. dilut.

Glycerini āā. 5'00.

DS. $\frac{1}{4}$ do jednej strzykawki
podskórnie.

138. *Tinct. haemostyplica* 15'00.

DS. 3 razy po 15 kropli.

Carcinoma ventriculi.

W przypadkach nienadających się do zabiegu operacyjnego leczenie jest przypadkowe, zmierzające do podtrzymania sił chorego za pomocą lekko strawnej a pożywnej diety oraz usuwania bólów przez podawanie środków odurzających. Prócz tego wskazane jest podawanie kwasu solnego, którego żołądek rakowato zwyrodniały najczęściej nie wydziela, oraz podawanie przetworów Condurango, przeciw objawom dyspeptycznym. W razie towarzyszącego rozszerzenia żołądka lub krwotoków vide: Dilatatio ventriculi, haematemesis.

139. *Acid. hydrochlor.* 3'00,
Pepsini german. solub de

Rostock 2'00,

Aq. dest. 200'00,

Syr. simpl. 15'00.

DS. Po każdym jedzeniu 2
łyżki zażyć.

140. *Tinct. nuc. vom.*

Acidi hydrochl. āā. 10'00.

DS. Po każdym jedzeniu 15
kropli w szklance wody.

141. *Tinct. chinae comp.*

— *rhei vin.* āā. 30'00,

Tinct. nuc. vom. 3'00.

3 razy dz. po 15—20 kropli.

142. *Cort. Condurango* 15'00,
Macera per XII. hor. c. 400'00,

Aq. dest. postea coque ad
reman. 200'00,

dein adde:

Acid. hydrochlor. 3'00,

Syr. simpl. 15'00.

DS. 3 łyżki dziennie.

143. *Vini Condurango* 100'00.

DS. 3 łyżeczki dziennie.

W razie wymiotów:

144. *Cocaini muriat.* 0'20,

Aq. dest. 10'00.

DS. W razie wymiotów 10
kropli zażyć.

W razie bólów podawać na
wewnątrz morfinę lub co-
deinę.

Dilatatio ventriculi.

Gdy przyczyną cierpienia jest
zweżenie odźwiernika bliznowa-
te, lub nowotworowe, wskaza-
ny jest zabieg operacyjny.

Chwilową poprawę osiągnąć
można przez systematycznie,
dłuższy czas stosowane przepłu-
kiwanie żołądka, raz lub 2 razy
dziennie roztworem kw. boro-
wego lub salicyl. resorcyiny, lub
w razie oddziaływ. kwaśnego
roztworem sody, soli lub wody
karlsbadzkiej.

W razie bólów wskazane są
środki odurzające i to lepiej pod-
skórnie niż wewnętrznie, gdyż
w wypełnionym i rozszerzonym
żołądku trudno ulegają wssaniu.

W razie; gdy przyczyną cier-
pienia jest zwiotczenie ścian żo-
łądka, należy przepisać dietę
pożywą, w małych ilościach a
często podawaną z wykluczeniem
o ile możliwości płynów; co dzień
na czczo uwolnić żołądek zapo-
mocą aspiratora żołądkowego od
zalegającej treści, a w razie to-
warzyszącego nieżytu żołądka,
takowy stosownie leczyć.

Skutecznie też działają zabiegi wodolecznicze, mięsienie i prąd indukcyjny, w okolicę żołądka stósowane.

W celu wzmocnienia mięśni żołądka: ipecacuanha 0·02—0·05 w przeciągu 24 godz., raz w pół godziny po jedzeniu, drugą dawkę (0·01) po całej godz. Extr. Bellaon. po 0·01—0·02 na dawkę.

Przy zaparciu stolca: przed jedzeniem dwie łyżeczki: Sulphat Magnes., Cremor tartari, et flor. sulphur. aa. p. aeq. Lewatywy z gliceryny. Jeżeli po jedzeniu występują bóleści, poleca się 2—4 łyżek wody chloroformowej lub morfinę z magnezją lub sodą. Przeciw wzdęciu: kreda, węgiel, magnesia w bardzo małych ilościach.

Dyspepsia nervosa.

Przedewszystkiem wykryć przyczynę cierpienia i dokładnie zbadać funkcję żołądka i kiszek.

Cierpienie to najczęściej stoi w związku z czynnościowym, nadmiernem wydzielaniem soku żołądkowego, lub z niedomogą wydzielniczą żołądka.

Stosownie do tego w 1-szym przypadku wskazane są środki alkaliczne, wody: Karlsbad, Vichy, Szczawnicka Magdalenska, w 2-gim kwas solny i środki gorzkie.

W innych razach zboczenia w wydzielaniu soku żołądkowego niema, tylko błona śluzowa żołądka jest nadczulą, a w tych przypadkach należy przed jedzeniem podawać środki znieczulające (cocaina) i zapomocą przepłukiwań żołądka zmniejszać przeczulicę błony śluzowej, można też podawać przetwory bromowe.

Prócz tego należy zwrócić uwagę na ogólny stan chorego, u anemicznych wskazane są środ-

ki żelaziste (Krynica, Żegiestów, Francensbad i t. d.) u neurasteników i hysteryczek skutecznem bywa leczenie wodolecznicze, wyjazd nad morze lub w góry.

145. *Natri bicarbon.*

Magn. carbon.

Kali carbon. aa. 5·00,

Pulv. rad. Rhei 7·00,

MD. in scatula.

S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć, w razie jeżeli jest nadmierne wydzielenie soku żołądkowego.

146. *Sal. therm. Carolin 100·00.*

DS. Co dzień rano łyżeczkę w pół szklanki ciepłej wody.

147. *Strontium brom. 2—3·00.*

Po obiedzie i po kolacyi.

W razach niedomogi wydzielniczej:

148. *Acid. hydrochl. 3·00,*

Pepsini German. solub de Rostock 2·00,

Aqu. dest. 150·00,

Syr. simpl. 15·00.

MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

149. *Acid. hydrochl. dilut.*

Trae absinthi aa. 15·00.

DS. Po każdym jedzeniu 20 kropli w łyżce wody zażyć.

U anemicznych z niedomogą wydzielniczą:

150. *Sol. Fowleri 5·00,*

Tinct. mal. ferri 10·00.

DS. Po obiedzie i kolacyi od 10—30 kropli.

151. *Trae ferri pomati 25·00,*

Trae Rhei vinosae

Trae amarae aa. 15·00.

MDS. 3 razy dnia po łyżeczce zażyć.

152. *Ferri carb. sacchar. 5·00,*

Exlr. nucis vomicae 0·50,

Pulv. et extr. Rhei aa. q. s. ut f. pill. N. 100.

DS. 3 razy dnia po 2 pigułki zażyć.

Cardialgia.

Znaleść przyczynę bólu i takową starać się usunąć. Najczęściej: ulcus ventriculi, carcinoma ventriculi, chlorosis, i u hysteryczek, neurastheników lub jako crises gastriques.

W razie napadu ciepły okład na żołądek, synapizmy na dołek podsercowy, wstrzyknięcie podskórne morfiny, narcotica jak: opium z bismuth. subnitricum, Cocaina 0·01—0·02 p. dosi, Belladonna, Chloroform itp. Nadto uregulowanie dyety.

153. *Tinct. opii croc.* 5·00,

Tinct. castor. 10·00,

Tinct. valer. aeth. 15·00.

MDS. 3 r. dz. po 10 kropli.

154. *Morphii mur.* 0·05,

Bismut. subnitr. 0·30,

Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 10.

S. W razie bólu co 2 godziny proszek.

155. *Extr. Strychni* 0·01,

Bismut. subnitr.

Magnes. carb. āā. 0·20,

Sacch. 0·20,

Mfp. tal. dos. 10.

S. Co 2 godz. proszek.

156. *Tinct. Strychni,*

Tinct. Opii āā. 5·00.

DS. Co 2 godz. po 10 kropli w razie silnego bólu.

157. *Cocain. mur.* 0·15,

Aq. dest. 120·00,

Syr. aurant. 30·00.

S. Co kwadrans łyżeczkę.

158. *Chloroformii* 1·00,

Aq. dest. 150·00.

MDS. Co 1—2 godz. łyżkę.

159. *Bismut. valerian.*

Bismut. subnitr. āā. 2·00.

Extr. nuc. vom. 0·50,

Extr. gentian. q. s. f. pil. 50.

Obduc. gelat.

S. 2—3 pig. na czczy żołądek.

Prąd stały z anoda na dołek podsercowy, lub też przerywany

na 6—10 minut. Przepłukiwanie żołądka ciepłą wodą na 38—40°.

Catarrhus intestinorum

Acutus.

Wskazane jest leżenie w łóżku, ścisła dyeta, okład ciepły na brzuch i środek przeczyszczający, najlepiej ol. ricini. W razie silnych bólów, leki odurzające; w razie, gdyby po kilku wypróżnieniach po środku czyszczącym biegunka nie ustąpiła, przetwory makowca, także leki zawierające i ściągające.

Chronicus.

Leczenie powinno być przyczynowe, uważać należy na dyetę, która powinna być lekko strawną, unikać zaziębień (opaska flanelowa na brzuch). Woda karlsbadzka, Kissingen, Wildungen, w razie zaparcia środki lekko czyszczące, lewatywy codziennie. Vidē: (Obstipatio alvi).

160. *Saloli* 0·25,

Laud. puri 0·02,

Mfp. div. in dos. 10.

S. 3 proszki dziennie.

161. *Bismut. salicyl.* 0·25,

Resorcin 0·15,

Laud. pur. 0·01,

Mfp. tal. dos. XII.

S. 3 proszki dziennie.

162. *Decoct. rad. Salep* 200·00,

Laudani puri 0·05,

Syr. Diacodii 20·00.

MDS. Co godz. łyżkę.

163. *Mixturae gummos.* 150·00,

Trae Opii simpl. gutt. 20.

S. Co godz. łyżkę.

164. *Cotoini puri* 1·00,

Emuls. amygdal. 60·00.

S. Co $\frac{1}{2}$ godz. 2 łyżki zażyć (Środek b. drogi).

165. *Extr. Opii 0'02,*
Tannini 0'10,
Naphtalinae 0'25,
Mfp. d. t. d. XII.

DS. 2—3 proszków dziennie.

166. *Pulv. Doveri 1'00,*
Extr. Colombo,
Sacch. albi āā. 2'00,
Mfp. div. in dos. X.

DS. Co 2 godz. proszek zażyć.

Proctitis.

Leczenie ogranicza się do stosowania lewatyw oczyszczających i zawierających środki ściągające i przeciwnie, zwłaszcza kw. borowy 2% lub Natr. Salicyl., obok tego z powodu towarzyszącego parcia na stolec czopki ze środkami odurzającymi i letnie kąpiele nasiadowe. Najważniejszym jest jednak leczenie przyczynowe. Użyć można: Zinci sulph. 1'00 do lewatywy lub czopki z Acid. tannicum lub z morphiną.

Obstipatio alvi habitualis.

Usunąć przyczyny cierpienia, środki lekko czyszczące, dieta mięszana, kompoty, jarzyny, owoce, figi, miód, pierniki, zimna woda na czczo, u chorych, którzy znoszą mleko, dawać takowe w sporych ilościach. Nieraz dobre skutki wywiera kuracja wynagronowa.

Na now okłady wysychające na brzuch. Elektryzowanie prądem przerywanym.

Obok tego zabiegi hydropatyczne, mięsienie, codzienne lewatywy, wody mineralne: Karlsbad, Marienbad, Hunyady, Janos, Kissingen (Rakoczy), Saidschütz, Friedrichshall, proszki Seidlkie.

167. *Decoct. pulp. Tamarind*
e 15'00. ad 150'00,
Cremor. tartari 15'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę lub na noc 3—4 łyżek — lub też powi-

delka Tamaryndowe wyrobu Sobiajskiego lub Siedleckiego.
 Ziółka francuskie St. Germain.

168. *Trae Rhei vinos.*
Extr. fluid. Cascar. Sagr.
āā. 25'00.

DS. 2 razy dnia po $\frac{1}{2}$ do 1ej łyżeczki.

169. *Extr. Aloë aquos.*
Extr. taraxaci āā. 5'00,
f. pil. N. 50.

S. Rano i wieczór po 1—2 pigulek.

170. *Trochisci compressi e Rho*
ā 0'50 N. 50.

DS. Co dzień na noc 1—3 pastylek.

171. *Trochisci compréssi e Cas-*
car. Sagrad ā 0'50 N. 50.

S. Co dzień na noc 1—3 pastylek.

172. *Sal. therm. Carolin. 100'00.*
 DS. Co dzień na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody.

173. *Natri bicarb.*
Magnes carbon. āā. 10'00,
Pulv. rad. Rhei 7'00.

DS. 2 razy dnia na koniec noża.

Nadzwyczaj zalecają:

174. *Podophyllini 0'30,*
Extr. aloes
Extr. rhei āā. 3'00,
Extr. taraxaci q. s. f. pil.
N. 40.

S. Na noc 1—3 pigulek.

Przy uporczywym zaparciu, wlać przez wysoko do rectum wprowadzoną sondę: 70 gr. aether sulph. z 300 gr. Aq. foeniculi.

Typhlitis et Perityphlitis.

Leczenie zewnętrzne polega na stosowaniu środków przeciwzapalnych i odwodzących: okład lodowy, pijawki, smarowanie jodyną. W przypadkach, gdy chory uie znosi okładów lodowych

— okład wysychający. Nie zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Wewnętrznie przetwory makowca w dużych dawkach, a w razie gwałtownych bólów, podskórne wstrzyknięcie morfiny. Dyeta wyłącznie płynna, bezwzględny spokój.

Gdy okres zapalenia minie, środki przyspieszające wessanie wypociny są wskazane, więc: okłady ciepłe, wcieranie maści jodowych. Jeżeli stolce w tym okresie dobrowolnie nie nastąpią, należy je ułatwić za pomocą lewatyw. Zresztą leczenie czysto przypadkowe, w razie silnych wymiotów, kawałki lodu do polykania, Cocaina.

W razie zapadu, napoje wyskokowe. eter podskórnie.

175. *Trac. opii simpl.* 10·00.

DS. 3 razy dziennie po 5—10 kropli.

176. *Extr. opii* 0·02,
Sacchari albi 0·30,
Dent. t. dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

W razie silnych wymiotów:

177. *Cocain muriat.* 0·20,
Aqu. dest. 10·00.

MDS. W razie wymiotów 10 kropli zażyć.

178. *Morphii mur.* 1·00,
Spir. vini 5·00,
Glycerin 10·00,
Aq. dest. ad 30·00.

DS. Do podskór. wstrzykiw.
(Rozezyn bardzo trwałe).

Jako przyspieszające wessanie:

179. *Ung. Kali jodati* 25·00.
DS. Do wcierania.

180. *Kali jodati* 2·00,
Extr. bellad. 0·50,
Ung. simpl. 30·00.
MDS. Do wcierania.

W razie parcia na stolce lub mocz:

181. *Morph. mur.* 0·20,

Butyri Cacao 10·00,

Mf. l. a. supposit. N. X.

S. 2—3 na dobę użyć.

Ulcera intestini tuberculosa.

Leczenie czysto przypadkowe, polega na podawaniu środków odurzających wewnętrznie lub w postaci wstrzykiwań podskórnych. W razie silniejszych bólów na podawaniu przetworów makowca wraz ze środkami ściągającymi i przeciwnieżylnymi z powodu zwykle towarzyszącej biegunki. Przytem należy starać się podnieść odżywienie chorego za pomocą odpowiedniej diety (do mleka dodawać Aq. Calcis).

182. *Tinct. opii simpl.* 10·00.

DS. 2—3 r. dnia po 5—10 kropli.

183. *Laudani puri* 0·02,

Tannini 0·10,

Naphtalini 0·25,

Sacch. alb. 0·30,

Mfp. dent. tal. dos. XII.

DS. 2—3 proszki dziennie.

184. *Benzonaphtholi*

Bismut. salicyl

Resorcin aa. 0·20.

Mfp. dtur tal. dos. N. 15.

S. 3—5 proszków dziennie.

185. *Tinct. Colombo*

— *Cascarillae aa.* 15·00.

DS. Co godzinę 10—30 kropli w kleiku.

186. *Extr. opii* 0·02,

Resorcini 0·20,

Sacch. alb. 0·30,

Mfp. dent. tal. dos. XII.

DS. 2—3 proszki dziennie.

187. *Decoct. rad. Colomb.*

e 10·00 ad 150·00,

Tinct. opii gtt. XX.

Syr. simpl. 15·00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

- 188.** *Bismuth. subnitrici* 5·00,
Opii puri 0·02,
Sacch. alb. 4·00.
Mfp. Div. in dos. N. X.
 S. 3 proszki na dzień.

Haemorrhoids.

Należy się starać codziennie o należyte wypróżnienie przez podawanie środków lekko przeczyszczających, wodę karlsbadzką i t. p.

Gorące kąpiele nasiadowe, irygacye odbytnicy usuwają czasami cierpienie.

W niektórych znów razach, nadaje się bardzo sonda chłodząca tak zw. Arzbergera przyrząd.

Oprócz tego można próbować czopków z ergotyny, chrysorabinu, lewatyw ściągających, wstrzykiwań czystego kwasu karbolowego do guzów.

Jedynie pewnym środkiem jest tylko operacya. Guzy wypadnięte należy odprowadzić do wnętrza, jeżeli jednak już przeszły w stan zapalny lub zgorzelinowy, najlepiej ograniczyć się do posypywania proszkiem jodoformowym i okładów z octanu glinowego.

Przeciwno uporczywemu śwędzeniu najskuteczniejsze są zmywania wysokiem.

- 189.** *Pulv. liquir comp.* 50·00.
 S. Łyżeczkę wieczór zażyć.

- 190.** *Sal. thermar. Carolinens.* 50·00.

S. Łyżeczkę w szklance letniej wody rozpuścić.

- 191.** *Extr. secal. corn.* 2·00,
Butyr Cacao q. s. f. l. a.
supposit. N. X.

- 192.** *Chrysarobin* 0·80,
Jodoformii 0·30,
Extr. bellad. 0·60,
Vaselin. 15·00.

Mf. ung. S. Maść.

- 193.** *Plumb. acetici* 0·25,
Extr. Opii aquos. 0·05,
But. Cacao q. s. ut f. supp.
Dtal. dos. N. X.
 S. 2—3 czopki przez dzień.

- 194.** *Calomel* 2·00,
Morphini 0·15,
Bism. subnitr.
Vasellini aa. 25·00,
Glycerini 8·00.
M. f. ung.
 S. Zewnętrznie.

- 195.** *Cocain hydrochl.* 1·00,
Morphii sulph. 0·20,
Atropin sulphur. 0·10,
Tannin. 0·20,
Vaselin 30·00.
 Mf. ung. S. Po wypróżnieniu posmarować.

- 196.** *Extr. Hamamel. virg. fluid.* 0·20,
Butyri Cacao 10·00,
Ol. amygdal. 7·50.
 Mfung. S. W razie krwotoków.

Ileus.

Jeżeli przyczyną niedrożności jelit jest zwężenie, okrucenie, uwiąznięta przepuklina, nie wiele można się spodziewać z leczenia środkami wewnętrznymi, należy przystąpić do zabiegu operacyjnego, przedtem jednak należy przez podawanie przetworów mاکowca uspokoić gwałtowne ruchy jelit i zapomocą dużych lewatyw próbować przywrócić drożność. Lewatywy z wody sodowej: łączy się syfon z sondą do odbytnicy włożoną i powoli wypróżnia. Gdy powodem niedrożności jelit jest uwiąznięta przepuklina, należy starać się ją odprowadzić (vide *Hernia incarcerata*). Jeżeli niedrożność jelit pochodzi z wglóbień, udaje się często zapomocą przetworów mاکowca i lewatyw drożność przywrócić. W nowszych czasach polecają prócz tego, wypróżnienie żo-

ładka zapomocą aspiratora żołądkowego.

Gdy te środki nie skutkują, nie należy długo zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Gdy przyczyną cierpienia jest zaparcie kału, a nie ma objawów zadrażnienia otrzewnej, należy podawać środki przeczyszczające w dużych dawkach, w razie przeciwnym lub, gdy środki czyszczące nie skutkują, przetwory mاکowe, okład lodowy na brzuch, kawałki lodu do polykania, zresztą leczenie przypadowe.

Peritonitis.

Przedewszystkiem chory powinien zachować bezwzględny spokój; dyeta ściśle płynna. Wewnętrznie należy podawać przetwory mاکowe w dużych dawkach, a w razie silnych wymiotów kawałki lodu do polykania i cocaine lub morfinę. Zewnętrznie środki przeciwzapalne, okład lodowy, pijawki, pędzlować brzuch Kleiną z dodatkiem jodoformu. Gdy okres ostry minie, okłady wysychające lub ciepłe. Kąpiele ciepłe całe lub nasiadowe.

W przypadkach surowiczego zapalenia z przebiegiem chronicznym, może być czasem wskazane wypuszczenie płynu z jamy brzusznej, a nawet t. z. tualeta jamy brzusznej.

Peritonitis chronica, zwłaszcza u dzieci, wymaga dobrego odżywiania, wcieranie szarego mydła na ściany brzucha, kąpiele solne (Iwonicz, Rabka), kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa), Punkeya.

Na wewnątrz: żelazo, jod z żelazem, Syrup ferri iodati.

P. tuberculosa: leczyć według tychsamych zasad, wcierać masę jodoformową 25:0 na 100 Vaseline, a następnie brzuch pokryć

ceratką Billrotha i opasać cały brzuch flanelą, punkeye wykonywać tylko w ostateczności.

197. *Antipyrin* 10·00,

Aqu. dest. 150·00.

DS. 2 łyżki do lewatywy co 2 godziny, póki gorączka nie spadnie do 38.

198. *Laudani pur.* 0·02,

Sacch. albi 0·30,

Dtur. tal. dos. XII.

S. 3 pr. dziennie.

199. *Cocaini mur.* 0·15,

Aqu. dest. 10·00.

DS. W razie wymiotów 10—15 kropli zażyć.

200. *Emuls. commun.* 200·00,

Aqu. lauroc. 5·00,

Morphii mur. 0·05,

Syrup simpl. 10·00.

MDS. Co godz. łyżkę.

W razie parcia na stolec:

201. *Morphii mur.* 0·01,

Extr. bellad. 0·02,

Butyri Cacao 1·00,

f. suppos. dtur. tal. dos. X.

S. W razie parcia jeden czopek użyć.

202. *Jodoform* 5·00,

Lanolin

Vaselin āā. 25·00.

Mfng. S. Rano i w. wcierać.

Icterus.

Leczenie powinno być przede wszystkim zastosowane do przyczyny cierpienia, (vide *Catarrhus gastro-duodenalis*, *Cholelithiasis*, *Cirrhosis hepatis*, *Carcinoma hepatis* etc.). Zresztą leczenie przypadowe, w razie bólów w okolicy wątroby, okład ciepły i wstrzykiwania podskórne morfiny.

Swędzenie skóry łagodzią ciepłe kąpiele z dodatkiem sody i zmywania 2% kwasem karbowym, z dodatkiem sody lub rozczyn:

- 203.** *Acidi carbol.* 10·00,
Chloralhydr. 5·00,
Aq. dest. 500·00.
S. Do nacierañ.

Dyeta przeważnie mleczna i rosółowa (unikać mięsa).

- 204.** *Iufus. rad. rhei* e 10'00
ad 180'00,
Magnes. ustae 5'00,
Syr. simpl. 20'00.
MDS. Co 2 godz. łyżke.

W chronicz. przyp. wody
Karlsbad, Maryenbad. Przeciw
nieguncie Bismut, Dover, opium.
Przytem amara np.:

- 205.** *Fol. trifol. fibrin*
Hb. Millefolii
Centaur. min.
Fol. menth. pip.
Fruct. foenicul. āā. 30.00,
Mf. Species.
 S. Herbata: 1—2 łyżek na $\frac{1}{2}$
 litra wody.

W nowszych czasach używano z dobrym skutkiem wlewania zimnej wody w 1-szym dniu na 12–13° R., w 2-gim 15–16° 3 i 4-go dnia 18–20° w ilości 1–2 litrów.

- 206.** *Natri salicyl.* 1'00,
Natri sulfur. 3'00.
Dtal. dos. N. XII.
S. Na dzień 1—2 proszki. żeby
żeby wypróżnienie wywołać.

- 207.** *Podophyllin* 0·015,
Extr. bellad. 0·01,
Extr. nuc. vom. 0·02,
f. pill. N. 1. tales 20.
 S. 2—3 pig. na noc w ciągu
 godziny użyć.

Cholelithiasis.

Leczenie 1-mo samej choroby.
2-do napadu kolki wątrobowej.

Ad 1. Uregulowanie diety, ściśle uwaga na oddawanie stolca, z diety wykluczyć należy przede wszystkim tłuszcze i kwasy, oraz napoje wysokokowe. Prócz

tego środki rozpuszczające złoże żółciowe, a tu należą wody mineralne (Karlsbad, Ems, Vichy etc.) i środki Duranda; w niektórych przypadkach radzą zrobić zabieg operacyjny.

Ad 2. Podczas napadu okład ciepły na okolicę wątroby, podskórne wstrzykiwania środków odurzających.

- 268.** *Aether. sulph.* 15·00,
Ol. Terebinth. rectific. 10·00.
 DS. 3 r. dnia po 15—20 kropel.
 (Środek Duranda).

- 209.** Extr. belladon. 0·10,
Agu. dest. 20·00.
MDS. W napadzie co 1/2 godz.
po 15 kropli.

- 210.** *Morph. mur.* 0·10,
Aqu. dest.
Glycerini āā. 5·00.
MDS. Do podskórnych wstrzy-
kiwań, w jednej strzykawce
0·01 morfiny.

- 211.** *Natri Salicyl.* 0·50,
Extr. bellad. 0·01,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
S. 4 proszki dziennie w wo-
dzie sodowej.

Polecają też glicerynę w dawce 20—30 grm. w razie napadu. W dawce 5—15 grm. w wodzie alkalicznej kilka razy dziennie dla zabezp. od napadu.

lub

- 212.** *Ol. olivar. optim.* 200'00,
Cognaci 20'00,
Vitelli ov. Nr. 2,
Menthol. 0'20.

DS. W przeciągu godziny na
2 razy użyć.

- 213.** *Natri salicyl.* 1·00,
Natri sulphur. 3·00–5·00.
Mfp. *Dtal.* *dos.* *N.* *XV.*
S. 2–3 proszki dziennie stó-
sownie do ilości wypróżnień.

Cirrhosis hepatis.

Leczenie polega na podawaniu środków lekko czyszczących, najlepiej solnych, uregulowanie dyety, z której napoje wysokie wykluczyć należy, polecając też ścisłą dietę mleczną, jeżeli chory przebył kile, to należy zastosować wciérki szaruchy a po tem kal. jodatum.

Przeciw nagromadzeniu się płynu w jamie brzusznej, środki moczopędne, gdy te nie są dostateczne i wobec indicatio vitalis, nakłucie powłok brzusznych i wypuszczenie płynu.

Jako moczopędne:

- 214.** *Calomelanos* 0·10,
Sacch. albi 0·30,
Mfp. Dtur. tal. dos. N. XV.
 DS. 5 proszków dziennie.

Przy czem jednak należy zwrócić baczną uwagę na działą.

- 215.** *Theobromini natrosalicyl.*
(vel Diuretin) 0·50,
D. tal. dos. N. XV.
 DS. 5 proszków dziennie.

- 216.** *Inf. fol. Digit.* 1·00:200·00,
Liqu. Kali acet. 20·00,
Trac cort. aurant. 25·00.
 MDS. Co godz. łyżkę.

- 217.** *Inf. Juniperi* 15·00:200·00,
Syr. simpl. 15·00.
 DS. Co godz. łyżkę.

- 218.** *Kali jodati* 10·00,
Aq. dest. 200·00.
 MDS. 2 łyżki dziennie.

Morbus Brighti.

Jeżeli mamy do czynienia z ostrym Morb. Brighti, to chory powinien bezwarunkowo leżeć w łóżku, w jednostajnie cieplej temperaturze. Dyeta złożona z mleka, kleików, rosółów, lekkich zupek, trochę kaszki, lub ryżu w mleku. Do picia wodę selterską, bilińską, gieshübelską, ubogim zaś zwykłą wodę

z dodatkiem cytryny lub kwasu, uważać przytem by stolce były regularne.

Na okolicę nerek stawiać bańki suche, nawet cięte lub pijawki, jeżeli mocz bardzo krwawy i zawiera wiele białka.

Jeżeli opuchliny są znaczne, to polecić kąpiele gorące zaczynając od 28° R. do 30° i 32° R. po 15—45 minut, ze zlewaniem na głowę, następnie zawiązać się choremu w koce na 1—2 godzin, żeby się dobrze poccił. Jeżeli chory czuje się w kąpielu bardzo osłabionym, dać można kieliszek wina. Albo też urządzić choremu w łóżku sztuczną parówkę za pomocą przyrządu opalanego spirytusem. Obok tego można dawać mierne dawki cardiaców, jak digitalis, strophantus lub coffein dla połączenia działania napotnego z moczopędem. Wstrzykuje się też pilokarpinę po 0·01—0·02 na dawkę, uważając jednak czy nie nastąpi zapad. Obok napotnych i moczopędnych polecają silne środki przeczyszczające jak colocynth, Jalapa, gumi gutti, Rheum, nawet pig. Morisona.

W razie przypadków mocznicowych, kąpiel gorąca ze zlewaniem zimnem, silny laxans, podskórnie eter lub kamfora, albo też do lewatywy Hydras chlorali 2—3 gramów lub Acid. benzoicum po 0·2 co 2—3 godz. Zob. Uraemia.

Jeżeli okres przewlekły, chory niekoniecznie ma leżeć w łóżku, zwłaszcza, jeżeli opuchliny nieznaczne.

Dyeta przeważnie mleczna, 2—4 litry mleka, jaja, mięsa mniej, jarzyny, żadnych alkoholików i korzeni.

Do picia wody: Bilińska, Giesshübel lub woda z kwaskami. Unikać zmęczenia fizycznego, odziewać się ciepło, nie nara-

zać się na niepogodę i zmiany temperatury.

Choremu należy polecić mierne dawki tanniny lub Plumb acet, Ferr. sesquichloratum obok ciepłych kąpiel, mniej energicznie stosowanych jak w okresie ostrym i zawijania w koce. Nadto podawać diuretica: Coffein 1·0—1·50 p. die, theobrominum salicyl. w tych samych dawkach, digitalis, adon. vernalis z dodatkiem Liq. kali acet. 15—20 na 200.

219. *Fol. Joborandi* w naparze.
Rad. Onodinis, *Rad. Tetro-*
Petroselini, *Bacc. Juniperi*
jako ziołka.

W razie zaparcia stolca, środki przeczyszczające.

220. *Diuretini* 5·00,
Aq. dest. 100·00,
Syr. aurant. 15·00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

221. *Strontii lactici* 50·00,
Aqu. dest. 250·00.

MDS. 2 łyżki dziennie.

Nadto radzą:

222. *Blatt. orient.* 2·00,
Eleosacch. foen. 5·00.
Mfp. div. in dos. N. XII.
S. 2—3 proszki na dzień.

Pyelitis.

Jeżeli jest okres ostry zapalny: Chory ma leżeć w łóżku, suche bańki w okolicy nerek, dyeta tylko płynna, przeważnie mleczna, najlepiej mleko pół na pół z wodą wapienną, picie wody: Bilińska, Giesshübler, Fachingen, Preblau, Ems, Gleichenberg, Szczawnica, wystrzegać się kawy, herbaty, korzennych zapraw i napitków wysokowych.

Przy cierpieniu przewlekłym dyeta mniej ścisła, z unikaniem jednak wszelkich napojów wysokowych i korzeni.

Ze środków wewnętrznych można polecić odwar; *Fol. uvae ursi* 15·0 na 300·0 z tego co godzina łyżkę, lul fliżankami pić. Lub *Arbutini* 2—3 grm. pro die w proszkach (środek drogi mało skuteczny).

223. *Ol. ligni santali* 3 razy po 10—15 kropli w kawie lub mleku. *Kali chloric.* 4—6·0 na 200·0 z tego co godzinę łyżkę.

Dobrze też działa Tannina z opium:

224. *Tannini* 0·30,
Opii 0·02,
Mfp. d. tal. dos. N. X.
S. 3—5 proszki dziennie.

225. *Arbutini* 3·00,
Aqu. dest. 150·00,
Syr. simpl. 15·00.
DS. Co 2 godz. łyżkę.

226. *Saloli* 0·50,
Dtal. dos. N. XII.
S. 3—4 proszki dziennie.

Również:

Natr. salicyl. po 0·50,
3—4 razy na dzień.

Polecić też można do picia wodę sodową kwaśną (Rząca i Chmurski), kąpiele nasiadowe ciepłe, okłady wysychające, w razie bólów na wewnątrz lub podskórnym morfinę. Zresztą trzeba leczyć główną przyczynę choroby.

Nephrolithiasis.

Zalecić wody alkaliczne (Karlsbad, Vichy, Ems, Kissingen, Salvator, Wiesbaden, woda litowa Rzący i Chmurskiego. fiaszkę dziennie. Zabronić zbytniego pożywiania mięsa, za to więcej jarzyn, mleka, w ogóle dużo płynów.

Napoje wysokowe w małej ilości; kwaśne napoje i potrawy

wzbronione. Mierne używanie ruchu.

Przeciw krwotokom z nerek Ergotin, Tannin. Przeciw kolce nerkowej, narcotica: Morfina, Opium, dalej Urethan 3—40 dziennie. Ciepłe kąpiele, bańki suche, nacieranie oliwą z chloroformem, ciepłe okłady. Wstrzykiwania morfiny.

227. Butyl Chloral 5'00,
Aqu. dest. 120'00,
Spir. vini rectific. 10'00,
Glyceatin 2'00.

DS. 2—3 łyżek jedna po drugiej.

228. Lithii carbon.
Natri bicarb. ũā. 0'50,
Tal. dos. N. X.
S. 3 pr. dziennie.

229. Piperazini 5'00.
Div. in dos. X.

DS. 3 razy dziennie w opłatku, w wodzie sodowej lub Giesshübelskiej.

Meningitis cerebro-spinalis epidem.

Leczenie objawów. Rozpocząć podaniem Calomelu, w dużych dawkach, a następnie dbać, by były dobre codzienne wypróżnienia. Łód na głowę i na kark, lub zastosować przyrząd Leitera. pijawki, bańki wzdłuż kręgosłupa. Wcieranie szaruchy na ogoloną głowę lub maści jodoformowej. Wstrzykiwanie morfiny, chloral i natrum bromatum. Natrum jodatum (1—2 gramów dziennie). Przeciw gorączce: Antipiryna, wobec obrzęku stawów acid. Salicyl.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe, Cocain. muriatic. (1:10, po 5 kropli).

230. Jodoformii 5'00,
Vaselini 50'00.

Mfung. DS. Wcierać 2 razy na dzień w głowę.

Apoplexia cerebri.

Chorego położyć w łóżku okład lodowy na głowę, jeżeli osoba krwista, dobrze odżywiona i jest się obecnym prawie na początku udaru, to krew puścić najwyżej 500 gram. lub pijawki za uszami postawić. Nadto dać zaraz lewatywę z octu, mydła, lub soli tak, żeby nastąpiło silne przeczyszczenie; synapizma na łydki i piersi, nacieranie kończyn. Jeżeli tetno słabe i zapad jest, to podać wino, kawę czarną, kamforę, eter podskórną. Gdy udar minął, to choremu nie pozwalać wstawać z łóżka, okład lodowy dalej mieć na głowie, stolce regulować, wody gorzkie Hunyady, Janos, Morszyńska, dyetę płynną niepodniecającą, a ze środków wewnętrznych digitalis lub Tinct. Strophanti dla uspokojenia akcji serca.

W kilka tygodni po ataku, gdy reakcja zapalna minie, podawać kali jodatum, elektryzować kończyny porażone, masować, ruchy bierne wykonywać i działać zapobiegawczo, usuwając główną przyczynę udaru (najczęściej zmiany w sercu i tętnicach).

Myelitis.

W ostrej:

Ułożenie chorego równo w łóżku, najlepiej na poduszkach powietrznych. Bańki cięte lub pijawki w samym początku choroby, potem Tra. jodi, wciarki z Ung. cinereum 3—4 grm. p. die i jednocześnie kali jodatum, jeżeli była lues, a nawet jako środek przeciwzapalny.

Uważać przy tem na ślinotok, lodowe okłady na stos pacierzowy. Równocześnie silne środki przeczyszczające: Kalomel, Jalapa, Senna. Uważać na odleżyny, na zatrzymanie moczu.

W przewlekłej formie:

Kąpiele ciepłe, wyjazd do Cieplie, Gasteinu, Trenczyna, Wildbadu, Swoszowic, Piszczan, Lubienia itp. wód. Elektryzowania prądem stałym i faradycznym. Na wewnątrz kali jodatum z 10:200, 2 łyżki dziennie. Arg. nitricum 0.01—0.02 w pigułkach, arsen po 0.001 lub Ergotyne po 0.10—0.50 2—3 razy dziennie (skutek jednak wątpliwy).

Tabes dorsualis.

Jeżeli tabes na tle kilowem, to wcierania i kali jodat.

W innych przypadkach kąpiele letnie lub ciepłe, procedury hydropatyczne, elektryzowanie stosu pacierzowego prądem galwanicznym, mniej polecane prądem faradycznym. Pędzlowanie stosu pacierzowego c. Tra jodi.

Na wewnątrz Arg. nitricum 0.01—0.02 w pigułkach.

231. *Argenti nitrici* 1.00,
Argill. 10.00,
F. c. aq. dest. qu. s. pil. N. 100.
Consp. c. pulv. cinom.

S. Przez 8 dni po 1 pigułce, następnie po 2—3.

Kali jodatum 10:200, Arsen po 0.001, Ergotyna po 0.1—0.5 2—3 razy dziennie, Fosfor po $\frac{1}{10}$ miligr. do 1 miligr., w roztynach oleistych, mały dają rezultat dodatni.

Wieszanie chorego sposobem Moeztkowskiego i Charcota małe korzyści przynosi, jednak czasem ulgę sprawia.

Zresztą leczenie symptomatyczne, zwłaszcza kojenie bólu środkami narkotycznymi, phenacetina po 0.50 2—3 razy dzien., exalgina po 0.25 2—3 proszków na dzień, antipyrina 1.0, 3—4 na dzień, wstrzykiwania morfyny.

Chorych zamożniejszych wysłać po Nauheim. Teplitz, Wild-

bad, Ragaz, Pyrmont, Elster, Gastein, Piszczany, Trenczyn.

232. *Liniment volatil* 30.00,
Chloroform 20.00.

MS. Do nacierania.

Neuralgia intercostalis.

Przedewszystkiem wysledzić przyczynę, najczęściej malaria, wtedy Chininę i Arsen.

Elektryzowanie, wcierania kojących maści. Wstrzykiwania morfyny lub antipyriny. Jeżeli przyczyna jest liszaj (herpes) pudrować lub smarować maścią cynkową lub morfinową.

233. *Chloroformii* 10.00,
Ol. hyosc. cocti
Ol. olivar. aa. 20.00.

MDS. Do nacierania.

234. *Extr. Opii aquos.* 2.00.
Spir. aromat. 100.00.

DS. Do wcierania.

235. *Veratrini* 0.50,
Chloroformii 10.00,
Spiritus 50.00.

MDS. Do nacierania.

236. *Antipyrin.*

Aqu. dest. aa. 5.00.

MDS. 1 lub 2 strzyk. wstrzyknąć w okolice bólu.

Neuralgia trigemini, Prosopalgia.

Uwzględnić i leczyć przyczyny: anemia, histerya, zimnica, choroby ucha, zębów itp.

Wycięcie bliźny ugniatającej nerw. Leczenie przymiotu, zatrucia ołowiem.

237. *Chinin muriat.* 0.50,
Dtur. tal. dos. N. X.

S. Jeden proszek przed napadem.

238. *Chloral. croton.* 0.30.

Pro dosi w pigułkach 3—4 razy dziennie.

239. *Solut. arsen Fowleri* 10·00.

DS. 3 razy dziennie od 3—5 kropli po jedzeniu.

Wrazie bólu powstałego z przeziębienia:

240. *Natri Salicyl.* 5·00,

Aqu. dest. 180·00,

Syrup aurant. 2·00.

MDS. Co godz. łyżkę.

241. *Butyl chloral* 2·00—3·00,

Spir. vini rectif. 10·00,

Glycerin 20·00,

Aqu. dest. 120·00.

MDS. 3—4 łyżek na raz.

(Dawki według stopnia bólu i indywidualności chorego).

242. *Extr. Gelsemii fluid.* 10·00.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 5 kropli.
(Najwyżej 3 dawki).

243. *Auralgeni* à 0·50.

3—4 razy na dzień.

244. *Antipyrin* 0·50,

Dtur. tal. dos. N. 10.

DS. Rano i wieczór proszek.

245. *Exalgin* 0·30—0·40.

Kilka razy dziennie.

Methylen caerul. 0·02—0·03.

Pro dosi, 2—3 razy dziennie.

246. *Veratrin.* 0·15,

Morphii acet. 0·10,

Ungu. cerei 10·00.

Mf. ungu. S. Wcierać w miejsce bólu.

Elektryczność, naciąganie lub wycięcie kawałka nerwu.

Ischias.

Przyczynę wynaleść i takową usunąć.

Jeżeli na tle malaryi, to chinina, arsen; jeżeli wskutek przeziębienia: kąpiele ciepłe, łaźnia parowa, leżenie w łóżku, ciepłe utrzymywanie nóg, środki odwodzące, wzdłuż nerwu kulszowego, jak: suche bańki, Tinct jodi, synapizma, vesicatoria, o bok tego massage, prąd elektry-

czny stały (anoda na miejsce bolesne), rozpylanie eteru przyrządem Richardsona, na wewnątrz antipiryna. Natr. Salicylicum, phenacetyne, salipyrinę, salol, betol, kali jodatum w dawkach kilkagramowych dziennie.

W razie silnych bólów iniekcye morfiny. Można też wstrzykiwać:

247. *Acid. hyperosmici* 0·10,

Aqu. dest. 10·00.

S. $\frac{1}{4}$ strzykawkki Prawaza.

Jeżeli neuralgia się zmniejszy i chorego można wysłać do kąpiel to: Swoszowice, Krzeszowice, Lubień, Cieplice czeskie, Trenczyn, Piszczany, Busk, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa). Polecane też bywają z dobrym skutkiem kąpiele w limanie odeskim (Zakład Dra Jachimowicza).

W przypadkach ciężkich ucieć się można do naciągania nerwu.

248. *Antipyrin.*

Chinini muriat. āā. 0·50.

S. 3 proszki dziennie.

249. *Euphorin* 0·40.

Dtur. tal. dos. 20.

S. 2—3 razy dziennie.

250. *Salophen* 1·00,

D. tal. dos. Nr. 10.

S. Co 2 godziny proszek.

251. *Analgeni* 0·50,

D. tal. dos. N. 10.

S. 3—5 pr. dziennie.

252. *Betoli* 3·00—5·00,

Sacchari 3·00,

Mfp. div. in dos. N. X.

S. 4 proszki dziennie.

253. *Salol* 0·50—1·00,

Sacchari 3·00.

Dtr. in capsul. amylac.

S. 3 proszki dziennie.

254. *Antinervin* 0·20—0·30.

Kilka razy dziennie.

Migraena.

Uwzględnić: ogólne osłabienie, choroby nerwów, chor. narządów trawienia, zboczenia płciowe. W czasie napadu spokój. Masowanie czoła i skroni (można użyć maści z mentholem lub cocaineą). Smarowanie przecikiem z mentolu.

255. *Chinin. muriat.* 0·25,
Coffeini natro salic. 0·10,
Sacchari 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.

DS. W czasie napadu co godzinę proszek (użyć 2 lub 3).

256. *Antipyrini* 0·50,
Coff. natr. sal. 0·10,
Dtal. dos. N. X.
S. 1—2 proszki na dzień wczasie migreny.

257. *Phenacetin* 0·50,
Chinin. 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
S. Jak wyżej.

258. *Natri Salicyl.* 0·50,
Dtur. tal. dos. N. 10.
DS. Jak wyżej.

259. *Euphorin* 4·00,
Div. in dos. N. 10.
S. 3 proszki dziennie.

260. *Coffeini citrici* 1·00,
Phenacetin 2·00,
Sacchari 1·00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
DS. Co 2 godziny proszek.

Podskórne zastrzyknięcie Ergotyny (Bombellon) 0·25. Chloralhydrat 1—2 gram. w lewatywie.

W razie, jeżeli głowa przy migrenie jest chłodna — robić gorące kompresy.

261. *Pastae Guarana*
Sacch. albi aa. 2·00.
Mfp. Div. in dos. N. 5.
S. Jeden lub dwa proszki podczas migreny.

262. *Mentholi* 0·50,
Spir. vin. gal. 10·00.
DS. Do nacierania skroni.

Do dalszego leczenia można użyć:

263. *Chinin. muriat.* 5·00,
Pulv. fol. digital. 1·50,
Extr. gent. et pulv. q. s.
f. pil. N. 30.

DS. Na noc pigułkę.

264. *Solut. arsen. Fowleri* 5·00,
Trae ferri pomat. 10·00.
MDS. Rano i wieczór po 5 do 10 kropli.

Woda arsenikalna Gubera.

265. *Ammon. bromati* 1·00,
Kali bromati
Natri bromati aa. 2·00,
Aqu. dest. 180 00,
Syr. aurant. 20·00.
MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

Agrypnia (Bezsenność).

Uwzględnić przyczyny; Anæmia, Hysteria, Neurastenia, Dyspepsia (zwłaszcza u dzieci przekarmienie) i t. d.

Przy anæmii na wieczór wino, piwo, przy nawałach derivantia. letnie kąpiele, odpowiednia dyeta, unikanie męczącej umysłowej pracy, wczesne jadać wieczerzy itd. Gdy te środki nie pomagają;

266. *Chloralhydrat* 3—5·00,
Aq. dest. 100·00,
Succi liquir. 20·00,
Chloroform gtt. 3.

MDS. Połowę na raz, druga za ½ godziny.

267. *Sulphonati* 1·00,
Tal. dos. 5.

S. Na godzinę przed spaniem proszek z herbata lub rosół, w godzinę drugi. (Przy dłuższem używaniu intoxie!

268. *Kali bromati* 0·25,
Castor. canad. 0·05,
Sacchari 0·30,
Mfp. tal. dos. 10.

S. 3 proszki dziennie (A. na tle nerwowem).

269. *Chlorolamid* 3·00,
Aqu. dest.
Syr. simpl. āā. 30·00.
 DS. Na noc zażyć.

270. *Hyoscimi hydrojodici* 0·01,
Extr. Gent. q. s. ut. f. pill.
N. 50.
 S. Na noc 2—3 pigulek.

Polecony też bywa przetwór Bromidia 2—3 łyżeczek na noc.

Singultus.

Uwzględnić powody:

Anaemia, histerya, choroby przewodu pokarmowego. Zimne lub gorące okłady, rypapizmy na okolicę żołądka; elektryzowanie nerv. phrenici.

Również z dobrym skutkiem polecają: wstrzymać oddech po głębokim wdechu, naciskanie n. n. phrenicus i vagus, sonda żołądkowa, nadto bromowe przetwory w dużych dawkach i cocaina.

271. *Trae Valerian. aether.*
Trae nuc. vomicae āā. 5·00.
 MDS. Po 10 kropli na cukrze.

272. *Chloral hydratis* 2·00,
Aqu. dest. 50·00,
Mucilag. gum. arab.
Syrup aurant. āā. 20·00.
 MDS. Co godzinę łyżkę.

273. *Pilocarpin mur.* 0·10,
Aq. dest. 10·00.
 MDS. 2—4 r. dz. po 10 kropli.
 (Przy hysterii i w chronicznych przypadkach, w ostrych, nie używać).

274. *Strychn. sulph.* 0·03,
Syrup menth. 30·00,
Aq. foenicul. 150·00.
 DS. Co 2 godz. łyżkę.

Chorda.

1) Dyeta mleczna. 2) Uregulowanie stolca. 3) Zimne okłady i kąpiele systematycznie przeprowadzane, gdyż chwilowo użyte, działają raczej rozdrażniająco; *Antiphrosidiaca*:

275. *Camphor. rasae* 0·20,
Mixt. gummosae 100·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.

276. *Lupulini puri* 0·10,
Sacchari 0·30,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
 DS. 3 proszki dziennie.

277. *Lupulini puri* 0·10,
Camphor. rasae 0·01,
Extr. Lupuli q. s. ut. f. pill.
dtur. tal. dos. N. XII.

DS. 6 pigulek dziennie. Gdy to bezskuteczne, dajemy injekcją morfiny (0·01—00·2).

Pollutiones.

Uwzględnić: Phimosi, Balanitis, Urethritis, Obstipatio, Helminthiasis, Onanię, Anaemię. Dobre odżywianie, unikanie wybryków in Baccho et Venere. Pościel niezbyt miękka i lekkie przykrycie. Kąpiele nasładowe letnie na 20—25°. Elektroterapia. Hydroterapia. Kąpiele rzeczne. Pobyt na świeżem powietrzu, wcześnie wieczór, unikać spania na wznak.

Rp. Camph. monobr. 2·00,
Extr. secal. corn. 5·00,
Lupulin. 3·00.
Pulv. et liq. q. s. ut. f. pill.
N. 50.

S. 4—5 pigulek na dzień.

Hysteria.

Zwrócić uwagę na zmiany w poszczególnych organach, zwłaszcza w narządzie moczopłciowym i starać się istniejące złozenia usunąć.

Chorą leczyć psychicznie i starać się zyskać zaufanie. Jeżeli

jest anaemia, chlorosa, to odpowiednio leczyć. U osób wynędzniałych dobre skutki daje metoda Weir-Mitchella.

W cięższych przypadkach, chorego umieścić w odpowiednim zakładzie i leczenie systematycznie przeprowadzić.

W mniej wybitnych, leczenie w zakładach wodoleczniczych, zimne nacierania, kąpiele letnie, kąpiele borowinowe (sól borowinowa Mattoniego) i inne procedury. Elektryzowanie prądem stałym, lub faradycznym daje nieraz dobre skutki.

Ze środków wewnętrznych wszystkie nerwina, jak asa foetida, Castoreum, Valeriana, Camphora bromata, Zincum valerianicum i wiele innych. Obok tego pobyt na wsi, w górach lub kąpielach morskich, higieniczne życie, dyeta pożywna niepodniecająca.

Podczas napadu hysterycznego raptowne zlanie wodą twarzy, silny prąd elektryczny, chłodna kąpiel, Chloral w lewatywie lub na wewnątrz. W razie bezsenności Sulphonal 1—2 grm. lub Chloralamid 2—3 grm. na noc. Amylenhydrat 2—3 gramy w wodzie.

Obok tego zalecaną bywa mieszanka bromowa.

278. *Amon. bromat.*

Natr. bromat.

Kalii brom. āā. 3:50,

Aqu. dest. 200:00.

DS. Rano i wieczór po $\frac{1}{2}$ —1 łyżce w herbacie lub mleku.

279. *Tinct. nuc. vom. 1:00,*

Tinct. castorei 2:00,

Aqu. lauroc. 10:00.

DS. 3 razy po 10 kropli.

Epilepsia

Przedewszystkiem starać się wykryć przyczynę padaczki i ta-

kową o ile można usunąć, zwłaszcza przy epilepsji odruchowej.

Chory nie powinien fizycznie lub umysłowo nateżać się, unikać napojów wysokokowych, żyć higienicznie, uważać na regularny stolec, nie pić kawy, herbaty, mało lub wcale nie palić, unikać wszelkich gwałtownych wzruszeń.

Podczas aury położyć chorego do łóżka, porozpiąć ubranie a podczas napadu czuwać przy nim. Nieraz kilka wdechów parą amylnitritu, cognacu, wina, może wstrzymać napad. Podczas bardzo silnego napadu można robić inhalacje chloroformowe.

Jako środki polecane przeciw epilepsji przedewszystkiem: kali bromat po 2—5 do 10 i 15 grm. na dzień, lub mieszanki bromowe:

280. *Ammon. bromati,*

Natri brom.

Kali brom. āā. 3:00—5:00,

Aqu. dest. 200:00.

DS. 2—3 łyżek dziennie, dalej Curara podskórnie (0:005).

281. *Curare 0:10,*

Aqu. dest. 10:00,

Acid. muriat. gtt. unam.

DS. $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki na raz.

Polecano też:

282. *Decoct. artemisiae*

e 15:00 ad 250:00,

Kali bromati 10:00—20:00.

Podawać też można Valerianę w proszku (0:50—2:00) pro die, albo jako infusum e 10—15:00 na 200:00. Belladona w pigułkach np.:

283. *Extr. Belladon.*

Fol. Bellad. āā. 1:00,

Extr. et pulv. liquir. q. s. u. f. pill. N. 100.

S. Codziennie 2—3 do 6—7 pigułek.

Następnie Zincum oxyd. od 0:05—0:20 p. dosi, w połączeniu

z innymi środkami, lub atropinę na wewnątrz:

284. *Zinci oxydati* 0'05,
Rad. Valer. 2'00,
Extr. Hyoscyam. 0'06,
Ol. Valerianae 0'05,
Mfp. D. tal. dos. N. X.
Da in charta cerata.
 S. 3 proszki na dzień.

285. *Atropini sulphur.* 0'01,
Aqu. dest. 10'00.
 DS. 2—3 razy na dzień po 10 kropli (uważać na źrenice!).

Dalej przetwory arsenikalne jak: Sol. Fowleri, woda Levico, Roncegno.

Przytem można zastosować procedury hydropatyczne i elektryzowanie, prądem stałym głowy n. sympaticus. Podczas status epilepticus można robić inhalacye chloroformowe lub eterowe.

286. *Aethyleni brom.*
Spir. vini rectific. āā. 5'00,
Aquae menth. pip. gutt. II.
 S. 3 razy dziennie po 5—10 kropli w $\frac{1}{3}$ szklanki mleka.

Tetanus.

Usunięcie powodów: oczyszczenia ran i wrzodów, wydobycie ciał obcych, odszczepów kostnych.

Wstrzykiwania podskórne. w pobliżu rany co 2 godz. 0'02 acid. carbol. Wstrzykiwać morfinę w małych dawkach, chloroformowauię. Chloral w lewatywach lub wewnątrznie z Cognakiem.

287. *Sulphonali* 1'00,
Dtur. tal. dos. N. 5.
 S. 3 do 4 pr. dziennie (rozpuściwszy w 200 gramach herbaty lub rosółu).

288. *Urethani* 1'00,
tal. dos. N. 6.
 2 do 3 razy dziennie proszek we wodzie.

289. *Pilocarpin hydrochlor.*
 0'10,
Aqu. dest. 10'00.
 MDS. Do wstrzykiwań (2—3 strzykawek dziennie).

Acid. salicyl. w dużych dawkach, kali bromatum 5—10 grm. dziennie.

W razie osłabienia serca, podskórne wstrzykiwanie eteru, kamfory.

290. *Antipirini* 0'50,
Dt. d. N. X.
 S. Co 3 godziny proszek.

Paralysis agitans.

Choroba nieuleczalna. Można jednak zmniejszyć trzęsienie za pomocą środków, podskórnie wstrzykiwanych jak: Curare. Morphin. i Sol. Fovleri.

291. *Sol. arsen. Fovleri* 2'00,
Aqu. dest. 4'00.
 DS. $\frac{1}{2}$ strzyk. Na wewnątrz też sol. arsen. Fovleri po 4—6—10 kropli na dzień.

Wody arsenikalne: Gubera, Levico itd.

Ciepłe kąpiele, kąpiele borowinowe, (Mattoniego sól borowinowa), elektryzowanie. kali jodatum lub bromat. i inne nerwina.

Polecają też wstrzykiwania z:
292. *Hyosciamin mur.* 0'01,
Bq. dest. 10'00.
 DS. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki; lub wewnątrznie:

293. *Hyosciamin* 0'02,
Pulv. et extr. liquir. q. s. ut f. pil. N. XX.
 S. 1—2 pigułki dziennie.

Alcoholismus.

Acutus zobacz: Otrucia.

Chronicus. Leczenie tylko w zakładach możebne. *Tra chinæ*, *Tartar. emetic.* czasami w lżejszych stopniach pomaga:

294. *Strychnin nitr.* 0·05,

Aq. dest. 15·00.

DS. Do iniekcji.

Dzien. 1—2 inj. po 0·50 płynu.

Równocześnie natr. brom.

Mania.

Odosobnienie zabezpiecza chorego i otoczenie. Unikać alkoholu, dyeta pożywna mięsna oboż żelaza, arsenu, syropu Fella i t. p.

Tylko w razie silnego podrażnienia mózgu (zrywań, zgrzytania zębami, przy zweżeniu żrenic) można stawiać pijawki i podać środki przeczyszczające. Kąpiel, lodowe okłady. Jeżeli przeważa podrażnienie płciowe Kali bromatum 4—10·0. Jeżeli mania skutkiem opilstwa: morfina, opium.

Przy objawach anaemii mózgu wino, piwo, chloral lub Secal. corn. np.

Rp. Ergotini bis dep. 0·06,

Aqu. dest. 180·00,

Syr. rubii idei 20·00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

Melancholia.

Największy spokój, położyć chorego do łóżka.

Czuwać, aby chory sobie lub otoczeniu szkody nie zrobił. Dyeta pożywna, w razie potrzeby sztuczne karmienie. Środki nasenne, opium, letnia kąpiel 26—28 R., chloral w lewatywie 3—4 grm., lub Somnal 2—3 grm. pro dosi, lub sulfonalu 1 grm. w gorącym mleku.

Rheumatismus articulatorum

1. *Acutus.*

Chory bezwarunkowo ma tak długo pozostać w łóżku, dopóki gorączka nie minie, obrzęki się nie zmniejszą i bóle nie ustąpią.

Ze środków najprędzej działających polecają: Antipyrinę, z

Natr salicylicum po 0·50, dziennie takich proszków 4—6. Jeżeli obawiamy się zapadu po silnych dawkach antipyriny, to lepiej dodać do każdego proszka 0·15 Coffeiny natrosalicylici.

Dalej stosować można samo Natr. salicyl. 5·0—6·0 pro die, Acid. salicyl. 4·0—5·0 pro die, Phenacetin po 0·50, 4—5 proszk. dziennie — Antfebrin do 0·25—0·50, 3—4 proszki na dzień, Betol 0·3—0·5, 3 razy na dzień.

295. *Salipyrin* 0·50.

Kilka razy dziennie proszek.

296. *Asaproli* 4·00,

Aq. foenicul.

Syr. simpl. āā. 30·00.

DS. Co 2—3 godz. łyżeczkę.

297. *Salopheni* 1·00,

Dt. tal. dos. X.

S. 3—4 pr. dziennie.

Euphorin po 0·40.

Kilka razy dziennie.

Phenocollum hydrochl. 1—1·50 pro die.

Methacetin 0·20—0·30 pro dosi.

Kilka razy dziennie.

Nadto okłady lodowe na bolesne stawy, lub ciepłe okłady. Fęzłowanie jodyną i zawijania w watę. Smarowanie stawów mieszańką chloroformową lub ichtyolem.

Nadto leczenie wszelkich powikłań w odpowiedni sposób, zwłaszcza zapaleń wsierdza, opłucnej i t. p.

2. *Chronicus.*

Obok środków wyżej wymienionych i kali jodatum 2—3·0 pro die, polecić ciepłe kąpiele, kąpiele ze soli borowinowej (Mattoniego) pędzłowanie jodyną, massage stawów mascią jodową, ruchy biernie lub wysłać chorego do czeskich Cieplic, Treneczyna, Piszczan, Swoszowic, Krzeszowic, Truskawca i t. d.

298. *Aconitin* 0·75,
Ung. emol.
Vasellini āā. 15·00.
 Mf. ung. S. Wcierać w bolesny staw.

299. *Jodoformii* 3·00,
Extr. Opii aq. 2·00.
Ung. simpl. 30·00.
 Mf. ungu. DS. Maść.

300. *Ichtyoli* 10·00,
Ungu. parafin. 90·00.
 Mf. ungu. DS. Maść.

301. *Ichtyoli* 5·00,
Ungu. emolient. 50·00.
 Mf. ungu. S. Wcieranie.

302. *Ammon. sulfoichtyol*
Spir. aether. āā. 10·00,
Collodii 20·00.
 DS. Do pędzlowania stawów.

303. *Trae Colchici* 10·00,
 „ *Aconit.* 3·00,
 „ *Opii* 2·00.
 DS. 3—4 r. po 15—20 kropli.

304. *Exalgin* 2·50,
Alcohol menth. 15·00,
Aqu. dest. 190·00,
Syrup simpl. 30·00.
 S. Co godzinę łyżkę.
 (Jedna łyżka 0·20 *Exalg.* 0·80 pro die).

305. *Diaphtherini* 0·50,
Spir. vini
Cognaci
Aq. naphae
Syrup simpl. āā. 20·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.
 (Dla dzieci).

306. *Natri jodat.* 6·00,
Sol. Fowleri 5·00,
Natri bicarb. 15·00,
Kali bicarb. 30·00,
Dct. Sarsaparill comp. 600·00.
 S. Po obiedzie łyżkę użyć.
 (Według Whibla w formach chronicznych).

Rheumatismus musculorum.

Wewnętrznie można podać mierne dawki *Natr. salicilicium*.

Kalendarz lekarski. 1896.

Antipyriny, *Phenacetyny* a obok tego działać miejscowo przez wcieranie maści kojących, mieszanki chloroformowej. Kąpiele ciepłe, zawijania w koce, łaźnia parowa, massage, prąd elektryczny, kąpiele siarczane, Cieplice w Czechach, na Węgrzech i t. p. miejscowościach.

307. *Chloroform*
Ol. olivar. āā. 10·00,
Tinct. opii simpl. 5·00.
 DS. Do wcierań.

308. *Chloroformii*
Glycerini āā. 50·00.
 DS. Wcieranie.

309. *Trae Bellad.* 1·50.
Bals. vitae Hoffman. 80·00,
Chlorpformii 20·00.
 DS. Do wcierań.

310. *Veratrin* 0·30,
Chloroform 15·00,
Mixt. oleos. balsam. 80·00.
 DS. Do wcierań.

311. *Spir. sapon* 30·00,
Trae opii 2·00.
 DS. Do wcierań.

Typhus.

Leczenie przypadowe, polegające na zwalczaniu zagrażających objawów. Przy pierwszym podejrzeniu na T. abd. purgans, najlepiej Calomel po 0·50 z dodatkiem pulv. Ialapp. 0·30 2—3 dawki aż do skutku.

Gorączkę należy obniżać za pomocą chłodnych zmywań całego ciała, wodą czystą lub z dodatkiem octu, letniemi kąpielami i środkami przeciwgorączkowymi, jeżeli zbyt wysoka, ale ostrożnie, aby nie wywołać zapadu.

Skrzepiać akcyę serca napojami wysokowymi, a gdy te nie są dostateczne, środkami nasercowymi.

W razie silnej biegunki, przetwory makowca i środki ściągające.

jące; w razie zaparcia stolca w pierwszym okresie choroby, środki czyszczące, w późniejszych okresach lepiej lewatywy stosować.

W razie krwotoków jelitowych okład lodowy na brzuch i środki przeciwkrwiotokowe.

Przytem należy pamiętać o należytem przewietrzaniu mieszkania, desinfekcyi stołców i bielizny. Dyeta powinna być wyłącznie płynna, zwłaszcza mleko, rosół, wino czerwone.

W razie nieżytu oskrzeli, bańki suche.

312. *Chinin. mur. 0.40,*
Dtur. tal. dos. XII.
S. 2—5 pr. dziennie.

313. *Natr. salicyl 5.00,*
Aqu. dest. 200.00,
Syr. simpl. 15.00.
DS. Co 2 godziny łyżkę.

Gdy chodzi o znaczne obniżenie ciepłoty ciała:

314. *Antipyrin 0.50,*
Coff. natrosalicyl. 0.05.
Dtur. tal. dos. X.

DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

315. *Phenacetin 0.50,*
Coff. natrosalicyl. 0.05.
Dent. tal. dos. X.

DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

Dzieciom niepodawać antypiryny ani Antifebriny, lecz w razie gorączki znacznej:

316. *Chinin mur. 0.15,*
Sacchari 0.50,
Mfp. dtur tal. dos. 10.
S. 3 proszki dziennie.

lub:

317. *Thallini sulphur. 1.00,*
Aq. dest. 80.00,
Syr. flor. aur. 10.00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę (dla dziecka 3-letniego).

W razie silnej biegunki:

318. *Decoct. salep 0.50 ad 200.00,*
Trac opii simpl. gtts. 10,
Syr. rub. Idei 15.00.

DS. Co godzinę łyżkę zażyć.

319. *Chinin mur. 2.00,*
Pulv. Doweri 3.00.
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.

320. *Mixt. gum. 200.00,*
Extr. Laudani aquos 0.10.
MDS. Co godzinę łyżkę.

321. *Naphthalini 0.20,*
Mag. Bism. 0.15,
Chinin sulph. 0.25,
Mfp. tal. dos. 15.
S. 3 proszki dziennie.

W razie zapadu:

322. *Camphor. trit. opt.*
alcohol. 0.05,
Coffeini natrosalicyl. 0.10,
Chinini mur. 0.20,
Mfp. Dent. tal. dos. XII.
DS. 4—5 proszków dziennie.

323. *Naphtol-B*
Bismuth. salicyl āā. 0.20.
Mfp. S. 10 proszków na 24 go-
dziny w razie biegunki.

324. *Naphtol-B*
Magnes. salicyl āā. 0.20.
S. ut supra.
(w razie zaparcia stolca).

Nareszcie w razie silnego podrażnienia mózgu:

325. *Natri bromati 0.50,*
Sacchari 10.00.

Rozpuściwszy we wodzie, wypić w ciągu dnia.

326. *Camphor. 0.50,*
Chloralhydrat. 1.00,
Aqu. dest. 60.00,
Vitell. ovi unius.
S. Co 2 godziny łyżeczkę.

Typhus exantematicus

według tych samych prawideł.

Dysenteria.

W czasie epidemii unikać nie-
stosownego pożywienia. Ścisła
desinfekcja wypróżnień. Chorzy
powinni leżeć w łóżku, miesz-
kanie przewietrzać.

Dyeta ścisła, kleik, rosół, mle-
ko. Słabszym można dozwo-
lić bulion z jajem, wyciągów mię-
snych, wina. Dzieciom mleko
z wodą wapienną, kawa żółę-
dziowa, herbata — osłabionym
z rumem, wino burgundzkie
z kleikiem, starsze dzieci mogą
dostawać winnej polewki.

Wszystkie pokarmy należy po-
dawać nieco ogrzane.

Dzieci przy piersi będące do-
stają pokarm regularnie, lecz
wszelkie dodatki usunąć.

Leczenie rozpocząć należy od
środków przeczyszczających, Ca-
lomel. Ol. ricini, dorosłym 2—4
łyżek dziennie, dzieciom w emul-
sji, lub: Infus rhei.

Później środki ściągające, miej-
scowe przepłukiwania kiszek le-
tutami rozczylnymi. Starcia około
odbytnicy troskliwie oczyszczać
i zasypywać pudrem salicylo-
wym.

Codziennie kąpiel ciepła, do-
rośli jedną dzien., starsze dzie-
ci 2, ssawcy najmniej 3. Ciepłota
kąpeli 27° przez 5—10 minut.
Okłady wysychające, katapla-
zmy, zawijania ciepłe sprawiają
ulgę.

Podane tutaj recepty odnoszą
się do dzieci, dorosłym dawki
większe.

327. Ol. ricini 30·00,
Inf. fol. menth. 60·00,
Gum. arab. 5·00,
Succi citri 10·00.
MDS. Co godz. łyżeczkę.

328. Salol 4·00,
O. oliv. fervid 4·00,
Aq. chloroform. 120·00.
MDS. Z początku co ½ godz.
później co godz. łyżeczkę.
(Dla 8 letn. chłopca).
Co 10 minut łyżeczkami lekką
letnią herbatę naprzemian
z kleikiem.

329. Calomelanos 0·01—0·05,
Sacchari 2·00,
Mfp. dtr. tal. dos. N. V.
S. Co godz. proszek.

Jeżeli stolce nie zawierają już
kału, można podawać opium ze
środkami ściągającymi, jednak
po paru dniach znowu środek
przeczyszczający.

330. Acidi Salicyl 10·00,
Opil pulv. 0·20,
Mfp. div. in dos. N. XX.
S. 3—4 proszki dziennie (do-
rośłym).

331. Natri Salicyl 2·50,
Laudani 0·05,
Mfp. div. in dos. N. X.
DS. 3 pr. dzien. (dzieciom).

332. Natri Salicyl 5·00,
Aqu. dest. 80·00,
Trae laud. gtts. V.
Syrup simpl. 20·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

333. Liquor. alum acet. 30·00,
Aqu. dest. 60·00,
Syrup simpl. 15·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

Do lewatywy używa się: sól
kuchenna (0·5%), Acid. salicyl.
(0·5%), Thymol (0·10%).

334. Argenti nitrici 0·05,
Aqu. dest. 200·00.
DS. Na 2 razy w lewatywie
zastosować

lub

335. Tannini 5·00,
Aqu. dest. 500·00.
S. Na 2 lewatywy.

336. *Liquor. alum acet.**Aqu. dest. āā. 100·00.*

DS. Na 2 lewatywy.

Po lewatywach jakoteż w razie silnego parcia dać czopki:

337. *Butyri Cacao 0·50,**Trae opii guttam**Mf. supposit.*

S. 2—3 r. dziennie.

338. *Extr. bellad. 0·10,**Morphii mur. 0·05,**Butyr Cacao q. s. f. sup.*

N. V.

S. 1—2 czopków dziennie (dorośłym).

W przypadkach przewlekłych podawać dalej lewatywy i środki lekko ściągające.

W razie zapadu: Cognac, wino, kamfora, eter.

W okresie zdrowienia przechodzić z wolna do pokarmów: jaja, skrobane mięso itd.

339. *Bismut. Salicyl 1·00,**Pulv. Doveri 0·20,**Sacchari 2·00,**Mfp. div. in dos. N. 10.*

DS. 3 pr. dziennie.

340. *Chinini tannici**Bismuti salicyl. āā. 1·00,**Laudani 0·10.**Mfp. div. in dos. N. X.*

S. 3 pr. dziennie.

Cholera.

W pierwszym okresie choroby wskazane są środki przeczyszczające, a z tych przedewszystkiem Calomel, który ma też mieć znaczenie antiseptyczne dla treści jelitowej. Po kilku obfitych wypróżnieniach, wywołanych środkiem czyszczącym, należy podawać przetwory makowca. W przypadku, gdzie są już wymioty, rozwolnienie, od razu przejść do przetworów makowca, chorego w łóżku ułożyć, o-

kłady rozgrzewające, środki podniecające: herbata z rumem, cognakiem i t. p. Ciepłe kąpiele b. polecane. Następnie przejść do enteroclysmy według Cantanigo: w wodzie przegotowanej o ciepłocie 30—40° C. rozpuszcza się tanninę 10·000:1000·00 lub też Acid. salicyl. 1⁰/₁₀₀; lejkiem Hegara wlewa się do kiszek 1—2 litrów z wysokości 2 metrów. Powtarzać co kilka godzin. Jeżeli pomimo tego następuje zapad (stad. algidum) stosować hypodermoklyse z wody destylowanej i sterylizowanej (wodę trzeba w tym celu 1¹/₂ godziny gotować w kolbce zatkaanej korkiem z waty. (Na 2 litry takiej wody daje się 6·00 Natri carbon. i 8·00 Natri chlorati ogrzewa do 40° C. (zachować ostrożność co do antyseptyki). Zresztą leczenie przypadkowe, rozcierania, wysokiem spir. camphoratus; przeciw kurczom inj. morfiny (1—2 cgr.) w razie wymiotów: wino szampańskie, zimna woda sodowa kwaśna, kawa czarna, polykanie lodu, Cocaina. W razie zapadu środki podniecające, inj. podsk. eteru, ol. camphor. Desinfekcyja stolców i wymiocin.

Krople Botkina:**341.** *Trae chinai comp. 25·00,**Chinin mur. 1·00,**Acid. mur. 1·50,**Trae Opii 6·00,*— *Valer. aeth. 12·00,*— *nuc. vom. 1·50,**Ol. menth. 0·50.*

DS. Co godz. 15 kropli.

342. *Cocain mur. 0·30,**Aqu. dest. 130·00,**Creozoti gtt. 15·00,**Acid. mur. dil. gtt. 50,**Syr. simpl. 30·00.*

S. Co 2 godz. łyżkę.

- 343.** *Acid. hydrochl.* 2'00,
Cocain. mur. 0'12,
Tinct. Opii 2'00,
Aq. dest. 170'00,
Syr. simpl. 30'00.

DS. Co godz. łyżeczkę, dopóki wymioty trwają, później rzadziej (lekarstwo trzymać w lodzie).

- 344.** *Tinct. Cinamom.* 20'00,
 — *Opii croc.* 0'75,
Bismut. subn. 5'0',
Mixt. gumm. 100'00.

S. Co godz. łyżkę (w biegunkach początk.).

- 345.** *Tinct. opii croc.* 6'00,
Vini ipecac. 4'00,
Trae Valerian. aeth. 12'00,
Ol. menthae pip. 1'00.

DS. 15 kr. w herbacie z mięty.

- 346.** *Camphor.* 1'00,
Aether. acet. 15'00,
Trae opii 3'00.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 10 kropli.

Dujardin Beaumetz radzi:

1) aby chorego ogrzać napojami, kawą, herbatą z rumem i t. p. 2) przeciw biegunce:

- 347.** *Acidi lactici* 10'00,
Syr. simpl. 20'00,
Tinct. cort. aur. 2'00.

Całość wlać do litra wody i co kwadrans 3 łyżki podać.
 3) Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub:

- 348.** *Tinct. valerian.* 5'00,
Laudan. Sydenham. 1'00,
Liquor Hoffmann 5'00,
Aq. menth. pip. gtts. V.

MDS. Po 25 kropli, ile razy przychodzi skłonność do wymiotów lub parcia na stolec.

Bucquoy poleca przeciw biegunce:

- 349.** *Tinct. cannellae* 10'00,
Bismut. subnit. 4'00,
Laudan. Sydenham. 0'75,
Mixt. gummos. 100'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Erysipelas.

Leczenie ogólne niezem nie różni się od leczenia innych chorób gorączkowych. Przy leczeniu miejscowem, przedewszystkiem wysledzić punkt wyjścia róży, a więc przy róży twarzy, zbadać czy niema abscessu z powodu periodontitis i takowy przeciąć, osobiwie zaś dokładnie zbadać jamę nosa i jeżeli tamże znajdują się exkoryacje strupami pokryte, takowe rozniekzyć przez wkładanie tamponów, napojonych oliwą karbolową 1%, wkładać waciki z maścią: Hydrarg. praecipit. flavi (0 15:15'00).

Miejsce uległe zapaleniu okłada się suchą watą, lub robi się okład z Plumbum acet. basicum solut. 1 $\frac{1}{10}$, 2 $\frac{1}{10}$ roztwór ichtyolu lub z płynu Burowa. Najpowszechniejszym środkiem jest maść kamforowa. Polecają również: Nacierania 4—5 r. dz. ol. therebint. rectific. zapomocą pędzla lub wacika po poprzedniem zmyciu alkoholem lub eterem miejsca schorzałego. Nacieranie dośrodkowo, by zarazka na skórę zdrową nie przeniesieć. Leczenie to przy białkomoczu nie może być użytem. Cavarri pędzluje 10% rozezynem alkoholowym Fuchsinu.

Lodowych okładów używa się tylko przy róży głowy, połączonej z majaczeniami i utratą przytomności.

- 350.** *Acidi tannici*
Camphorae aa. 2'00,
Aether 15'00.

MDS. Zewnętrźnie.

Miejsca zajęte pędzlować co 3—4 godzin.

- 351.** *Ichtyoli*
Vasellini aa. 25'00.
 Mfng. DS. Maść.

352. *Acidi carbolici* 2·50,
Camphor. 1·00,
Vaselini 50·00.

Mfung. DS. Maść lub też zrobić na rękę lub nodze opaskę z plastru lepkiego tak, żeby się róża nie posuwała dalej (Wölfler) — co się jednak niezawszę udaje.

Intermittens.

W czasie napadu leżenie w łóżku. Podczas dreszczu, ogrzewanie, wśród gorączki chłodzenie. Przed napadem wiadomym, na 5 godzin chinina.

Częste napady wymagają zmiany miejscowości.

353. *Chinin muriatici* 0·50,
Dtur. tal. dos. N. V.

S. Przed napadem proszek.

Przez kilka dni chociażby napad się nie powtórzył, rano i wieczór po proszku.

Jeżeli chory chininę wymiotuje, można ją dać w lewatywie z krochmalem lub:

354. *Chinini muriat.* 0·50,
Glycerin.
Aqu. dest. āā. 2·00,
(Disp. sine acido).

S. Wstrzyknąć pod skórę.

355. *Phenocolli hydrochl.* 1·00,
Dtur. tal. dos. VI.

S. Przed napadem na kilka godzin proszek i przez kilka dni podawać.

Przy dłuższem trwaniu:

356. *Decoct. cort. chinæ*
e 10·00 *ad* 180 00,
Sol. arsen. Fovleri 1·00,
Syrup Sacchari 20·00.
 MDS. 4 łyżki dziennie.

357. *Sol. arsen. Fovleri* 5·00,
Trae chinæ comp. 15·00.

S. Rano i wieczór po 5 kropli, postępować co dzień o jedną kroplę, aż do 20-tu.

358. *Sol. Fovleri*

Tinct. eucalypt. glob āā. 10·00.

DS. Po obiedzie i kolacyi 6—20 kropli w kieliszku wody.

Przy długotrwałych zimnicach jako leczenie następowe polecają Karlsbadzką kurację.

Dzieciom:

Chinini muriat. 0·30—0·50.

Jeżeli wymiotują, dać w lewatywie lub czopkach.

359. *Chinin muriatici* 0·25,
Butyri Cacao 0·50,
Mf. supposit dtur. tal. N. IV.
 S. Przed napadem na 3 godz. czopek, a później, po jednym przez kilka dni.

Influenza.

W czasie epidemii zapobiegawczo brać po 0·25 chininy. Gdy choroba wybuchnie, środek przeczyszczający (*Calomel* 0·50 pro dosi, dzieciom 0·05—0·10). Dalej leczenie objawów, środki przeciwogorączkowe. Chinina, Antipyrina, Phenacetin, Coffeina, szczególnie, gdy bóle głowy zbyt silne. *Natr. salicylicum* (zwłaszcza dzieciom).

Przeciw nieżytom oskrzeli *Inf. Ipec. cum Natro et Codeina*.

Starcom zaraz podać wina i środki wzmacniające.

Chlorosis.

Przedewszystkiem usunięcie istniejącej przyczyny bladaczki. Pożywienie powinno być b. pożyłne, ale łatwo trawiące się. Świeże powietrze, mierny ale systematyczny ruch. Należyte wysypianie się, nieprzeciążanie chorych ani fizyczną ani umysłową pracą. Szczególną mieć uwagę na zaburzenia żołądkowe i jeżeli takowe istnieją, przede wszystkim starać się usunąć.

360. *Tinct. malat. ferri,*
„ Chin.comp. āā. 25.00.
 DS. 2—3 łyżeczek na dzień.

361. *Ferri sulfur. pur.*
Kalii carbon. āā. 15.00,
Gi. Tragacanth. q. s. ut. f.
pill. N. 120.

Consp. pulv. cinam.
 DS. 3 r. na dzień 2—5 pig.
 (Blauda pigułki).

362. *Ferri sulfur. sicc. 6.00,*
Kali carbon. sic. 5.00,
P. althaeae 3.00,
Mel. crud. q. s. ut. f. pil.
N. 120.

DS. 3 r. na dzień po 2 pig.
 (Pigułki Valetti).

363. *Aloes 2.00,*
Ferri pulv. 8.00,
Pulv. rad. rhei 4.00,
Mucil. gum. ar. q. s.
f. pill. pond 0.10,
Consp. cynamom.

S. 2 razy dz. po 3 pig.
 Przy równoczesnem zaparciu.
 Przy dyspepsyi:

364. *Pepsin germ. 2.50,*
Ferri hydrog. reduct. 1.00,
Extr. nuc. vom. 0.10,
Sacch. lact. 3.00,
Mfp. div. in dos. 10.
 S. 3 pr. dziennie.

365. *Ferri carbon. sacch.*
Sacch. albi,
Natri bicarb. āā. 3.00,
Myrrh. pulv.
Pulv. rad. rhei āā. 2.00,
Mfp. D. ad scatul.
 S. 2—3 razy na dzień na ko-
 niec noża.

366. *Ferri oxydati sacch. 10.00,*
Pulv. rad. Gent. 5.00,
Extr. Gent. q. s. ut. f. pil.
N. 100.
 S. 3 r. po 2 pigulek następnie
 3—4 do 10.

367. *Ferri reducti 100.00,*
Magn. carbon.
Succ. liquir. āā. 4.00,
Glyc. q. s. ut. f. pil.
N. 100.

S. 3 r. po 2—4 pig. dziennie
 po jedzeniu.

368. *Ferri oxydati dialys. 5.00,*
Sol. arsen. Fowler. 1.05,
Aqu. dest. 150.00,
Aqu. menth. pip.
Syr. cinam. āā. 15.00.
 DS. 3 razy na dzień po łyżce
 stołowej.

369. *Ferri arsenic. cum.*
Ammon. citrico 0.02,
Sacch. albi 3.00,
Mfp. D. in dos. N. 10.
 S. 2 proszki na dzień.

370. *Ferri lactici,*
Sacch. albi,
Eleosacch. cinamom. āā. 0.20,
Mfp. D. tal. dos. N. XX. in
charta cerat.
 S. 3 r. dr. proszek po jedzeniu

371. *Pyrophosph. ferri et sodae,*
Sacch. albi āā. 0.20,
Mfp. D. tal. dos. N. XX.
 S. 3—4 proszki na dzień.

372. *Liqu. ferri album. 50.00.*
 DS. 3 r. po łyżeczce od kawy.

373. *Chinini ferro-citrici 1.00,*
solve in
Vin. malagens. 200.00.
 DS. 3—4 łyżek dziennie.

Obok tego przetwory arse-
 nikalne jak Sol. Fowlera, woda
 Gubera, Levico, Roncigno 2—3
 łyżeczki na dzień, następnie i
 2—3 łyżek. Wody żelaziste, Że-
 giestów, Krynica, Elster, Fran-
 czensbad i t. d. kąpiele borowi-
 nowe (Mattoniego sól borowi-
 nowa).

Anaemia.

Jeżeli wystąpi skutek krwo-
 toku lub długotrwałej choroby,
 podawać leki wzmacniające

i podniecające, pożywna dyeta. W razie grożącego zapadu wino Sherry, Szampańskie, czarna kawa, eter, oraz: podskórne wstrzyknięcie roztworu soli 0.7% w ilości 500—700.00.

374. *Aether sulphur.* 10.00,
Camphor. 1.00.

DS. Wstrzyknąć 1—2 wstrzyk.

375. *Olei camphorati* 10.00.

DS. Do wstrzykiwań.

376. *Aether acet.* 10.00.

DS. 10—20 kropli co $\frac{1}{2}$ godz.

Przy dłużej trwającej A. według wskazań: arsen Woda Gubera, żelazo, wino, pobyt na świeżem powietrzu. Wody żelaziste, Krynica, Żegiestów, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Polecają też upust krwi (Schubert) licząc 2 grm. krwi na kilo wagi.

377. *Liquor. ferri album.* 50.00.

DS. 3 razy dz. łyżeczkę.

378. *Ferri hydrog. reduct.* 5.00,

Acid. arsen. 0.20,

Extr. gentian q. s. f. pill.

Nr. 100.

DS. 2 do 3 pigułek dziennie.

379. *Cuprum arsenicosum* 0.002

—0.003 pro dosi zalecają w ciężkiej A.

380. *Haemoglobina* po 0.20 na dzień w formie pastylek przez Dra Pfeiffera (Jessler's Ludwig Apotheke, Münch.).

381. *Calcar. phosphoric* 10.00,

Haemoglobin 1.00—2.00,

Extr. Strychni 0.10,

Div. in dos. 20.

S. Dziennie 5 proszków.

Wody pyrophosphanowo-żelaziste. Zob. Chlorosis.

Leukaemia.

Przyczyna niewiadoma. Leczenie prawie zawsze bez skutku.

Podawać należy chininę z żelazem, lub dodatkiem arseniku. Po dłuższem użyciu zmienić na ol. eucalyptusowy i piperynę, lub polecić pić wodę Gubera, Levico lub Roncigno. — Krynica, Żegiestów, St. Moritz, Francensbad.

Próbowano robić wstrzykiwania do mięszu śledziony:

Ergotynę 0.50—1.0, Sol. arsen. Fowleri lub Tra Eucalypti. Żywić chorego forsownie, pobyt na świeżem powietrzu najlepiej górskim, mierny ruch, zresztą leczenie symptomatyczne.

Radzono inhalacye z tlenu 30—50 litrów dziennie.

382. *Piperini* 5.00,

Ol. eucalypti e fol. rec. 10.00,

Chinin muriat. 4.00,

Extr. et pulv. liquir q. s. ut f. pil. N. 100.

S 4—8 pigułek dziennie.

383. *Chin. mur.* 5.00,

Ferri carbon. sacch. 4.00,

Natri arsenicosi 0.10,

Extr. et pulv. Gent. q. s. ut f. pill. N. 100.

S. 1—2—5 na dzień.

Scorbutus.

Dobre powietrze i dobre pożywienie, podawać dużo zielonej jarzyny (sałata, szpinak itp) owoce, lemoniada z cytryn. Mleko w dużych ilościach. Wino, piwo. Letnie kąpiele. Płukanie ust roztworami lekko ściągającymi (kali chloricum, acidum boricum). Pędzlowanie: Tra. Myrrhae, Tra ratanh. Nacieki krwawe smarować oliwą z chloroformem. W ciężkich przypadkach leki pobudzające, kamfora, eter, wino często podawać.

384. *Dct. cort. chinæ e* 10.00
ad 150.00,

Acidi sulphur. dil. 2.00,

Syrup rubid. 20.00.

MDS. Co godz. łyżkę.

385. *Ergotini pur.* 2'00,
Aqu. dest. 150'00,
Aqu. laurocer. 5'00,
Syr. Moror. 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

386. *Liquor ferri sesquichl.* 2'00,
Aqu. cinanom. 200'00,
Syrup Sacchari 20'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Leczenie następowe wymaga dłuższego podawania: żelaza, przetworów chinowych, dobrego żywienia i kąpiei.

Diabetes insipidus.

Pożywna dyeta, mierne użycie napojów. Leczenie hydropatyczne, pobyt w górach. Kąpiele morskie, przetwory bromowe.

387. *Infus Valerianae* 5'00,
ad 100'00,
Natri bromati 1'00,
Syrup 15'00.

MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

388. *Codeini phosphor.* 0'10,
Syr. simp. 30'00.
 MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.
 (Dla dziecka 10 lat).

389. *Camphor. monobrom.*
Extr. Valer. āā. 5'00,
ut f. l. ar. pil. N. 30.
 S. 2—3 pigułek dziennie.

Diabetes melitus.

Tylko pożywienie złożone z mięsa, jaj i mleka, to ostatnie jeżeli procent cukru nie wysoki. Tłuszcze nie są zabronione.

Chleba najwyżej 100—150 gm. na dzień, z jarzyn wolno szpinak, sałatę, zielony groszek i fasolkę, kalafiory, szparagi, kapustę; z mącznych jedynie trochę ryżu. Do picia: kawa, herbata osłodzona sacchariną, która nawet w większych ilościach nie szkodzi, kwaskowate wina, wódka, cognac, woda.

Jeżeli przy dyecie mięsnej występują zapady i grozi choremu

coma diabeticum (badać moczkę półtorachlorkiem żelaza), to podawać wtedy większe ilości sody w wodzie sodowej lub Gieshüblerze.

Z lekarstw najlepiej jeszcze działa woda Karlsbadzka, potem Vichy, Neuenahr, spore dawki opium do 1'0—2'0 pro die.

390. *Acid. lacticum* 5'00—10'00
pro die.
Acid. carbol. według Ebsteina:

391. *Acid. carbol.* 5'00,
Aqu. dest. 150'00,
Aqu. menth. pip. 50'00.
 DS. 3—4 łyżeczki na dzień.

392. *Antipyrina* 2—3'00 *pro die.*

393. *Codeini* 0'30,
Dtal. dos. N. XX.
 S. Na dzień 3—4

lub

394. *Opil puri* 0'50,
Natr. bicarb. 5'00.
Mfp. Div. in dos. N. XV.
 S. 3—4 na dzień.

395. *Extr. fol. Myrtillor* 5'00,
Extr. et pulv. Gentian q. s.
f. pil. N. 50.
 S. Od 3 pig. dzien. do 10—12
 lub (Pill. Myrtill. Jasper).

396. *Jodoformii*
Extr. lactucae sativ. āā. 1'00,
Cumarin 0'10,
M. ut f. pill. N. XX.
 S. 2—3 pigułki na dzień.

397. *Pilocarpini mur.* 0'20,
Aqu. dest. 10'00.
 DS. Podskórnice $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.
 Do osłodzenia płynów używa się pigułek z saccharyny.

398. *Saccharini* 3'00,
Natri carb. sicc. 2'00,
Manniti 50'00,
f. pill. N. 100.
 S. Pigułek na $\frac{1}{2}$ —1 szklanek płynu.

W razie coma diabeticum środki podniecające, wstrzykiwanie eteru, ciepła kąpiel ze zlewaniem głowy zimną wodą.

Oxaluria.

Dyeta przeważnie mięsna, mleczna, unikanie mącznych pokarmów, jarzyn, octu, cytryn, wina.

Ze środków leczniczych: picie wód: Vichy, Karlsbad, Elster, Salzbrunn, Wildungen.

Na wewnątrz: lith. carb., lith. salicylicum, Natr. carbon. po 0'50—1'0 dziennie w wodzie selterskiej.

399. *Natri bicarb.* 10'00,
Lith. carb. efervescentis 50'00.
Mfpulv. Div. in dos. N. XX.
S. Rano i wieczór proszek w szklance wody.

400. *Natri bicarb.* 2'00,
Lith. carbon.
Kali carbon. āā. 0'50,
Aq. flor. naph.
Syr. simpl. āā. 2'00,
Aqu. dest. 300'00.

DS. Przez dzień wypić (rozczyn Ewicha).

Arthritis urica.

Przedewszystkiem leczenie dyetetyczne. Ograniczenie się co do ilości i jakości pokarmów. Wolno jeść mięso chude, o ile możliwości białe tylko, mleko, jarzyn sporo, unikać tłuszczów i mącznych potraw niemniej napojów wysokowych. Do picia szczawy lub zwykła woda z dodatkiem kwasu. Wskazany jest ruch na świeżem powietrzu, wycieczki w góry, gimnastyka. Ze środków wewnętrznych po-

lecają: Tinctura lub Vinum Colchici po 10—20 kropli 3—4 razy na dzień, Natrum salicylicum lub Antipyrina 2—3 grm. p. die.

W razie silnych bólów wcierać maść z narkotykami, na wewnątrz morfinę lub podskórnie.

Następnie picie wód Giesshübler, Bilińska, Vichy, Kissingen, Ems, Neuenahr, Obersalzbrunn, Dürkheim, Homburg, otyłym zaś osobom można polecić Marienbad, Karlsbad.

401. *Chloroform* 10'00,
Aq. Colonien. 20'00,
Tr. Aconiti 40'00.

DS. Do nacierania.

402. *Extr. Belladon.* 2'00,
Lanolini 20'00.

Mf. ung. DS. Wcieranie.

403. *Lithii jodat.* 0'25,
Extr. et pulv. gent. āā. q. s.
f. pil. 20.

S. 3—4 pig. dziennie.

404. *Lithii carbonici* 0'10,
Sacchari 0'20,
Mfp. d. tal. dos. 20.

S. 3 pr. dziennie.

405. *Natri dithiosalicyl* 1'00,
D. tal. dos. XII.

S. 3—4 pr. dziennie.

406. *Piperazin* po 0'25 na dawkę, dziennie 1—3 gramm (najlepiej w wodzie sodowej).

407. *Salol*
Aether āā. 4'00,
Collodii 30'00.

S. Pędzlować miejsca bolesne.

408. *Colchicini* 0'02,
Extr. Gent. q. s. ut f. pill.
N. 40.

S. 3—5 pigulek dziennie.

Dr Józef Surzycki.

Najwyższe dawki środków leczniczych

których lekarz przekraczać nie powinien
nie oznaczawszy wykrzyknikiem (!)

	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum	0·005	0·02
„ carbolicum	0·10	0·50
Apomorphinum hydrochloricum	0·01	0·05
Aqua Amygdalarum amarum concentrata. .	1·50	5·00
„ Laurocerasi	1·50	5·00
Argentum nitricum	0·03	0·20
Atropinum sulphuricum	0·001	0·003
Cantharides	0·05	0·20
Chloralum hydratum	3·00	6·00
Cocainum hydrochloricum	0·10	0·30
Coffeinum	0·20	0·60
Cuprum sulfuricum qua emeticum	0·40	—
Extractum Aconiti radiceis	0·03	0·12
„ Belladonnae foliorum.. . . .	0·05	0·20
„ Cannabis Indicae	0·10	0·30
„ Colocyntidis	0·05	0·20
„ Conii herbae	0·20	0·60
„ Hyoscyami foliorum	0·10	0·50
„ Opii	0·10	0·40
„ Scillae	0·20	1·00
„ Secalis cornuti	0·50	1·50
„ Strychni	0·05	0·15
Folia Belladonnae	0·20	0·60
„ Digitalis	0·20	0·60
„ Hyoscyami	0·30	1·00
„ Stramonii	0·30	1·00
Fructus Colocyntidis	0·30	1·00
Herba Conii	0·30	2·00
Hydrargyrum bichloratum corrosivum	0·03	0·10
„ bijodatum rubrum	0·03	0·10
„ jodatum flavum	0·05	0·20
„ oxydatum flavum	0·03	0·10
Jodoformium	0·20	1·00
Jodum	0·03	0·10
Kreosotum	0·10	0·50
Lactucarium	0·30	1·00
Morphinum hydrochloricum	0·03	0·12
Oleum Crotonis	0·05	0·10

	pro dosi	pro die
Opium	0·15	0·50
Physostigminum salicylicum	0·001	0·003
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06
Plumbum aceticum	0·10	0·50
Radix Aconiti	0·10	0·50
„ Belladonnae	0·07	0·30
Santoninum	0·10	0·30
Secale cornutum	1·00	5·00
Semen Strychni	0·12	0·50
Solutio arsenicalis Fovleri	0·5	2·00
Stibium Kalio-tartaricum	0·2	0·50
Strychninum nitricum	0·007	0·02
Tinctura Aconiti radiceis	0·50	1·50
„ Belladonnae foliorum	1·00	4·00
„ Cantharidum	0·50	1·00
„ Colchici seminis	1·50	5·00
„ Digitalis	1·50	5·00
„ Jodi	0·30	1·00
„ Lobeliae	1·00	5·00
„ Opii crocata }	1·50	5·00
„ „ simplex }		
„ Strophanthi	1·00	3·00
„ Strychni	1·00	3·00
Veratrinum	0·005	0·02
Vinum Colchici seminis	1·50	5·00
Zincum sulfuricum qua emeticum	0·80	—

Waga różnych dawek.

Łyżeczka cieczy waży mniej więcej 3—5 grm. Łyżeczka cukru, soli, siarki 2·5—5 gram., proszków różnych 2·50. Łyżka wody 15 grm. Łyżka syropu 20·0. Garść nasion 70—80 grm. Garść liści 20—30 gr. Szezypta kwiatu 2 grm. Litry wody dest. 1000·0; litr spirytusu 850; litr chloroformu 1480; litr oliwy 920·0; szklanka 200—250·0; kieliszek 70—80 grm.

Porównanie wag aptekarskich.

28·5 unc. = kilogr.	1 gran = 0·07
1 unc. = 35 grm.	2 „ = 0·15
6 „ = 210 „	3 „ = 0·22
1 drachma = 4·3 grm.	1/2 „ = 0·04
1/2 „ = 2·15 „	1/4 „ = 0·02
1 skrupuł = 1·5 „	1/8 „ = 0·008



II. CHOROBY KOBIECE I POŁOŻNICTWO.

Ponieważ badania nowsze wykazały, że w przewodzie rodnym kobiety nawet zdrowej znajdują się drobnoustroje, które przy danej sposobności działającej zwykle od zewnątrz, mogą wywołać w jej organizmie groźne zaburzenia, a ponieważ leczenie chorób ginekologicznych i zbroceń w okresie płodzenia wymaga dziś częściej pewnych zabiegów na częściach rodnych, podczas których właśnie ów jad może nabrać siły i wywołać nową groźną chorobę, a osoba dająca pomoc sprowadza właśnie warunki pomyślne dla rozwoju jadu, przeto niosąc pomoc postępować należy według pewnych zasad, przyjętych w nauce a mających na celu, albo jad ten uczynić nieszkodliwym (postępowanie przeciwnilne), albo jadowi do organizmu wstępu bronić (postępowanie bezgnilne). Dziś jeszcze posługujemy się w praktyce częściej pierwszym sposobem, polegającym na dokładnem odrażeniu pola operacyjnego — rąk i narzędzi.

Najczęściej używanymi środkami odrażającymi są:

Rozczyn sublimatu 1:1000 (do rąk).

„ kwasu karbolowego 3—5:100 (do rąk i narzędzi).

„ „ borowego 3:100.

„ „ salicylowego 2:1000.

„ lysolu $\frac{1}{2}$ —1:100.

„ kreoliny 1—2:100.

W każdym przypadku zwracać musimy uwagę na czystość tak podczas badania, jak podczas leczenia.

Choroby kobiece.

Choroby sromu.

Zapalenie sromu (Vulvitis).

Pierwszym warunkiem leczenia jest utrzymanie sromu w czystości i sucho, unikać drażnienia, polecić spokój, kąpiele ciepłe nasiadowe, następnie srom wysuszyć unikając tarcia, okłady z wody Goularda, z 2% roztworu octanu ołowiowego zasadowego, z 1—2% kwasu karbolowego, z 2—4% kwasu borowego. Jeżeli są nadżerki, to maść cynkowa, salicyłowa, pudrować

pułdrem salicylowym, lub zasypać proszkiem składającym się w równych częściach z jodoformu i dermatolu; ropy nie otworzyć. Jeżeli zapalenie sromu jest następstwem chorób wyższych dróg rodnych n. p. rzerzaczki pochwy, raka macicy, przetok moczowych, należy usunąć przyczynę, tożsamo, jeżeli przyczyna jest niedokrewność, zołzy, kiła, należy oprócz leczenia miejscowego, zastosować leczenie ogólne.

Zapalenie gruczołu Bartholiniego.

Jako powikłanie rzerzaczki sromu i pochwy. Polecieć spokój, środek wypróżniający. Okłady i przyparki rzadko skutek odnoszą, jeżeli nie ropa, przeciąć, a do jamki założyć strzępek gazy jodoformowej, opatrzyć i zmieniać opatrunek co 24 godzin, przepłukując równocześnie pochwę i srom. Jeżeli powikłanie to występuje podczas ciąży, dać po zabiegu opium i zwracać uwagę, aby nie wystąpiło obfite krwawienie, co się zdarza.

Świerzbiczka sromu (Pruritus vulvae).

Uwzględnić przyczyny: Zapalenie sromu i pochwy, u dziewcząt pasożyty, wyprysk, masturbacye, żylaki, blizny po wrzodach, zaparcie stolca, diabetes. Unikać drapania, kąpiele nasiadowe na 24—26° R., okłady z kwasu karbolowego 20/0, okłady sublimatowe 1/2 0/00.

409. *Ac. carb. crist.* 5'00—10'00,

Ol. olivar. 100'00.

DS. Do Smarowania.

410. *Natri subsulphur.* 30'00,

Acid. carbol. 5'00,

Glycerini 2'00,

Aqu. dest. 500'00.

MDS. Do obm. (płyn letni).

411. *Chloroform* 5'00,

Ol. olivar. 50'00.

MDS. Do pędzlowania.

412. *Cocaini muriat.* 1'00,

Lanolini 5'00,

Vaselini 15'00.

Mfung. S. do smarowania.

Choroby pochwy.

Zapalenie błony śluzowej pochwy, katar pochwy (Vaginitis, Catarrhus, Blenorrhoea vaginae, Fluor albus).

Zwrócić uwagę na przyczyny wywołujące, lub podtrzymujące zapalenie (gwałtowne spółkowanie, pasożyty, ciała obce, jak tampony, krażki, zapalenie wyższych dróg rodnych).

Ostry okres: Polecieć spokój, środek wypróżniający, nie używać środków drażniących do przepłukiwań. Letnie przestrzykiwania z wody przegotowanej z dodatkiem soli, lub kwasu borowego 2—3%.

Przewlekły nieżyt: Leczyć choroby ogólne: Niedokrewność, zołzy, bladaczkę. Wstrzykiwania środkami ściągającymi 1, 2, 3 razy dziennie.

413. *Plumbi acet. b. pur.* 2'00.

D. t. dos. X.

S. Proszek do litra wody.

414. *Plumb. acet. b. solut.* 100'00.

S. 2 łyżki na litr wody.

415. Acidi salicylici 20'00,*Alum. crudi 10'00,**Zinci sulphur. 5'00.**Mfpulv. D. in scatula.*S. Na koniec noża do $\frac{1}{2}$ litra wody.**416. Creolini 15'00.**

S. 5—10 kropli na litr wody do wstrzykiwań.

417. Sulphat. zinci*Alum. pulver aa.*S. $\frac{1}{2}$ łyżeczki na litr wody do wstrzykiwań.**418. Acidi salicylici 1'00.***D. t. dos. X.*

S. Proszek na litr wody.

419. Aceti pyrolig. crudi 300'00.

S. 2—3 łyżek na litr wody.

Do przysposabiania roczynów należy użyć wody przegotowanej. Gdy powyższe wstrzykiwania nie usuwają cierpienia, można we wzierniku oczyścić pochwę i zapędzlować n. p. octem drzewnym, półtorachlorkiem żelaza, siarkanem miedziowym 10% i to można powtarzać kilkakrotnie, ale nie częściej, jak raz na 3 dni, w ogóle, gdy już odczyn po poprzednim zabiegu minął. Po zapędzlowaniu nadmiar leku spłukuje się letnią wodą i zakłada tampony z waty. Można też zakładać na tamponach w kształcie walców proszki: acid. salicilicum, alumen, jodoform z dermatolem, zincum sulphur. w połączeniu z amylum.

Wreszcie zalecają tampony napojone lekami.

420. Amon. sulphoichtyol 5'00,*Glycerini 100'00.*

S. Płyn do tamponowania.

421. Glycerini 100'00,*Tannini 3'00.*

S. Do tamponowania.

Obrażenia pochwy.

Następstwem ich są albo przetoki pochwowo-pęcherzowe, lub pochwowo-odbytnicowe, albo bliznowate zwężenie pochwy. Unikać przyczyn wywołujących obrażenia jak, gwałtowne spółkowanie, jeżeli kobieta nosi krażek, polecić przepłukiwanie pochwy, co 3 miesiące krażek wyjąć i oczyścić, podczas porodu uważać, aby nie przyszło do odleżyn, narzędziami ostre ostrożnie operować. W razie obrażeń tamować krwotok najlepiej przez założenie szwów. Przetoki trzeba leczyć drogą operacyjną, lecz nie zaraz po porodzie, ale dopiero, gdy tkanki zjędrnieją (8—12 tyg. po porodzie) na razie polecić kąpiele nasiadowe letnie, brzegi przetoki można raz na tydzień tuszować lapisem. Zwężenie bliznowate po obrażeniach, należy leczyć przez rozszerzanie pochwy drogą tępą (zakładać paski gazy jodoformowej. Kule Bozemanna) albo leczyć drogą operacyjną przez przecięcie blizn i następowe rozszerzanie.

Obniżenie i wypadnięcie pochwy (Descensus et prolapsus vaginae).

Jest najczęściej następstwem porodów. Podczas ciąży polecić odpowiednie higieniczne zachowanie się, polecić noszenie opaski, podczas porodu starać się o wypróżnienie pęcherza i kiszki stolcowej. Naddarcie lub pęknięcie międzykroczza zesztywnąć po porodzie, położnicy polecić spokój, aż się części rodne zwiną należycie. Skoro już choroba istnieje, starać się o regularne

oddawanie moczu i kału, polecić zakładanie tamponów z decoct. Ratanhae 15₀₀ na 150₀₀. Dobrac i założyć krążek Mayera lub zatykadło Breisky'ego. — Polecić kąpiele nasiadowe z odwaru kory dębowej, można zastosować podnoszenie i mięsienie pochwy (Thure-Brandt) a wreszcie pozostaje droga operacyjna, zwężenie pochwy (colporrhopia).

Bolesny skurcz pochwy (Vaginismus),

Usunięcie zmian chorobowych miejscowych jak owrzodzeń, zapalenia i t. p. jeżeli się znachodzą. Poprawa stanu ogólnego i podawanie środków uspakajających ustrój nerwowy. Gdy objawy niezbyt jeszcze gwałtowne a przyczyną choroby jest niedokładny stosunek płciowy, wpływ moralny, środki znieczulające miejscowo, aby umożliwić coitum.

422. *Cocaini muriat.* 1'00,

Aqu. dest. 3'00,

Spir. vini rect. 2'00.

DS. Do pędzlowania

albo:

423. *Extr. bellad.* 1'00,

Vaselini 15'00.

Mf. ungu. DS. Na wacie między wargi na noc zakładać.

Zasypywanie jodoformu. Można też polecić okłady z wody Goularda, pędzlowanie rozczynek azotanu srebrowego 1:50 lub rozczynek kw. karbolowego 1:30. Rozszerzanie powolne wnijścia pochwowego rozszerzaczami.

Jeżeli przypadki gwałtowne: wycięcie błony dziewiczej i nagle rozciągnięcie wnijścia pochwowego sposobem tęym po poprzednim zachloroformowaniu chorej.

Choroby macicy.

Zapalenie błony śluzowej macicy (Endometritis).

a) Ostry nieżyt: spokojne leżenie w łóżku, środki lekko wypróżniające, okłady wysychające na brzuch, wstrzykiwania letnie, zawierające środki desinfekcyjne: Acidum borici. (3:100) Ac. carbolicum (2:100) i t. d. W razie bólów, czopki cum laudano lub cum morphio.

b) Przewlekły nieżyt wymaga jużto leczenia ogólnego w przypadkach niedokrewności, żółtów i t. d., już też leczenia miejscowego.

W tym celu można używać wprowadzania środków żrących przypiekadłem Chiarego, albo za pomocą sondy owiniętej watą i napojonej n. p. cum Tra jodi. cum liquore ferri sesquichl. itd. Przepłukiwanie macicy za pomocą cewnika Bozemanna, Ols-hausena, i t. d. rozczynekami: kwasu borowego, karbolowego jak wyżej. Schulze radzi przedtem rozszerzyć macicę sposobem tęym. Wprowadzenie rozczynek silniejszych, jak kwas karbolowy 4%, Cuprum sulphuricum 10% zapomocą rurki Bandla

w jego wzierniku do jamy macicy. Wprowadzanie na przeciku Spiegelberga lub Fritscha owiniętym watą napojoną roztworem chlorku cynku 10—50%, przyczem należy pod tylną wargę macicy podłożyć watę napojoną 10% roztworem sody, aby spływający chlorek cynku nie sparzył bł. śluz. pochwy.

Dawniej wstrzykiwano roztwory do jamy macicy strzykawkami Brauna, Madurowicza. Wprowadzenie do jamy macicy przecików zawierających jodoformę, taninę i t. d. Wprowadzanie do jamy macicy gazy jodoformowej w postaci długiego paska, którego jedna część wypełnia macicę, druga zaś sterczy do pochwy.

Gdy te sposoby nie wystarczają, wyskrobanie jamy macicy (Abrasio mucosae).

Owzrodczenia części pochwowej należy goić przyżeganiem zapomocą: nastoju jodowego, azotanu srebrnego w laseczce, Cuprum sulphuricum w kryształach, Acidum nitricum fumans, który się stosuje ostrożnie za pomocą przecika szklanego albo asbestowego.

W przypadkach dawnych owzrodczeń z przerostem gruczolowym, najlepiej wyskrobać ostrą łyżeczką dno wrzodu i przypiec następnie, do czego użyć można ferrum candens, thermocauter Paquelina, Galvanocauter.

Zapalenie mięszu macicy (Metritis).

W przypadkach ostrego zapalenia macicy: spokojne leżenie w łóżku, u osób silnych kilka pijawek na okolicę podbrzusza, zimne okłady, worek lodowy, nacinanie części pochwowej macicy.

Środki solne wypróżniające. W razie boleści maść:

424. *Extr. bellad.* 2'00,

Vaselini flavi 30'00.

Mf. ungu. DS. Zewnętrznie.

425. *Extr. opii aquosi* 0'10,

But. Cacao q. s. ut f. l. artis

suppositoria ad anum N. V.

DS. Co 3—4 godz. czopek.

Po ustaniu bólów, okłady wysychające na brzuch zamiast lodu.

W przypadkach przewlekłego zapalenia: unikanie pracy fizycznej nateżającej, gwałtownego spółkowania, uregulowanie stolca (środki solne, Cascara Sagrada, Hunyadi Janos).

U niedokrewnych podawanie żelaza. Jeżeli równocześnie miesiączkowanie zbyt obfite:

426. *Extr. Hydrastis Canad. fabricationis Parke et Davis*

40'00.

D. in l. guttatoria.

S. 3 razy dnia po 20 kropel.

Leczenie miejscowe: Przestrzykiwanie wodą przegotowaną, stopniowo co kilka dni ciepłą wodą podwyższając od 28°—38° R., ale nie silnym prądem, kąpiele nasiadowe ciepłe. — Pomazywanie części pochwowej we wzierniku co 2—3 dni cum Tra jodi, albo Ichthyolem. Tampony w przypadkach świeżych.

427. *Ammon. sulph. ichth.* 5'00, **428.** *Kali jodati* 5'00,
Glycerini 200'00. *Glycerini* 100'00.

DS. Do tamponów lub

D. in v. nigro.

S. Do tamponów.

Nakluwanie co kilka dni części pochwowej we wzierniku, miesienie.

W przypadkach zastarzałych amputatio portionis vaginalis, Nadto w porze letniej, w przypadkach świeżych, gdy powiększenie macicy znaczne, leczenie kąpielowo zdrojowe: Iwonicz, Rabka, Ciechocinek, Rymanów. W późniejszych okresach: Krynica, kąpiele morskie. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

Zmiany położenia macicy.

Wszystkie zmiany w położeniu macicy, wywołują następstwo w skutek zmienionych warunków krążenia w częściach rodnych, sprawy zapalne chroniczne t. j. katar błony śluzowej macicy, powiększenie i stwardnienie macicy (metritis chronica), a nadto wywołują szereg zбоceń w organizmie kobiety, szczególnie w zakresie trawienia, jak również zбоżenia nerwowe (neurasthenia, hysteria).

Leczenie więc ma następujące zadanie: a) macicę sprowadzić do prawidłowego położenia i w nim ją utrzymać. b) leczyć równocześnie katar i obrzmienie macicy. c) zwrócić uwagę na stan ogólny chorej.

Przodopochylenie i przodozgięcie macicy (Anteversio et ante flexio uteri).

W prawidłowych stosunkach leży macica lekko ku przodowi pochylona i nieco w okolicy ujścia wewnętrznego zgięta. O nieprawidłowem przodopochyleniu i zgięciu mówimy, gdy istnieją pewne chorobowe objawy. Jeżeli miesiączka bolesna, leczyć w sposób podany przy dysmenorrhea, jeżeli przodozgięcie jest przyczyną niepłodności, należy się starać zmniejszyć zgięcie i rozszerzyć zwykle równocześnie wązki przewód szyi, przez zakładanie systematyczne co drugi dzień zgłębnika macicznego na kilka minut, lub laseczek Hegara. albo wreszcie pasków gazy jodoformowej, które co 12 godzin wyjąć należy.

Zabiegi te robi się przy pomocy wziernika Bandla przy ustalonej i nieco ściągniętej macicy za pomocą haczyka Simsa, lub szczypczyków Marsa. Położenie poprawić możemy przez zakładanie do przedniego sklepienia tamponów, lub przez dobranie i założenie krażka Mayera. — Zwrócić uwagę na odżywienie chorej, na regularne wypróżnienia, leczyć niedokrewność, bladaczkę, żoły i t. d.

Tyłopochylenie i tyłozgięcie macicy (Retroversio et retro flexio uteri).

Unikać przyczyn wywołujących chorobę.

Położnicom nie pozwalając wcześniej wstawać i zajmować się cięższą pracą, osobę, która poroniła, uważać za położnicę.

Leczyć niedokładne i leniwe zwijanie się macicy, leczćć nawykowe zaparcie. Często pomiędzy macicą a otrzewną w zatoce Douglasa lub między jajnikami i trąbkami a otrzewną tworzą się zrosty, jako następstwo zapalenia ograniczonego otrzewnej (perimetritis-periophsoritis et salpingitis), zrosty te macicę w nieprawidłowym położeniu utwierdzają, stąd mówimy o tyłopochyleniu i zgięciu przyczepionem, jeżeli zaś macica jest ruchoma, to mówimy o tyłopochyleniu i zgięciu wolnem. Jeżeli nie ma zrostów, należy macicę odprowadzić ręcznie w ten sposób, że jednym lub dwoma palcami ręki prawej wchodzimy do tylnego sklepienia i staramy się trzon macicy wyprowadzić nad wzgórek kości krzyżowej. teraz uciskamy wskazicielem na część pochwową, aby ją ku tyłowi i górze posunąć a równocześnie ręka lewa nad spojeniem na powłokach ułożona, powinno się starać wejść za trzon i takowy ku przodowi pochylić, teraz w tem położeniu należy macicę utrzymać, bądź za pomocą tamponów napojonych lekiem lub gliceryną, lub lepiej za pomocą krążków Hodyego, Thomasa lub Schulcego. Leczyć równocześnie katar maciczny i zwracać uwagę na ogólny stan chorej.

Jeżeli macica z powodu zrostów nie da się odprowadzić, to leczćć jak perimetritis chronica, środkami mającemi na celu rozluźnienie zrostów, mięsieniem (patrz perimetr. chron.). Jeżeli to leczenie nie wystarcza, można według Schultzego w uśpieniu chloroformowem zrosty przerwać, macicę odprowadzić i założyć krążek (niebezpieczne). Po takim zabiegu chora musi zachować spokój dłuższy czas. Jeżeli stan chorej, jak to bywa jest taki, że nie jest zdolną do pracy, a życie jest dla niej nieznosnem, wtedy należy przystąpić do leczenia operacyjnego tj. wykonać laparotomię, zrosty oddzielić i przyszyć macicę do powłok brzusznych (Ventrofixatio uteri), lub wykonać to od pochwy (Vaginofixatio), przy czem przyszywamy macicę do przedniej ściany pochwy.

Obniżenie i wypadnięcie macicy (Descensus et prolapsus uteri).

Unikać przyczyn: Częste porody, poronienia, złe zwijanie się macicy (Subinvolutio uteri) pęknięcie międzykrocz, zaparcie stolca, ciężka praca. Macicę odprowadzić i utrzymać w prawidłowym położeniu za pomocą tampona lub krążka, polecić przestrzykiwanie środkami ściągającymi, do tamponów użyć odwaru ratanhii 10:100. — Leczyć katar i skrzepiać organizm. Można zastosować leczenie metodą Thure-Brandta, to jest mięsienie, tak zwane unoszenie macicy (Uteruslüftung), gdy to nie prowadzi do celu, użyć metody operacyjnej: odcięcie lub wycięcie klinowate części pochwową, a z tem połączyć zwężenie pochwy i szparę sromowej, albo przyszyć macicy do powłok brzusznych.

Wynicowanie macicy (Inversio uteri).

Unikać przyczyn: Porody ułeczne, wygniatanie gwałtowne łożyska po porodzie, gdy się macica nie kurczy, pociąganie za

pepowinę celem wydobycia łożyska. W przypadkach świeżych, należy macicę w uśpieniu ręcznie odprowadzić w ten sposób, że na szczyt guza kładziemy kawałek gazy i czterema palcami ręki prawej złożonymi tak, jak je wprowadzamy do pochwy przy zabiegach operacyjnych położniczych, uciskamy na szczyt guza, równocześnie ręka lewa nad spojeniem stara się lejek rozszerzyć, po odprowadzeniu trzymamy rękę w macicy a ręką przez powłoki, nacieramy macicę, aby ją do skurczu pobudzić, podać położnicy uśpionej lewatywę z 2'00 *Extr. secalis cornut*, lub wstrzyknąć $\frac{1}{2}$ strzykawki Ergotyny Bombelon a do pochwy założyć tampony z gazy jodoformowej i zabronić parcia. Jeżeli odprowadzenie ręczne się nie udaje, to należy założyć do pochwy balon Brauna (Colpeurinter) i wypełnić go wodą, po czem macica wolno wycofać się może. Wzmocnić siły chorej, która zwykle w tych wypadkach traci dużo krwi. Tak samo w przypadkach zadawnionych należy się starać o odprowadzenie macicy, a w tym razie ten drugi sposób jest najpewniejszy i leczyć znaczną w tym razie niedokrewność. Jeżeli odprowadzenie niemożliwe to użyć zabiegu operacyjnego (metoda Fritscha).

Nowotwory macicy.

Włókniaki macicy (Fibromyomata uteri).

Jak długo włókniaki są małe i nie wywołują żadnych objawów, zachować się wyczekująco i śledzić przebieg. Jeżeli wywołują krwawienie i inne objawy przystąpić do leczenia.

W razie krwotoku: spokój, okłady lodowe lub zimne na dolną okolicę brzucha, przestrzykiwania 2—3 razy dnia octem drzewnym (3 łyżki na litr wody) lub też przestrzykiwanie wodą naprzemian zimną i dobrze ciepłą, tamponowanie pochwy, wewnętrznie sporysz, lub *extractum fluidum hydrastis Canadensis*, ergotyna podskórną. Gdy się krwawienie zmniejszy, można podawać przez dłuższy czas w małych dawkach sporysz lub wstrzykiwać co 3, 2 lub nawet co dzień ergotynę podskórną (metoda Hildebrandta). Zapobiegać skutkom niedokrewności przez dobre odżywianie i środki skrzepiające.

429. *Extr. secal. cornut* 2'00,

Aqu. cinnam. 80'00,

Syr. cinnam. 10'00.

DS. Co 2 godz. połowę zażyć.

430. *Extr. secal. cornut.* 5'00,

Pulv. gent. q. s. f. l. a. pill.

centum Consperg. liquir.

S. 3 razy dnia po 2 zażyć.

431. *Ergotini Bombelon*

Aqu. dest. āā. 10'00.

DS. Co 2-gi dzień $\frac{1}{4}$ strzykawki wstrzyknąć podskórną na brzuch.

432. *Infus. secal. cornut.*

e. 2'50 *ad* 15'00,

Syr. cort. aurant. 20'00.

MDS. Co 2 godz. 2 łyżki.

433. *Extr. fluid. hydrast. Canad. Parke et Davis* 25'00.

D. in l. gutt.

S. 3 r. dnia po 25 kropli w winie lub maladze.

Można też połączyć sporysz z żelazem.

434. *Extr. secal. corn.* 5'00,
Ferri carbon. sacchar. 10'00,
Pulv. gent. q. s. f. pill. centum

Consp, liquir v. Cinnam.

S. 3 r. dnia po 2 pig. zażywać.

Nie należy wstrzykiwać w skórę lecz w tkankę podskórna i nieco potem masować miejsce wstrzyknięcia a to w tym celu, aby nie spowodzić abscessów. Baczyć pilnie, czy nie występują objawy zatrucia, ból głowy, nudności, mrowienie w palcach, zsinienie pod paznogiemi. Wtedy należy zaprzestać podawania sporyszu.

Fritsch zaleca zamiast podskórnego wstrzykiwania:

435. *Ergotini Denzel*
Pulv. secal. corn. āā. 5'00.
f. pill. centum.
 S. 5—8 dziennie.

Radzą podawać opium i digitalis, leczenie ogólne, mające na celu podniesienie sił ma doniosłe znaczenie. Inne środki wewnątrznie, lub zewnątrznie stosowane jak: resorbentia, przetwory jodowe, kąpiele i maści nie odnoszą żadnego skutku. Jako środek zmniejszający krwawienia i bóle zastosować można elektryzowanie prądem galwanicznym metodą ulepszoną i zalecaną przez Apostoliego.

Jeżeli takie leczenie nie prowadzi do celu, to pozostają metody operacyjne.

Rozszerzenie na tępo szyi macicy (Kaltenbach). Wyskrobanie wnętrza macicy (Runge), podwiązanie naczyń, doprowadzających krew do macicy (Rydygier), wytrzebienie (castratio) (Hegar), a nareszcie usunięcie guza samego, lub wraz z częścią, lub całą macicą.

Rak macicy (Carcinoma uteri).

W początkach cierpienia: wycięcie macicy częściowe, a najlepiej całkowite. W przypadkach, w których zaś znajdziemy nowotworowy naciek w więzach szerokich, leczenie objawowe: utrzymanie czystości przez wstrzykiwania odrażające.

436. *Kali chloricum* 1:100.

437. *Kali hypermang.* 10'00,
Aqu. dest. 150'00.

DS. Pół łyżki na litr wody.

438. *Acidi carbol.* 20'00—30'00,
Aqu. dest. 1000'00.

DS. Do wstrzykiwań.

Gdy plamy krwawe:

439. *Ac. pyrolign. crudi* 300'00.
 DS. 3—5 łyżek na litr wody
 do wstrzykiwań.

440. Creolini 20'00.

DS. 10 kropli na litr wody.

441. Ferri sesquichl. sol. 10'00,*Aqu. dest. 1000'00.*

DS. Do wstrzykiwań.

Nadto gdy to nie wystarcza, zakładanie gazy jodoformowej do pochwy.

W przypadkach krwotoków, spokój i tampowanie pochwy.

Gdy znaczniejsze wybujałości i częste krwawienie: wyskrobanie nowotworu i przypieczenie *cum ferro candente*, *thermo-kauterem* i t. d. albo środkami chemicznymi silnie żrącymi. W tym celu polecają Jodphenol (1 część jodu na 4 części zgęszczonego płynnego kwasu karbolowego) na wacie, na część pochwową i do szyi.

Wreszcie przeciw bólom należy podawać środki kojące: morfinę, opium i t. d. Baczyć na dobre odżywianie, środki gorzkie, pobudzające apetyt.

Zmiany czynnościowe macicy.

Brak miesiączki (Amenorrhoea).

Badać dokładnie i szukać przyczyny. Pamiętać o możebności ciąży. W przypadkach haematometra zabieg operacyjny. Jeżeli przyczyną chlorosis, scrophulosis, tuberculosis, anaemia, polysarcia, zastosować odpowiednie leczenie, uregulować dyetę i uważać na stolec.

W przypadkach niedostatecznego rozwoju macicy, albo w przypadkach nadmiernego zwinięcia się tejże po porodzie; wstrzykiwania ciepłe, elektryzowania macicy, kąpiele nożne, upusty krwi z części pochwowej, powtarzane w czterotygodniowych odstępach, szczególnie, gdy są *molimina menstrualia*. Żelazo wewnątrznie, zmiana powietrza, powietrze górskie, Krynica, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa).

442. Trae Capsici 3'00,*Rhumi optimi 80'00,**Mixturae gummosae 120'00.*

S. Co 3 g. łyżeczkę od kawy.

443. Extr. aloes 1'00,*Pulv. myrrhae q. s. ut. f.**pill. Nr. 50.*

S. 3 r. dnia 2—3 pigulek.

444. Acid. arsenic. 0'06,*Ferri sulph. exsicc. 2'00,**Piper nigr.**Aloes.**Myrrh. āā. q. s. f. pill.**Nr. 60.*

S. 2 r. dz. pigułek po jedz.

W nowszych czasach polecają kali hypermanganicum wewnątrznie.

445. Kali hypermang. 1'00,*Butyr. cacao 1'00,**Pulv. cacao q. s. ut f. pil. 50.*

S. 3 razy dnia 1—2 pigulek.

Bolesne miesiączkowanie (Dysmenorrhoea).

Wykazanie przyczyny (przyczyna mechaniczna, dalej, czy przyczyna w macicy; czy w jajnikach). Unikać ruchu bezpośrednio przed i podczas peryodu, zaziębienia, szkodliwych wpływów moralnych. Regulować dyetę. Jeżeli chora niedokrewna lub skrofuliczna, odpowiednie leczenie stanu chorobowego ogólnego. Leczenie kąpielowe: Iwonicz, Rabka, Krynica, kąpiele borowinowe, (Mattoniego sól borowinowa).

Podczas boleści spokój, suche ciepło na okolice podbrzusza, środki kojące jak: lewatywa z Tra. opii simpl. (15 kropli na lewatywę albo Chloral hydrat (1·0) na lewatywę). Czopki do kiszki stolcowej, zawierające opium lub morphium, wstrzyknięcie morphiny pod skórę, u osób silnych, krwistych, po jednej pijawce, na wewnętrznej powierzchni obu ud.

W cięższych przypadkach należy zbadać dokładnie miejscowo narząd płciowy przez odbytnicę, albo jeżeli możebne przez pochwe i leczyć, jak u osób zameżnych.

Najczęstszą przyczyną bolesnego miesiączkowania, bywa niedrożność przewodu szyi macicy.

Niedrożność pochodzić może ze zmiany położenia macicy jak np. zagięcia tejże, z wrodzonej wężkości przewodu, z krętego przebiegu tegoż.

W tych razach u mężatek zazwyczaj napotykamy równocześnie nieplodność.

W przypadkach takich wskazanem jest leczenie mechaniczne, polegające na wyrównywaniu zagięcia macicy, na rozszerzaniu przewodu szyi macicy sposobem tępym, wprowadzaniu zgłębnika lub rozszerzaczy na ten cel zbudowanych, do jamy macicy. Jeżeli te sposoby nie prowadzą do celu, wskazanem jest rozszerzenie macicy sposobem krwawym (Hysterosomatemia).

W ostatnim czasie polecają:

Elektryzowanie według metody Apostolego.

- | | |
|--|--|
| 446. <i>Extr. hydrast. canad. fluid.</i> | 447. <i>Chloral hydrat.</i> 8·00, |
| 2 razy dziennie po 25 kropli na 8 dni przed regularnością. | <i>Kali brom.</i> 16·00, |
| | <i>Aqu. camphor.</i> 200·00. |
| | S. Co 2 lub 4 godz. łyżeczkę. |

Fritsch poleca:

- 448.** *Trae thebaicae*
 „ *belladonae*
 „ *hyoscyami*
 „ *valerianae*
 „ *Stramonii* āā. 10·00.
 S. 3—4 razy dnia po 15—20 kropli.

Obfite miesiączkowanie (Menorrhagia).

Nie jest właściwie chorobą, lecz tylko objawem choroby ogólnej w ustroju (haemofilia, bladaczka), jako przyczyny można

uważać nasturbacę, wzruszenia umysłowe, występuje w przebiegu lub po chorobach zakaźnych jak płońca, ospa, dur, ostry gościec stawowy. Jako przyczyny miejscowe wymienić należy: Niedowład macicy po częstych porodach lub poronieniach, zatrzymanie części łożyska, lub błon, zmiany zapalne na błonie śluzowej macicy i jej miększu, zmiany zapalne w częściach dodatkowych, zmiany położenia macicy, nowotwory macicy (włókniaki); wreszcie występuje obfita miesiączka w okresie przejściowym (climax), prawdopodobnie wskutek zmian w naczyniach. Leczyć zboczenia w ogólnym organizmie, polecić odpowiednie zachowanie się higieniczne i dyetetyczne. W czasie miesiączki spokój. a jeżeli mimo to krwawienie jest silne leczyć tak, jak krwotok maciczny. (Patrz następny ustęp).

Krwotok maciczny (Metrorrhagia).

Dokładne wykazanie przyczyny krwotoku.

W przypadkach krwotoku poporodowego z macicy, jeżeli przyczyną złe kurczenie się tejże: nacieranie dna macicy przez powłoki brzuszne ręką, okłady zimne na brzuch, Secale cornutum przez usta, w lewatywie lub podskórnice. Wstrzykiwania gorące na 40° do pochwy. Uciskanie macicy dwuręczne. W ostatnich czasach Dührssen tamponuje macicę gazą jodoformową.

449. *Extr. secalis cornut.* 3'00.

DS. Na koniec noża w rosół
le zażyć.

450. *Extr. secalis corn.* 2'00,

Aqu. dest. 100'00,

Syr. cort. aurant. 15'00.

DS. Co godzinę łyżkę.

451. *Hydrast. muriat.* 0'02,

Sacchar. albi 1'00,

Mftrochis. D. t. dos. XII.

S. 4 pastylki dziennie.

452. *Extr. fluid. Gossyp. herb.*

20'00.

S. 3 razy dnia po 20 kropli.

453. *Extr. fluid. Hamamelidis*

virgin. 30'00.

S. 3 r. dnia po $\frac{1}{2}$ łyżeczki.

Gdy macica dobrze skurczona i nie zawiera, a krwotok trwa, domyślać się należy przyczyny krwotoku w pęknięciu ujścia zewnętrznego macicy, lub na innem miejscu. Założyć wziernik i tamować krwotok miejscowo przez podwiązanie, ucisk, tamponadę, zeszyć pęknięcia.

Jeżeli przyczyna są pozostałe części łożyska, błon, skrzepy: usunąć je dokładnie, jeżeli można ręcznie, a gdy to niemożliwe, wyskrobać jamę macicy.

Gdy to nie pomaga wytamponować pochwę zapomocą Penghawar-Djambi w gazie jodoformowej i jeżeli przyczyną — nowotwory macicy — usunięcie tychże sposobem operacyjnym. Na razie, podczas krwotoku tamponada pochwy, po przestrzyknięciu tejże roztoczym środka przeciwnilnego j. n. p. 2% roztoczn kw. karbol.; 1:2000—3000 roztoczn sublimatu i t. d. Do tamponowania najlepiej użyć, kulek waty oczyszczonej, zamoczonej w glicerynie, pierwsze kulki owinać gazą jodoformową.

W przypadkach gwałtownych, wstrzyknięcie do jamy macicy, roztoczn Liquor ferri sesquichlor. strzykawką Maduro-

wieza lub Brauna, przyczem warunek konieczny, aby kanał macicy był dostatecznie drożny, aby rozczyń mógł przez szyję macicy do pochwy spływać. (Postępowanie obosiecznie, ze względu na możebność dostania się rozczyń do jamy brzucha). Wreszcie okłucie od pochwy tętnic macicznych.

Równocześnie zwalczanie powstającej ostrej niedokrewności: ułożenie spokojne, poziome, ciepłe okłady na głowę, chłodne napoje, wino, kawa czarna, cognac, rum, Tinct. cinnam, Tra ferri acet. aeth. Wstrzykiwania podskórne eteru, ol. camphoratum, wstrzykiwania podskórne większych ilości rozczyń soli kuchennej 0·6:100; lewatywy z tegoż rozczyń.

454. *Trae Cinnam.* 50·00.

S. Co $\frac{1}{2}$ godziny $\frac{1}{2}$ łyżeczki
we wodzie.

455. *Tinct. Ferri acet. aeth.*

15·00.

S. 15 kropli do $\frac{1}{2}$ szklanki
wody do popijania.

Bandaże na kończyny, ucisk na tętnicę główną przez powłoki brzuszne.

Choroby części dodatkowych.

Zapalenie tkanki macicznej (Perimetritis).

Tu możemy też mówić o zapaleniu około trąbek i jajników (perisalpingitis et perioophoritis) jak również o zapaleniu tkanki okołomacicznej (parametritis), gdyż objawy i leczenie są bardzo do siebie podobne.

W okresie ostrym:

Spokojne leżenie w łóżku, okłady lodowe na okolicę bolesną, w razie znacznej boleści i gwałtownych objawów, u osób silnych 5—6 pijawek nad okolicę pachwinową, dyeta ścisła, płynna, nadto wewnętrznie: Tra opii simpl. po 10 kropli kilka razy dziennie albo:

456. *Extr. opii aquos.* 0·10,

But. Cacao q. s. ut f l. ar-
tis suppositoria ad anum

N. V.

DS. Co 3 godz. czopek użyć.

Gdy nasilenie objawów się zmniejsza rzadziej.

Gdy ciepłota opadnie, środki łagodnie wypróżniające: lewatywy z wody, z dodatkiem 2 łyżek ol. ricini albo z dodatkiem łyżki gliceryny. Czopki glicerynowe, oleum ricini wewnętrznie.

Gdy objawy ostrego zapalenia ustąpiły, okłady wysychające, po ustąpieniu bolesności: kąpiele nasiadowe ciepłe, z dodatkiem $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ kilo soli na kąpiel. Kąpiele borowinowe (Mattoniego sol borowinowa).

457. *Trae jodi*

" *gallarum āā.* 20·00.

DS. Do pędzlowania.

458. *Ammon. sulpho-ichtyol*

5·00—10·00,

Vaselini flavi 50·00.

Mf. ungu. DS. Zewnętrznie.

459. *Ammon. sulpho-ichtyol*
5'00—10'00,
Glycerini 200'00.
MDS. Do tampon. codzien.

W przypadkach przewlekłych mięsienie:

460. *Kali jodati* 10'00, **461.** *Jodoform. desodorati* 3'00,
Gelatini q. s. f. l. art. globuli vaginales N. X. *But. Cacao q. s. ut f. l. art. globuli vaginales* N. X.
DS. Raz dnia gałkę użyć lub: DS. Raz dnia gałkę użyć.

462. *Ammon. sulpho-icht.* 1'00,
Butyr. Cacao q. s. f. l. art. suppos. ad anum N. X.
S. 1 czopek dzien. użyć.

Jeżeli w przebiegu chronicznego a zatem późniejszego okresu, mimo użycia wyżej wymienionych sposobów leczenia, badanie i objawy wykazują znaczne zmiany około jajników, lub w nich samych, albo że w trąbce rozszerzonej znajduje się treść (śluz, ropa, krew), to często dopiero leczenie operacyjne usunąć zdoła cierpienie, wskutek którego życie dla kobiety staje się ciężarem. W tych przypadkach należy wyciąć trąbkę schorzałą (salpingectomy).

Krwistek zamaciczny (Haematocele retrouterina).

Unikać przyczyn wywołujących chorobę: Spółkowanie podczas lub zaraz po peryodzie, nieodpowiedne zachowanie się podczas peryodu: skakanie, tańczenie, jazda po złej drodze, ciężka praca.

Bezwzględny spokój, leżenie w łóżku na wznak.

Badanie miejscowe ostrożne. W czasie wzrostu guza krwawego, worek lodowy na brzuch albo przyrząd chłodzący Leitera. Przeciw bólom środki kojące, przyczem należy zwracać uwagę na stan niedokrewności, najlepiej podawać w czopkach:

463. *Extr. opii aquosi* 0'10,
But. Cacao q. s. ut f. l. artis supp. ad anum quinque.
DS. W razie bólesci czopek
(3—4 dziennie).

Dyeta płynna pożywna, środki wypróżniające. Przeciw niedokrewności środki skrzepiające, wstrzykiwania podskórne eteru albo oleum camphoratum, lewatywy ze słonej wody w stosunku 0'60:100.

Gorączka zwykle nie wysoka, nie wymaga w następnych dniach podawania środków.

Jeżeli w przypadku danym można rozpoznać jako przyczynę pęknięcie ciąży zamacicznej, wskazaniem jest usunięcie tejże sposobami operacyjnymi.

Skoro ustanie gorączka i guz niezbyt bolesny: leczenie pobudzające wessanie, jak przy „Perimetritis“.

Po ustąpieniu guza można pozwolić chorej powstać, gdy regularność przebiegnie prawidłowo.

Przy następnych miesiączkach powinna się chora szanować.

Choroby ciężarnych i położnic.

Poronienie (Abortus).

Jeżeli poronienie nawykowe, wykazać przyczynę. Jeżeli przyczyną była, leczenie przeciwiłowe nawet podczas ciąży, jeżeli jakieś cierpienie macicy, leczenie takowego, jeżeli choroby gorączkowe, należy zwalczać gorączkę. Strzedz chorej w okresie, w którym poprzednio roniła, i w okresach miesiączkowych, szczególnie w pierwszej połowie ciąży. Usunąć wpływy szkodliwe, podnoszące działanie tłoczni brzusznej, zabronić spółkowania, nadmiernego ruchu, trzęsącej jazdy i t. d. Wolne swobodne ubranie. — Unikać u osób krwistych czynników podniecających, napojów wyskokowych, silnych wrażeń. W razie krwawienia podczas ciąży, gdy nie odchodzą skrzepy krwi, i przy badaniu jaja wyczuć nie można, leczenie wstrzymujące poronienie i spokój.

464. *Extr. Opii aquosi 0·10,*
But. Cacao q. s. ut f. l. artis
Suppositoria ad anum Nr.
quinque.

S. Rano i wieczorem czopek
(i częściej).

465. *Tinct. Opii simpl. 10·00.*
S. 20—25 kropli rano i wie-
czorem w lewatywie.

W ostatnim czasie polecano też:

466. *Extr. fluid. Viburni pruni-*
fol. gtts. 10, w połączeniu
z 0·50 chloralu, dopóki bóle
nie ustaną.

W następnych dniach:

467. *Ammon. bromat. 15·00,*
Extr. fluid. Viburn. 20·00,
Aqu. dest. 120·00.
S. 2 razy dz. łyżeczkę.

Gdy niema już nadziei utrzymania ciąży: środki pobudzające czynność porodową: zimne okłady na brzuch, wstrzykiwania do pochwy rozcżynami środków przeciwnilnych (kwas karbolowy 3‰. Creolina 1—2‰). Gdy jajo wystąpiło z jamy do szyi macicy, można podać sporysz.

468. *Extr. secal. cornut.* 2'00,
Aqu. cinnam. 90'00,
Syrup. cinnam. 10'00.

MDS. Połowę na raz zażyć,
 a w razie potrzeby drugą
 połowę w 2 godziny.

Gdy krwawienie znaczne, zatamponowanie pochwy najpierw gazą jodoformową, poniżej zaś tamponami z waty, napojonymi gliceryną. (Zmienić za 6—10 godzin i przestrzyknąć pochwę). Jeżeli zachodzi możebność usunięcia jaja w całości, szczególnie, gdy odchody cuchnące, usunąć takowe zabiegiem ręcznym.

W razie krwawienia skutkiem pozostania resztek z jaja płodowego w macicy — wyskrobanie tychże tępą łyżeczką. Postępowanie przeciwnie.

Drgawki porodowe (Eclampsia puerperalis).

U ciężarnych okazujących cierpienie nerek, znaczniejsze obrzęki, podawać środki moczopędne (kali aceticum, Acidum benzoicum) środki wypróżniające, środki napotne, mleczna dyeta. Kąpiele ciepłe (36°—38° C.) ostrożnie.

Podczas napadu ułożenie w łóżku otoczonem materacami, aby chorą uchronić od obrażeń; przed wystąpieniem szczękoscisku, wsunąć język do jamy ust i między szczęki wsunąć kawałek drzewa okrytego płótnem. Ruchów nie krępować. Znieczulić chorą silnemi dawkami narkotyków, morfin podskórnie 0.02—0.03 lub chlorał w lewatywie (2'0). Gdy się chora budzi lub napad występuje, ponowić dawkę. Można użyć chloroformu do wdychania, ale tylko wtedy, jeżeli stwierdzić możemy pewną okresowość w występowaniu napadów np. napady występują regularnie co 20 lub 15—10 minut, wtedy minutę naprzód podać chloroform. Po napadzie kąpiel ciepła 30° R., potem zawinąć w prześcieradło i koc, aby wywołać poty.

Podczas ciąży napady mogą ustać i ciąża być donoszona, dlatego tylko w razach, gdy powyższe leczenie niepomaga, napady występują zbyt często, albo grozi obrzęk płuc, wzniecenie porodu przedwczesnego (założenie świeczki elastycznej do macicy, niektórzy radzą przebicie pęcherza płodowego).

Jeżeli napady występują podczas porodu najlepiej chloroformować, można użyć i narkotyków jak wyżej i kombinować jedno z drugim. Podaje się narkotyk, a oprócz tego ilekrotnie występują objawy zwiastunowe napadu, chloroform. Unikać częstego badania wewnętrznego, aby nie drażnić chorej. Jeżeli są warunki do łagodnego ukończenia porodu, to takowy ukończyć. Zabiegów gwałtownych, w celu rozwiązania rodzącej używać nie należy. Jeżeli napady występują w połogu, postępowanie jak podczas ciąży.

Wymioty ciężarnych (Hyperemesis gravidarum).

Zbadać dokładnie ciężarną w celu, czy się nie da wykazać przyczynowe cierpienie: tyłopochylenie, tyłozgięcie ciężarnej macicy, lub inne zmiany narządu płciowego, lub innych orga-

nów jak nieżyt żołądka, białkomocz, i w takich razach leczenie przyczynowe.

W przypadkach, gdzie żadne zmiany wyraźne wykazać się nie dadzą, należy używać środków zrazu łagodniejszych, później coraz silniejszych, z tych, które bywają zalecane. Uregulowanie i zmiana diety, picie śniadania w łóżku, jedzenie z rana pokarmów ostrych jak n. p. kawałek śledzia, albo picie cognacu zaraz po przebudzeniu. Dyeta mleczna, podawanie pokarmów chłodnych, woda sodowa, wody mineralne alkaliczne, połykanie kawałeczków lodu. Kawa mrożona, lody, wino szampańskie przy jedzeniu. Stomachica, pepsyna, kwas solny.

469. *Mag. Bismuth 1·50,*
Natri bicarb.
Sacch. albi āā. 2·00,
Mf. pulv. div. in dos. X.
 DS. 3 razy dnia proszek.

470. *Kali bromati*
Natri bromati
Ammon. bromati āā. 3·00,
Aqu. dest. 200·00,
D. in vitr. nigro.
 S. Rano i wieczorem po łyżce w wodzie sodowej.

471. *Cerium oxalicum.*
 1—2 pig. (po 0·05) na dzień.

472. *Cerium valerianicum.*
 5 pigulek po 0·05 dziennie.

Narkotyki jak opium, morfin, chloral, jużto przez usta, jużtoż podskórnie lub w lewatywach.

Lodowe okłady, synapizma, rozpylanie eteru na okolicę żołądka.

W cięższych przypadkach odżywianie przez odbytnicę.

Gdy te środki nie prowadzą do celu, pomazywanie części pochwowej roztworem azotanu srebrowego (1:40) lub laseczką. Stosowanie na część pochwowa belladonny lub cocainy.

Rozszerzenie palcem szyi macicy, w sposób aseptyczny, (zabieg ten ostrożnie, gdyż grozi poronieniem).

Gdy chora nie zatrzymuje zupełnie pokarmów i zachodzi obawa o życie, wskazanem jest, wzniesienie poronienia co jednak *ex consilio* winno być postanowione.

Uwięźnięcie macicy ciężarnej (*Incarceratio uteri gravidi retroflecti*).

Usposabia do tego ciężkiego powikłania ciąży, które powstaje tylko w pierwszych miesiącach ciąży: zwiótczenie więzadeł macicznych okrągłych i macicznopęcherzowych, nadto miednica obszerna i mało nachylona. Unikać wstrząśnięć, tańca, skakania, jazdy po nierównych drogach, podnoszenia i dźwigania ciężkich przedmiotów, starać się o regularne opróżnienie pęcherza i kiszek. Jeżeli choroba wystąpiła, to zwrócić uwagę

473. *Cocaini muriat. 0·10,*
Aqu. dest. 1·0·00.
 DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. pół łyżecz.

474. *Cocaini muriatici 0·10,*
Aqu. dest. 10·00.
 DS. 3—4 razy dzien. 10—15 kropli.

475. *Menthol 1·00,*
Spiritus vini 20·00,
Aqu. dest. 150·00.
 S. Co godzinę łyżkę.

476. *Aqu. laurocer. 10·00,*
D. in l. nigra.
 S. Kilka razy dnia po 10 kropli na lodzie.

na pęcherz; moczwę odprowadzić z wolną cewnikiem elastycznym, lub męskim metalowym, ale ostrożnie aby nie uszkodzić cewki, której kierunek bywa zmieniony. Zrobić zapomocą długiej rury kauczukowej wlewanie wody do jelita, aby spróżnić stolec. Ułożyć chorą w położeniu kolankowo łokciowym, lub na bok z udami do brzucha mocno zbliżonemi na kilka godzin.

Jeżeli to nie prowadzi do celu, należy w uśpieniu chloroformowem macicę ręcznie odprowadzić i po odprowadzeniu przez ułożenie odpowiednie ciężarnej, lub krażkiem w prawidłowym położeniu utrzymać. Chora powinna zachować spokój dłuższy czas, a krażek nosić aż do początku 5-go miesiąca ciąży, po zabiegu należy podać opium, aby zapobiedz poronieniu. Jeżeli się macica odprowadzić nie daje a niema groźnych objawów, to można nieco czekać, gdyż mogą wystąpić bóle i poronienie t. j. natura sama sobie pomaga, jeżeli zaś objawy są groźne, to należy wywołać poronienie, jeżeli się da przez przebicie pęcherza płodowego od strony szyi macicy, a jeżeli to niemożliwe, to nawet punkcya trójkątnicem przez wypukłone tylne sklepienie.

Gończka połogowa (Febris puerperalis).

Zapobiegać przeniesieniu zakażenia z osób chorych na zdrowe. Ścisłe aseptyczne postępowanie podczas porodu t. j. utrzymanie w stanie aseptycznym rąk, narzędzi, bielizny czyli wszystkiego, co wchodzi w zetknięcie z rodzącą, unikanie niepotrzebnego częstego badania rodzącej.

Gdy występuje po porodzie gorączka lekka do 38° C. a tętno spokojne, oddech rozłożony: przestrzykiwanie pochwy 1—2 razy dnia rozcynamy: kwasu karbolowego, kwasu borowego, Creoliny, Thymolu. Posypanie owrzożeń w przedsiönku i na międzykroczu, jodoformem, opatrzenie gazą jodoformową. Antipyretica, zaciemniają obraz chorobowy i nie przynoszą korzyści.

Gdy ciepłota i tętno się podnosi po użyciu postępowaniu: przestrzykiwanie jamy macicy środkami przeciwnieślnymi. (Acid. boricum 3%, Acid. carbol. 2—5% i t. d. zapomocą cewników Bozemanna, Fritscha, Olshausena, 2—3 razy dziennie. Gdy po dwóch dniach ciepłota nie opada, postępowania tego zaniechać.

Gdy są objawy podrażnienia otrzewnej: lód na brzuch, opium per anum.

Środki rozwalniające (Ol. ricini, Calomel) podawać można, tylko gdy nie ma zadrażnienia otrzewnej.

Po rozwinięciu się gończki połogowej, postępowanie Rungego: mocne wino 1—2 butelek dziennie, cognac. Gdy skłonność do wymiotów, wino szampańskie z lodu.

477. *Cocaini muriat.* 0·10,
Aqu. dest. 100·00.

DŚ. Co pół godz. łyżeczkę.

Gdy wstręt do wina, to cognac, rum.

478. Spir. vini cognac. optimi*Aqu. dest. āā. 60°00,**Vitell. ovi unius**Syr. simpl. 20°00.*

DS. Co pół godz. 1—2 łyżek.

Mleko, herbata, czarna kawa, silne rosoły, Beeftea; do napoju: woda, z dodatkiem białka kurzego jednego jaja na szklankę (przecedzić). Gdy tętno szybkie: Coffeina interne. Jeżeli nie ma podrażnienia otrzewny, kąpiele letne (22—24° R.) 5—10 minut 1—2 razy dziennie.

Postępowanie przeciwgorączkowe: Gdy ciepłota dochodzi do 39·5° C., zmywania całego ciała kilka razy dziennie, gdy dochodzi do 40° C. zawijanie w mokre, w letniej wodzie, maczane prześcieradła; zawijanie takie można powtórzyć 2—3—4 razy, aż do opadnięcia ciepłoty, 1—2 razy dziennie. Zimny okład na głowę. Uważać na tętno i w razie zapadu, środki podniecające.

*Dr Maksymilian Cercha.***III. CHOROBY DZIECI.****Anaemia et chlorosis.**

Przedewszystkiem zapobiegać przyczynom wywołującym, u osesków zalecić stosowne karmienie, leczenie chorób powodujących jak: kiła, krzywica, żoły. Przeciw samej chorobie zalecić obok stosownego żywienia (rosoły pożywne, małe ilości wina i wogóle łatwo strawnych pokarmów) pobyt na świeżem powietrzu górskim lub nad morzem. Przygotowawszy należyte trawienie, można dopiero rozpocząć leczenie przetworami żelaza, arsenu.

479. Liquor ferri albumin. 50°00.

S. 5—20 kropli w ½ szklanki mleka.

480. Trae ferri pomati 10°00,*Trae chinae comp. gtts. X.*

DS. 3 razy dz. po 10 kropli.

481. Ferri carbon. sacch.

3 razy dz. na koniec noża.

482. Extr. fluid nuc. Kola 30°00,*Syrup cort. aurant. 100°00,**Tinct. nuc. vom. 10°00,**Vini Xerensis 900°00.*

S. Vinum tonicum.

Leczenie bladaczki wymaga przedewszystkiem stosownego żywienia, nie przeciążania pracą czy to fizyczną czy umysłową, należytego wypoczynku, wysypiania się; zwrócić uwagę na swobodę oddychania przez unikanie obcisłego odzienia (gorsetów).

483. Ferri carbon. sacch. 1°00,*Chinin mur. 1°00,**Sacchari 2°00.**Mfp. div. in dos. N. 10.*

S. Rano i wiecz. proszek.

484. Liquor ferri album 50°00.

S. 3 razy dz. łyżeczkę.

- 485.** *Sol. arsenic. fowleri*
Trae chinae comp. āā. 5'00.
 MDS. Od 5 kropli codziennie o 2
 więcej aż do 15.

Rhachitis (Krzywica).

Najwięcej skuteczne pielegnowanie i żywienie. Dzieci z krzywicą powinny być jak najwięcej na powietrzu w ubraniu lekkim, zamiast pierza materace z włosów, przy Craniotabes: poduszczyka z włosów z wyciętym otworem na główkę. Przy skrzywieniach kręgosłupa i załamaniu kończyn, niepozwalać dzieciom bez podpory siedzieć, a próby ze staniem i chodzeniem bardzo ostrożnie zaczynać. W razie obfitych potów zmywać ciało kilka razy gąbką zamoczaną w zimnej wodzie i dobrze wycisnąć, a zwłaszcza tyłogłowie. Matka słaba nie powinna karmić dziecka z krzywicą.

Dziecko z krzywicą powinno już w 4-tym miesiącu dostawać nieco solonego rosołu, o ile można, nie dawać pokarmów skrobiowych. Po odłączeniu głównym pokarmem (po ósmym miesiącu) mięso, z wyjątkiem wieprzowego, jaja, nieco wina, mleko.

Starszym dzieciom nie dawać wiele legumin, a zwłaszcza cukrów.

Drugim ważnym czynnikiem są kąpiele, jeżeli nieżyt oskrzeli nie przeszkadza.

Daje się je w połączeniu ze słodem ($\frac{1}{2}$ litra) i solą ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ do 1 funta na 20 litrów) z dodatkiem ziół aromatycznych, w razie anaemii sole żelaziste, kąpiele (26° R.) z soli borowinowej (Mattoniego), na tydzień 2—3 razy, nigdy na noc.

Regulować objawy niestrawności, jużto dodatkiem kwasów lub alkalii. Nieżyt oskrzeli le-

czyć naparem Ipecac, Senegae, Liqueur ammonii anis.

Kurczowi głośni energicznie zapobiegać, (zob. Laryngospasmus). Skrzywienia kończyn wymagają leczenia gimnastycznego, ortopedycznego, szyn, gorsetów itp. — U małych dzieci najlepiej rozpocząć leczenie żelazem.

- 486.** *Aqu. pyrophosphatis ferri et sodae.*

3 r. dziennie łyżeczkę, dalej:

- 487.** *Trae ferri chlorati*
 5—10'00.

3 razy dziennie po 5 kropli we wodzie.

- 488.** *Ferri pyrophosphor. 0'05*
 —0'10,

Sacchari lactis 0'20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 15.

S. 2 proszki dziennie.

- 489.** *Calcii phosphor. pulv.*
 30'00.

Parę razy dziennie na koniec noża do pokarmów.

- 490.** *Calcar. phosphor. 30'00,*
Ferri lactici 2'00,
Sacch. lactis 30'00.

Mfp. S. 3 razy dz. na koniec noża.

- 491.** *Bismut subnitrici*
Carbonat calcar. āā. 1'50,
Mfp. div. in dos. N. 10.

S. Co 4 godz. proszek (w razie uporczywego nieżyty przewodu pokarmowego).

- 492.** *Ol. jecor. aselli 2'00—4'00,*
Mucilag. gum. arab.
Aqu. dest. q. s. f. l. a.
Mixt. oleosa col. 80'00,
Syrup simpl. 10'00.

DS. 3 razy dz. łyżkę.

- 493.** *Ol. jecor aselli 150'00,*
Liniaturae ferri 20'00,
stent in macerat per 24 ho-
ras, deinde decant.
 DS. Rano łyżeczkę.

494. *Phosphori* 0'01,
Ol. amygdal. dulc. 30'00,
Gum. arab.
Sacchari āā. 15'00,
Aqu. dest. 40'00.

DS. Jedną łyżeczkę na dzień.

495. *Phosphori* 0'01,
Ol. jecor aselli 100'00.

DS. 1—2 łyżeczek dziennie.

496. *Phosphori* 0'01,
Lipani 30'00,
Pulv. gi. ar.
Sacchar. āā. 15'00,
Aqu. dest. 40'00.

DS. 1—2 łyżeczek dziennie.

497. *Phosphori* 0'06,
Alcohol. 20'00,
Spir. menth. 0'50,
Glycerin. 60'00.

DS. 3 razy dziennie po 6 kropli. — (Co tydzień o kroplę więcej aż do 10).

Dzieciom z nieżytem kiszek stanowczo fosforu nie podawać.

498. *Butyri recent.* 200'00,
Kali jodati 0'15,
Kali bromati 0'50,
Natri chlorati 5'00,
Phosphori 0'01.

Tę ilość użyć w ciągu 3 dni, kilka razy dziennie podając na chlebie.

Scrophulosis.

Dzieciom małym przy piersi, jeżeli się pokażą gruczoły powiększone, zacząć dodawać osolone rosół. Starsze dzieci żywić mięsem, mlekiem, kawą żółtą, dać nieco wina czerwonego, owoce, jarzyny lżejsze. Suche mieszkanie przewietrzane. Kąpiele, zmywania wodą są koniecznymi.

Dzieci tłuste powinny dostawać pożywienie chude, łatwo strawne, mleko, mięso, ekstrakt mięsny, używać dużo ruchu.

Dzieci blade, chude, mogą używać więcej tłuszczów, tutaj

więc podać tran, najlepiej w porze jesiennej i zimowej. Lepiej odżywionym tran z dodatkiem Trae. jodi. Zaprześcić jednak tranu przy braku apetytu, biegunce, gorączce. Tran dawać w godzinę po jedzeniu $\frac{1}{2}$ —1 łyżki, małym dzieciom w emulsji, po 3 tygodniach zrobić przerwę kilkudniową.

Jeżeli dzieci nie znoszą tranu lub są przeciwwskazania, podawać przetwory jodu z żelazem, herbatę z liści orzecha, masło jodo-bromowe (zob. rhachitis), ekstrakt słodowy (1—2 łyżeczek 2 razy dziennie).

W lecie pobyt na świeżym powietrzu, wody mineralne jodo-bromowe lub słone — (Iwonicz, Rabka, Rymanów) tak do kąpiei, jak i do picia.

Kąpiele ze soli z dodatkiem soli iwoniczkiej, rabczańskiej, soli borowinowej Mattoniego (po $\frac{1}{2}$ —1—2 funtów), kąpiel na 27^o R. przez 15—20 minut.

W obrzmiałe gruczoły wetrzeć na wieczór łyżeczkę mydła szarego (Sapo kalin) i zmyć rano i tak przez szereg dni dopóki nie będzie większej bolesności.

Choroby towarzyszące jak: Conjunctivitis, Keratitis, Otitis, i t. p. obok ogólnego leczenia leczyć miejscowo (zob. pod odpowiednimi rozdziałami).

499. *Ol. jecor. aselli* 10'00,
Mucil. gum. ar. q. s.
Aqu. dest. 60'00,
Syrup Melissae 10'00.

MDS. 3 razy dzień. łyżeczkę.

500. *Syrup ferri jodati* 20'00,
Syrup sacchari 40'00.

MDS. 3 razy dzień. łyżeczkę.

501. *Kali arsenicos solut.*
Aqu. cinamom. āā. 10'00.

MDS. 3 razy dziennie po 3—6 kropli.

502. *Ferri jodati sacchar.* 0'50,
Sacchari 5'00,
Mfp. div. in dos. N. XX.
 S. 3 proszki dziennie.

503. *Trae jodi gtts.* X.
Kali jodati 1'00,
Aq. menth. pip.
Glycerin. āā. 50'00.
 MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

504. *Ol. jecor. aselli*
Aq. Calcar. āā. 100'00,
Mf. linim. adde
Trae chinae comp. 20'00,
 „ *Rhei vin.* 15'00,
 „ *Calami* 5'00.
 MDS. 2—3 razy dziennie łyżeczkę do 1 łyżki.

Prof. Sommerbrodt radzi dawać wytrwale kreozot od paru kropli dziennie do 1 grama w winie lub kapsułkach, zaraz po jedzeniu.

505. *Creosoti* 1'00,
Ol. jecor. aselli 150'00.
 DS. łyżeczkę na godzinę przed jedzeniem.

506. *Creosoti* 1'00,
Tinct. gentian 2'00,
Spiritus 25'00,
Vini Xerens. q. s. ad 100'00.
 DS. 2—3 łyżeczek dziennie do 1½ szklanki wody.

Stomatitis catarrhalis.

Czyste utrzymywanie jamy ustnej, wymywanie ust chłodną wodą. Pędzlowanie: 2% kwasem borowym, 1% rozczynek kali chloric. Dzieciom starszym zimne pokarmy, mleko z lodu. Wyrwać psujące się zęby, które są częstym powodem stomatitis.

507. *Boracis* 5'00,
Mel. rosat. 20'00,
Aq. rosar. 10'00.
 MDS. Do pędzlowania.

Stomatitis ulcerosa. Stomacace.

Pędzlowanie pojedynczych o-wrządzeń rozczynek kali hypermang (0'12:25'0) 5—6 razy dzien.

508. *Acidi borici* 1'00,
Kali chlorici 0'75,
Succi citri 15'00,
Glycerini 10'00.
 DS. Do pędzlowań.

Wewnętrznie: kali chloricum (1'0—3'0 na 120'0 Aquae, pr. die).

509. *Decoct. cort. chinae*
 e 5'00 ad 100'00,
Kali chlorici 2'00,
Syrup simpl. 20'00.
 MDS. Co godzinę łyżeczkę.

W razie krwawienia:

510. *Liquor ferri sesquichl.*
Aq. dest. āā. 15'00.
 MDS. Do pędzlowań.

Soor.

Czyste utrzymanie ust, prze-mywać po pokarmach, dobre po-kojowe powietrze.

Po usunięciu mechanicznem grzybków (miękkim płótnem zwilżonem w zimnej wodzie) pędzlować:

511. *Kali hypermang.* 0'12,
Aqu. dest. 15'00.
 MDS. Do pędzlowania.

512. *Saccharini* 1'00,
Spir. vini 50'00.
 DS. łyżeczkę rozpuścić w 1½ szklanki wody i 5 r. dzien-nie pędzlować.

513. *Resorcin.* 0'50,
Aqu. dest. 90'00,
Syrup 10'00.
 MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.
 (Dla dziecka od 1—2 lat).

Do przemywania ust: Borax (1'50:100'0 Aq. destil.) kali chlo-ricum, Bicarb. sodae (0'50:150'0).

Aphthae.

Pędzlowanie 10⁰/₀ rozczynek
kali chloricum, 1¹/₂⁰/₀ rozczynek
acid. tannici, 5⁰/₀ Boraxem.

514. *Succi citri.*

Syrup rub. Id. āā. 10:00.

S. Do pędzlowań.

515. *Argenti nitrici 1:00,*

Aq. dest. 50:00.

MDS. Do pędzlowania.

Wewnętrznie:

516. *Kali chlorici 1:00,*

Aq. dest. 80:00,

Syrup rubid. 20:00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Upoczywie trzymające się
plamy lapisować. Obok tego zi-
mne napoje, podawanie kawał-
ków lodu, unikanie gorących
potraw.

Dyspepsia.

Regularne karmienie osesków,
jeżeli przyczyną mleko krowie,
wrócić do piersi, lub w miejsce
tego kleik jęczmienny, owsiany,
woda cukrzona z białkiem, ro-
sół cielęcy.

Z poprawą stolców zwiększać
ilość mleka. Jeżeli są odbijania,
czuć kwas z ust, wymioty, stolce
serowate: Calomel (0:01—0:03)
lub Natrum benzoic. (3⁰/₀) co 2
godziny łyżeczkę.

W razie wzdęcia bolesnego,
wprowadzić kankę lub kateter
do odbytnicy. Jeżeli wymioty
nie serowate, cuchnące, wska-
zują na brak kwasów: Acid. mur.
(0:30:50:0) lub:

517. *Pepsin 1:00,*

Ac. muriat. gtts. tres.

Aqu. dest. 90:00,

Syr. simpl. 15:00.

S. Przed pokarmem łyżeczkę.

Papayotin 0:25,

Acidi lactici 1:00,

Aq. dest. 80:00,

Syr. simpl. 30:00.

MDS. łyżeczkę po ssaniu.

518. *Pepsin 10:00,*

Vini Xerens. 300:00,

Acidi mur. 1:00,

Sacch. 20:00.

MDS. Co 4 godz. łyżeczkę.

W razie nagromadzenia się
kału w jelitach. Ol. ricini.

Przy Intertrigo towarzyszącym
zmywanie wodą mydlaną.

519. *Magnes ustae 5:00,*

Talci praepar. 20:00,

Acid. salicyl. 0:20.

MDS. Do posypywań.

U starszych dzieci:

520. *Trae Colombo*

Trae cascarillae āā. 5:00,

Trae bellad. 2:00,

Trae opii gtts. IV.

S. 5—10 kropli przed jedzeniem.

Colica flatulenta.

W razie niestrawności uregu-
lować karmienie, nieuspokajając
dziecka pokarmem.

W napadzie: wilgotne ciepłe
okłady na brzuch, smarowanie
ciepłą oliwą, lub maściami aro-
matycznymi. Wprowadzić do
kiszki stolcowej trestkę od lewa-
tywy lub kateter (powyżej sphin-
cter internus). Lewatywy z cie-
płej wody z oliwą. Rumianek
lub herbata z mięty, łyżeczkami.
Starszym dzieciom przykładac
płatki nakrapiane rumem, syna-
pizma.

521. *Calomel. 0:01—0:03,*

Sacchari 0:20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. V.

S. Co godz. proszek.

522. *Natri benzoici 0:20,*

Aqu. dest.

Aqu. foenicul. āā. 30:00,

Trae laudani gtts. duas.

Syrup simpl. 15:00.

DS. Co godz. łyżeczkę.

523. *Chloral hydrat v. Urethan* 0:50,

Aqu. dest. 80:00,

Mucilag. gum. arab. 20:00.

MDS. Na 2 lewatywy.

(Wrazie długotrwałych boleści lub wystąpienia drgawek).

Obstipatio habitualis.

Zapobieganie polega na stosownem żywieniu. O. osesków wymaga zmiany mamki, przy żywieniu sztucznem wykluczyć pokarmy skrobiowate, natomiast zwiększyć ilość tłuszczów lub cukru. Dzieciom starszym kompoty, miód, maślanka. Wreszcie mięsienie brzucha (nie po jedzeniu), na noc opaska wysychająca, lewatywy. Dopiero, kiedy te zabiegi nie skutkują, można użyć leków przeczyszczających. *Rheum magnesia* 2 razy dziennie na koniec noża. *Aq. laxat.* 2—3 łyżeczek dziennie, *Trae rhei vin.* 1—2 łyżek. *Extr. fluid. Cascar. Sagrae* rano i wieczór po 10—15 kropli.

524. *Extr. Casc. Sagr.* 5'00,

Aq. dest. 50'00,

Syrup Zingib. 20'00.

S. Na noc łyżeczkę.

525. *Ol. ricini* 15'00,

Infus coffeae tost. 60'00,

Sacchari 20'00,

Vitelli ovi Nr. 1.

Mf. emulso. S. Co godzinę łyżeczkę.

526. *Tinct. nuc. vom.* 1'00,

Tinct. rhei aq. 15'00.

MDS. 2 razy dz. po 10 kropli (dla dziecka 8—12 mies.).

527. *Infus fol. Sennae* e 10'00
ad 100'00,

Syr. Mannae 10'00.

S. Na 2 razy użyć.

528. *Extr. bellad.* 0'03,

Aloes 0'50,

Butyri Caco 6'00.

Mfsupposit. Nr. 12.

S. 1—2 sztuk dziennie.

Catarrhus ventric. et intestinorum acutus.

Dyeta, jak przy Dyspepsyi. Bezwarunkowo nie dawać mle-

ka, natomiast woda z białkiem, kawa żółodziowa, zwracać uwagę na pragnienie, podawać płynny często po łyżeczce np. wodę z rumem, wystawiać wodę sodową i Spir. aether. zwłaszcza, gdy są oznaki zapadu. Unikać lewatyw. Jeżeli nieżyt k. z niestrawności. *Calomel* (0'03) pepsyna c. ac. mur.

Jeżeli nieżyt przy normalnem trawieniu się pojawi, można z ostrożnością dać Opiata, oseskom 1—2 kropli dziennie.

529. *Trae Coto gttts.* V.

Aq. dest. 50'00,

Trae Opii gttts. duas

Syrup 10'00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

530. *Infus. herb. Melissae*

e 5'00 ad 100'00,

Resorcin 0'30,

Trae laud. gttts duas

Syr. Sacch. 15'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

531. *Naphthalin* 0'10—0'20,

Sacchari 0'30,

Mfp. tal. dos. 10.

D. in charta cerata.

S. Co 3 g. proszek w kleiku.

532. *Paulinii sorbilis* 0'05—0'15,

Sacchari 0'15,

Mfp. tal. dos. Nr. 10.

S. Co 2 godz. proszek.

533. *Saloli* 2'00,

Mixt. gumm. 90'00,

Syr. simpl. 10'00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.
(Dla dziecka 6—7 lat).

Ze środków ściągających *Trae*: *Catehu*, *Kino*, *Ratanh.* (1—2'00: 50'00, *Trae Opii gttts* II co godz. łyżeczkę). *Bismut Salicyl* 0'10 pro dosi w połączeniu z *Pulv. Doveri* 0'01, *Resorcin* (0'20: 100'00), *Natr. benz.* (1'00:100), *Thymol* (0'15:100 00 *Cognaci gttts.* 10). Jeżeli upadek sił występuje, ilość moczu się zmniejsza, kończyny zimne, odstawić

leki a pobudzać środkami wy-
skokowymi, eter, (podskórnie
1·00).

534. *Infus rad. Valerianae* 1·25
ad 90·00,

Tannin 0·15,

Vini Mader.

Syr. simpl. aa. 15·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę (dla
dziecka 2 lat).

(Przy osłabieniu i zapadzie).

535. *Cognac* 30·00,

Aq. lauroc. gtts. V.

Vitelli ovi Nr. 2.

Sacchari 20·00.

MDS. Podawać łyżeczkami.

Gastroenterocatarrrhus acu- tissimus (Cholera infant.).

Zapobieganie: w lecie prze-
strzegać czystości i świeżości
mleka; nie odłączać dzieci w le-
cie (czerwiec, lipiec, sierpień).

W chwili wybuchu choroby:
przedewszystkiem nie dawać ża-
dnego pokarmu, nawet piersi, aż
do ustąpienia wymiotów. Nato-
miast: chłodną wodę źródłaną
lub sodową, z kilku kroplami
Cognacu często (co 10 minut)
po łyżeczce. Wino, nie zawsze
dzieci dobrze znoszą.

536. *Liquor ammon. anis.*

Spir. aetheris aa. 7·00.

MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 3—5 kropel
(w wodzie ocukrzanej).

537. *Cognaci* 10·00,

Aqu. dest. 180·00,

Syrup sacch. 10·00.

MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę.

Czarna kawa, herbata z ru-
mem lub cognakiem, szampan
co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę, pigułki lo-
dowe. Jeżeli niebezpieczeństwo
groźne i objawy zapadu wystę-
pują: kąpiele z gorzycą (50·0
młki gorzycowej do woreczka,
wycisnąć w kąpiele), silne na-
cieranie, dopóki się skóra nie
zaczerwieni, później wytarcie i

ogrzana pościel. Kąpiel powtó-
rzyć, gdy dziecko zaczyna na
nowo stygnąć. Dalej podskórne
wstrzykiwania eteru (1—2 strzy-
kawek na 12 godzin).

538. *Flores benzoës* 0·50,

Spir. aetheris,

Trae aromat aa. 5·00.

DS. Co godz. 3—5 kropli.

539. *Acidi benzoici* 1·00.

Camphor. 0·30,

Spir. aether.

Aqu. dest. aa. 5·00.

MDS. $\frac{1}{2}$ strzyk. na raz.

Jeżeli chorobą powstała w dal-
szym ciągu niestrawności, nie-
żytu kiszek, wówczas podawać
leki ściągające, opium, kreozot.

540. *Calomel.* 0·01—0·03,

Sacchari 0·20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.

S. Rano i wieczór proszek.

541. *Calomel.* 0·005—0·015,

Saloli 0·10,

Sacchari 0·30,

Mfp. tal. dos. VI.

S. Co 2 godz. proszek.

542. *Tinct. Colombo*

Tinct. Cascarillae aa. 20·00.

S. Co godz. 10—20—30 kropli
w herbacie podać.

543. *Trae ratanhae* 1·00,

Aq. dest. 50·00,

Spir. aether. gtts. X.

Kreosoti gttam unam.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

Gdy zaś przyczyną choroby
jest nagromadzenie fermentów
i choroba wśród zupełnego zdro-
wia wybuchła, natenczas sto-
sować:

544. *Creosoti gtts. duas*

Aquae cinnamomi 90·00,

Syrup 20·00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę.

545. *Natri benzoici* 5·00,

Aqu. dest. 90·00,

Syrup. simpl. 10·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

546. *Resorcin* 0·20,
Aq. chamomill 60·00,
Syr. simpl. 20·00.
 MDS. Co godz. łyżeczkę.

547. *Resorcin* 0·10,
Infus. chamomill. 60·00,
Trae opii gtts. duas.
Syrup simpl. 10·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

548. *Benzonaphthol*
Sacchari aa. 0·05—0·20.
 S. Co 3 godz. proszek.

Gdy po usunięciu groźnych objawów, pozostanie biegunka, powoli wracać do pokarmów.

Catarrhus intest. chronicus.

Dzieciom sztucznie żywionym podawać rozcieńczone mleko kozie, odgotowane i ostudzone (3 łyżki mleka, 2 wody, 1 wody wapiennej) taką porcyę co 2 g. lub połowę co godzina, śmietanę Biederta, starszym rosóły mone, Cacao, kawę żołądźkową, herbatę z liści orzecha. Wzbrońić tłuszczów, jarzyn. Pokarmy dawać w małej ilości często. W celu zmniejszenia wzdęcia i pobudzenia do lepszego krążenia okłady Priessnitza. Wody: Kissingen, Carlsbad, Wildungen.

549. *Aq. foeniculi* 75·00,
Bismut subnitr. 2·00,
Aq. calcis 6·00,
Syr. flor. aurant. 15·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

550. *Infus. rad. colombo*
e 0·50:75·00,
Bismut subnitr. 2·00,
Syr. flor. aurant. 15·00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

551. *Fol. Iugland.* 100·00,
Vini burgund. 500·00,
Macera per 48 horas, adde
Syr. Splc. 30·00.
 S. Co 3 godz. 1—2 łyżeczki.

552. *Chinin tannici* 0·05—0·10,
Pulv. Doveri 0·01—0·02,
Sacchari 0·15.
 Mfp. tal. dos. N. 10. S. 3 pr. dzienne.

553. *Bismut. salic.* 0·05—0·10,
Pulv. Doveri 0·02,
Sacchari 0·15,
Mfp. dt. tal. dos. 10.
 S. 3 proszki dzienne.

554. *Saloli* 0·30,
Pulv. Doveri 0·15,
Bismut. salicyl. 1·90,
Mfp. div. in dos. 10.
 S. 4. proszki dzienne.

Przeciw anaemii woda pyrophosphoran. żelazista.

555. *Tannin.* 0·20,
Aq. dest. 80·00,
Vini Tokay 15·00,
Glycerin. 10·00,
Trae Opii gtts. tres.
 S. Co 3 godz. łyżeczkę.
 (Miesz. Gerhardta).

Starsze dzieci mogą używać wody Karlsbadzkiej na ciepło (Sprudel), wina chinowego i przetworów żelaza.

Enteritis follicularis.

Zmiana mamki. Odstawione dzieci wrócić do piersi. Śmietana Biederta lub zupa Liebiga za pokarm. Kleik jęczmienny, kawa żołądź., kakao.

Przeptukiwanie kiszki 1% woda słona, Liquorem alum. acetici aa. c. *Aq.* Toż i na wewnątrz.

556. *Liquor. alum. acet.* 30·00,
Aq. dest. 50·00,
Syrup 20·00.
 S. Co 2 godz. łyżeczkę.

Bismut. 0·10—0·20 pro dosi
 3—4 r. dzienne.

Chinin tannic. 0·05—0·10
 pro dosi.

W razie bóleści i parcia Extr. opii aq. 0·01 pr. dosi, 3—4 r. dz., Tra opii według wieku.

W razie krwawienia *Liquor ferri sesqui* 3—5 kropli kilka razy dz. Wśród zapadu herbata z cognakiem, wino czerwone, *liquor ammon. anis.*

Prolapsus ani.

Uwzględnić powody, któremi bywają: ogólne osłabienie, biegunka lub zaparcie stolca, parcie wywołane obecnością kamieni pęcherza, istniejącym załupkiem (phimosis).

W razie osłabienia rażzi Henoch podawanie przetworów Strychniny, jużto wstrzyknięcie (0·001—0·002 *Strychnin. sulphur.*) już do wewnątrz jako *Extr. nuc. vom.*

557. *Det. cortic chinæ e* 5·00
ad 100·00,

Extr. nuc. vom. 0·05,

Syr. aurant. 20·00.

MDS. 3 razy dz. łyżeczkę

lub też wstrzyknięcie ergotyny raz dziennie po 0·02—0·10 w okolicę międzykroczną, zdala od kieszki stolcowej.

Odprowadzenie dokonywa się palcem zawiniętym kawałkiem płótna zamazanego w oliwie. Wystająca część odbytnicy wchodzi łatwo, palec należy przy ruchach obrotowych zwolna wysuwać, po czem również zwolna płatek płócienny wydobyć. W razie powtarzania się wypadania o. można użyć przyżegania lapisem, lub posypać wypadniętą kieszkę ałunem. Dzieciom skłonny do częstego wypadania o. niepozwalać siadać na nocnik, lub umieścić je tak, aby nogami się nie opierały.

Coryza — Ozaena.

Leczyć chorobę, na której tle występuje: (kifa, zołzy, gruźlica). Zwracać na czystość powietrza, utrzymywać jednostajną ciepłotę, zaprzestać kąpieli. O-

strożne przestrzykiwania $\frac{1}{2}\%$ roztworem soli kuchennej, 1% kw. borowy, pędzlowanie maścią borową. W razie trudności przy ssaniu, karmienie osesków łyżeczką. Wdmuchiwanie ka-lomelu.

558. *Zinci sozjodolici* 2·00,
Vaselini

Lanolini aa. 20·00.

Paraf. liquidī q. s. f. ung.

S. Posmarować gazę i wkła-dać do nosa.

559. *Calomelanos* 1·00,
Hydrgr. praec. rubri 0·50,
Sacchari 20·00.

Mfp. S. Do wdmuchiwań.

Laryngitis acuta (Pseudo-croup).

Wziewanie pary wodnej lub słabych rozczynów soli, *Natr. carbon.*, *Ammon. mur.* jużto z inhalatora, jużto trzymając dzieci nad parą. Ciepłe okłady na szyję, kataplazmy. Podawać dużo ciepłych napojów, herbaty, mleka, w ostateczności środki wymiotne.

560. *Inf. ipecac. e* 2·00 ad 40·00,
Tart. stib. 0·05,
Syrup 10·00.

MDS. Co 10 minut łyżeczkę.

561. *Cupri sulphur.* 0·20,
Aqu. dest. 40·00,
Syrup 15·00.

DS. Co 10 minut łyżeczkę.

Dzieci skłonne do P. w czasie niepogody trzymać w domu.

Laryngitis crouposa.

W początku niezytu, czem się dławiec rozpoczyna, dać dziecko do łóżka i stosować środki wykrztuśne, w połączeniu z *Kali chloricum*, *Kali carbonicum*. W celu zachowania sił dziecka dać pożywną dyetę — skrobane mięso, jaja, winną polewkę, mleko z herbatą, cognakiem.

Nieużywać ani upustu krwi, ani pijawek, pryszczydeł. Lekkie środki przeczyszczające.

Aby zapobiedz wytwarzaniu się błon, zimne okłady na szyję, polykanie lodu lub lodów. Inhalacye z aparatu Siegla, już to z wody wapiennej, już to z podanych niżej środków, z początku co 3 godziny.

Obok tego improwizowana parówka t. j. okrywa się pewną małą przestrzeń pokoju prześcieradłami szczelnie. W takiej budce trzyma ktoś dziecko, aby wdychało parę, zrobioną przez puszczenie rozpalonego żelaza do wody w naczyniu na podłodze stojącym — powtórzyć parę razy dziennie.

W celu pobudzania do rychlejszego odrywania się błon, robi się weierania z szaruchy 3 razy dziennie, a to można połączyć z mięsieniem krtani. Podawać obficie napoje. Inhalacye częste, w pokoju utrzymywać dużo pary.

Wrazie silnej gorączki chinina, po 0·20—0·30 już to w proszkach, w roztworze do wewnątrz, już to w lewatywie, dawszy poprzednio lewatywę odczyszczającą. Gdy występują objawy ścieśnienia krtani, (stenosis) przyczem i błony zaczynają się odrywać, dawać środki wykrztuśne.

W razie upadku sił: wino, cognac, czarna kawa z rumem, kamfora. Jeżeli przy wdechu i wydechu słycać rżenia z odrywających się błon, wtenczas można dać środek wymiotny.

Gdy się jednak ścieśnienie krtani wzmaga, występuje zapadanie dołków nadobojczykowych, zaciąganie się dołka podsercowego, bezgłos i napady duszności — nie zwlekać z wykonaniem Tracheotomii lub intubacji.

562. *Inf. ipecac. e 0·20 ad 80·00,*
Kali chlorici 1·00,
Syrup rubid. 20·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

563. *Ungu. hydrgr. ciner.*

Lanolin aa. 6·00,

Mfung. div. in dos. N. VI.

S. 3 razy dnia po jednej sztuce wetrzeć w szyję.

564. *Ammon. muriatici 1·00,*

Aqu. dest. 200·00.

DS. Do inhalacyi.

565. *Acidi lactici 2·00,*

Aqu. dest. 300·00.

DS. Do inhalacyi.

566. *Sublim. corrosivi 0·05,*

Aqu. dest. 300·00.

DS. Do inhalacyi.

Używa się również do inhalacyi:

Kali chlorici 2½%, Acid. borici 2½%, Resorcini 1½%.

567. *Infus. ipecac. e 0·20 ad 100·00,*

Pilocarp. muriat. 0·02,

Syr. Rubi idaei 15·00.

MDS. Co pół godz. łyżeczkę.

568. *Pilocarpin 0·02,*

Ammon. carb. 2·00,

Kali chlor. 2·00,

Cognaci 20·00,

Syr. Senegae 25·00,

Aqu. dest. 170·00.

DS. Co godz. 2 łyżeczki.

569. *Inf. Senegae e 3·00 ad 80·00,*

Liquor amon. anisati 1·00,

Syrup simpl. 15·00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

570. *Inf. ipecac.*

e 1·00 ad 50·00,

Tart. emetic. 0·05,

Syrup rubid. 10·00.

MDS. Co 5 minut łyżeczkę aż do wymiot.

Radzą też w razie duszności, gdy niemożna robić tracheotomii:

571. *Aether sulphur.* 3'00,
Aether acetic. 1'00,
Menthol 0'10.

Co kwadrans kilka kroplic na wacie trzymać przed ustami, jak przy chloroformowaniu.

Angina diphtheritica.

Przedewszystkiem odłączyć chorego, dla zapobieżenia rozszerzenia tej choroby. Mieszkanie przewietrzać. Ciepłota w pokoiu 14—15 R. Dyeta pożywna, rosół, bulion, jaja, galarety mięsne, wino z wodą, herbata z cognakiem itp. Dużo płynów, lemoniada, woda ze sokiem owocowym. Leczenie rozpocząć lekkim środkiem przeczyszczającym, bądź kalomel w małej dawce, bądź *aq. laxativ. rheum.* Wobec miernej gorączki chinina po 0'20 do 0'50 (rano i wieczór) przy wysokich stopniach: antypyrina z cognakiem, również po 0'20—0'50, parę razy dziennie. Zmywanie całego ciała wodą z octem. Zimne okłady na głowę. Na szyję okład wysychający, zmieniany co 2 lub 3 godz. Płukanie z rozczyń: kali chloricum 2% Acid. boric. 3%. Dzieciom mniejszym przepłukiwanie gardła zapomocą strzykawki (z ostrożnością, aby podniebienia nie zranić — a w razie oporu, lepiej i tego zaniechać). Poddziwiania niezbyt często albo sokiem z cytryny, lub też Papayotin (1:20). Inhalacje co godzinę, w nocy co 2 godziny: Acid. boric. 2%, *Aq. calcis* na $\frac{1}{2}$ z wodą, Kali chlor. 2%, Sublimat 1:3000. Z leków do wewnątrz podawanych $\frac{1}{2}$ —2% rozczyń Kali chloricum w odwarze 5% kory chinowej. W uporczywszych i cięższych przypadkach, wcierania szaruchy po 5'00 dziennie w różne części ciała. Na obrzmiałe gruczoły okłady z li-

quor alum. acetici. Jeżeli błonica w nosie, lekkie przestrzykiwanie kw. borowym 3% lub kali chlor. 2%. W razie zapadu, eter, kamfora, czarna kawa, zagrzewanie kończyn, nacierania ciepłym octem, wina mocne, wstrzyknięcie eteru. ol. camphor. Jeżeli błonica przeszła na krtani, stosować leczenie podane przy Laryng. crouposa. Powikłania jak: Nephritis (codziennie badać mocę), otitis, pneumonia, leczyć według wskazań. Przeciwwpływaniom: dyeta wzmacniająca, chinina, przetwory żelaza, prąd stały. W czasie całego przebiegu zwracać uwagę: na serce, nerki i błony śluzowe.

Środki podawane do wewnątrz:

572. *Chinin. muriat.* 0'50—1'50,
Ammon. chlorati 1'00,
Aq. dest. 60'00,
Syrup rubid. 20'00.

DS. 3 razy dz. łyżeczkę.

573. *Antipyrin* 1'50—2'00,
Cognaci 20'00,
Aq. destil. 80'00,
Syrup simpl. 80'00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę.

574. *Kali chlorici* 0'50—2'00,
Aq. destil. 80'00,
Syrup rubid. 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

575. *Tinct. Myrrhae* 4'00,
Glycerini 8'00,
Aq. dest. ad 200'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

576. *Acti cort. chinæ* e 5'00 ad 100'00,

Natri salicyl. 2'00,
Syrup sacchari 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

577. *Pilocarpin muriatic.* 0'01,
Pepsin 0'20,
Acid. muriat. dil. gtts. V.
Aq. dest. 80'00,
Syrup simpl. 20'00.

DS. Co godz. łyżeczkę (po każdej łyżeczce wino mocne).

- 578.** *Ol. Terebinth. rectif.* 8·00,
Pulv. gum. ar. q. s.
Aq. dest. 120·00,
Syrup simpl. 20·00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę (po-
pić mlekiem).

- 579.** *Camphor.* 0·30,
Mixt. gumm. 80·00,
Syrup sacchari 20·00.

DS. Co g. łyżeczkę, (zwłaszcza w formie septycznej).

580. *Aether. acet.* 5.00,
Ol. cinamom. 1.50.

DS. Co 2 godz. 3—5 kropli.

Arak co 1/2 godz. łyżeczkę, aż do upojenia.

581. *Kali chlorici* 5'00,
Trac myrrhae 15'00,
Acid. carbol. gtts. V.
Mel despum. 20'00,
Aq. dest. 150'00.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 15 kropli.

Leczenie miejscowe: Okłady z lodu na szyję (w woreczkach gumowych), pić wodę z lodu z dodatkiem wina czerwonego, lody owocowe. Później przy rozpadzie błon lub zgorzeli, przejść do ciepłych okładów i kataplazmów. Inni radzą od początku ciepłe okłady i kataplazmy co $\frac{1}{4}$ do $\frac{1}{2}$ g. zmieniać, pokarmy ciepłe, płukania ciepłe.

Płukania:

Aq. calcis, *Acid. salicyl.* $1^0/0$,
Ac. boricum $2^0/0$, *Kali chloric.* $2^0/0$, *Sublimat.* $1^0/00$, *Thymol* $1^1/2^0/0$, *Menthol* $1^1/2^0/0$.

Pedzłowania:

582. *Solut. acid. citr. e* 10·00:
50·00,
Resorcin 3·00,
Glycerin 30·00.

S. Co 2 godz. pędzlować.

- 583.** *Acidi salicyl.* 0·50—1·00,
Spir. vini q. s.
Glycerin. 40·00,
Infus. fol. Eucalypti 60·00.

DS. Co godz. zwilżyć watę
zamoczoną w tym płynie,
miejsca bl. zajęte.

- 584.** *Acidi carbol. cryst.*
Acid. citric. cryst.
Træ jodi āā. 3—5'00,
Franz-Cognac 100'00.

MDS. Co 2 godz. pedzlować.

585. *Ferri sesquichl.*
Glycerin. āā. 10·00.

DS. Pędzłowanie 3 razy dz.

Wdychiwania (Inhalacye):

Para wodna

Acid. carbol. 2:500.

Kali chloric. 1^o/₁₀.

Aq. calcis āā. c. Aq. dest.

Acid. lacticum 1⁰/₀.

Sublimat 0·02 : 200·00.

Resorcin 1⁰/₆. Glycerin 1:4.

Wdmuchiwnia:

Cukier proszkowany — obficie
i często.

Sól kuchenna (grubo nakładać).

Kali chloricum.

Menthol 1·00. *Sacchari pulv.* 20.

2—4 razy dziennie.

Flor. Sulph., Chin. sulf. āā. 0·20

2 razy dziennie.

Jodoform co 3 godziny.

- 586.** *Natr. sozodolici* 10·00,
Flor. sulphur. 12·00.

Mfp. S. Do wdmuchiwań do
ust i do nosa.

Bronchitis acuta et chron.

Dzieciom z nieżytem oskrzeli bez gorączki, woda Szczawnicka lub Selterska z mlekiem, przy częstym kaszlu:

- 587.** *Inf. ipecac* e 0·10 ad 80·00,
Ammon. muriat. 1·00,
Aq. lauroc. gtts. X.
Syrup simp^l. 15·00.

DS. Co godz. łyżeczkę.

Nieżyty oskrz. na tle krzywicy lub zołzów, wymagają użycia tranu, żelaza i jodu. Inhalacya z wód alkalicznych, pobyt w miejscach lesistych i górzystych, lub nad morzem. Dyeta posilna, łatwo strawna (mleko, jaja, mięsa siekane). W razie n. o. z gorączką, położyć dz. do łóżka, środki wykrztuśne.

Jeżeli wykrztuszanie skape Natr. jodat. (0:50:100 w naparze ipeki) lub: Senega (e 5:00:100:00). Wdychiwania pary. Jeżeli wydzelina obfita, dodać do Senegi Liquor amm. anis. W razie ustania wykrztuszania, sinicy: flor. benzoës, wino mocne, Cognac, ciepłe kąpiele z zimnemi polewaniami. Dzieci małe często nosić na rękę.

588. *Det. cort. chinæ e 3:00*
ad 100:00,

Natri jodat. 1:00,

Traç bellad. gtts. duas

Syr. altheae 20:00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Jeżeli w przebiegu n. o. pojawia się astma, podawać przewory jodu (kali jodat. Syrup. ferri jodat.) przeciw napadom można użyć chloralu a nawet małych dawek morfiny (0:002 dzieciom 5—6 letnim).

Bronchopneumonia u dzieci.

Środki wykrztuśne, kompresy z wystawionej wody co 6 godzin. W razie potrzeby leki podniecające (kamfora, acid. benzoic. $\bar{a}\bar{a}$ 0:015 co 2 godz.). W razie zbyt wielkiej duszności, wyjątkowo środki wymiotne.

589. *Inf. ipec. e 0:20 ad 60:00,*

Liquor. ammon. anis 1:00,

Syrup altheae 20:00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

590. *Inf. ipec. e 0:20 ad 100:00,*

Natri Salic. 1:00,

Syrup altheae 20:00.

DS. Co godz. łyżeczkę.

Zresztą leczenie podane pod Bronchitis.

Pneumonia crouposa.

Leczenie więcej wyczekujące (upusty krwi szkodliwe) podawanie kwasków acidum mur. 1%, acid. phosphor. $\frac{1}{2}\%$, zimne okłady na głowę. Środków przeciwgorączkowych ile możliwości najmniej, gdyby jednak wysoka gorączka tego wymagała, daje się Antipyrinę po 0:10—20 pro dosi, toż phenacetynę, Salipyrinę, najlepiej z dodatkiem Coffeiny po 2 do 3 razy dziennie. Digitalis niebezpiecznie podawać.

Przeciw objawom ze strony mózgu lub żołądka: Calomel (0:05—0:10). W razie zapadu, osłabienia serca, czarna kawa, cognac, szampan, kamfora. Wczasy znacznego spadku ciepłoty, wino. Po przełomie choroby środki wykrztuśne. P. Bronchitis.

Pneumonia chronica.

Leczenie polega głównie na środkach wzmacniających, pożywnej dyecie, z leków: przetwory chinowe, tran, żelazo, syrop jodowo-żelazisty. Zmiana powietrza, pobyt w miejscach klimatycznych, lesistych, nadmorskich (na zimę Riviera, Arco).

Tuberculosis pulmonum.

Przy podejrzeniu gr. dziedzicznej gra ważną rolę zapobieganie wybuchowi choroby. Zwracać uwagę na najlżejsze sprawy kataralne, zwłaszcza w przypadkach odry, koklusu itp., strzedz przed obcowaniem z osobami o gruźlicę podejrzanymi, matkom gruźliczym niedozwalać karmienia dzieci. Żywienie powinno być odpowiednio do okresu siły trawiennej najpożywniejsze. W miarę wieku dziecka począwszy od mleka prze-

chodzić do mocnych rosółów, kakao, jaja, małe ilości piwa, wina wreszcie dyeta przeważnie mięsna. W miarę możliwości zwłaszcza przy przewlekłych niezbytach, pobyt w okolicach górskich. (Pobyt nad morzem przy rozwiniętej gruźlicy szkodliwy).

W celu poprawy odżywienia podawanie tranu, arsenu, żelaza. Najłżejsze biegunki wymagają troskliwego leczenia.

Przy skłonności do krwiotłucia, zabronić gorących pokarmów herbaty, kawy i picia wody obfitej w kw. węgl.

Przeciw gorączce chinin (0.15—0.30) acid. Sal. (0.25 pro dosi).

591. *Gnajakoli carbon.* 0.10—0.20,

Sacchari 0.20.

Mfp. dtur. tal. dos. N. 20.

S. 3 pr. dziennie.

592. *Acid. salicyl.* 2.00,

Aqu. dest. 100.00,

Cognaci 5.00,

Syrup 20.00.

DS. Co godzinę łyżeczkę.

593. *Kreosoti gsts.* 5,

Aqu. dest. 70.00,

Syrup 15.00.

DS. Co 3 godziny łyżeczkę.

594. *Kreosoti* 1.50,

Solv. in Ol. amygd. 30.00,

Gum. ar. 20.00,

Aqu. dest. 80.00,

Syr. amygd. 20.00.

Mf. emuls.

DS. 2 razy dzien. łyżeczkę.

595. *Guajacol* 1.00,

Trae chinæ 2.00,

Vini Malac. 100.00.

MDS. 3 razy dziennie łyżeczkę po jedzeniu.

596. *Guajacol* 2.00,

Spir. vini rectif.

Aq. menth. pip. āā. 50.00,

Ol. jecor. 50.00.

MDS. Skłóciwszy, 4 razy dzien- nie podać łyżeczkę.

W razie krwiotłucia: spokój, lodowe okłady na klatkę piersiową.

Plumb. acet. (0.03 pr. dos.) kilka razy dziennie.

Extr. secal. cornuti, przy kaszlu Codeina, morfina. W razie biegunki Aq. Calcis z mlekiem.

Atelectasis pulmonum.

U noworodków ciepła kąpiel zimne polewanie i nacieranie ciała. Dzieci takie należy często nosić, budzić ze snu, i co godzinę karmić. Obok świeżego powietrza, ogrzewać (gorącemi flaszkami w pościeli). U starszych uwzględnić przyczynę: osłabienie po wyczerpujących chorobach, biegunkach, krzywicy, ugniot przez wysięk w opłucnej, niezbyt w drobnych oskrzelach. W tym ostatnim przypadku, środki wymiotne, wino, cognac, łyżeczka herbaty z paru kroplami rumu.

597. *Liquor. ammon. anis.* 1.00,

Aq. destil. 50.00,

Syrup Sacchari 15.00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

598. *Aetheris sulphur.* 10.00.

DS. Jedną lub 2 krople we wodzie.

Pleuritis.

Bezwarunkowe leżenie w łóżku, aż do ustąpienia wypociny, względnie do przejścia w stan chroniczny. Dyeta płynna, pożywna. Ból uśmierza się bańkami, okładami zimnemi. Przeciw gorączce Natrum salicyl. 0.10—0.30 pro dosi, co 2 godz.). Chinina, antipyrina w małych dawkach (po 0.10—0.20). Męczący kaszel uśmierzać narkotykami Jeżeli wypociny nie przybywa, można rozpocząć pędzlowanie tinct. jodową i okłady wysychające. Wewnętrznie Natr. Salicyl. oraz środki moczopędne

(kali acetu, Coffeina, Calomel itp.) w późniejszym okresie dobrze działają przetwory jodowe. W razie wzmaganą się wypociny sprowadzającej duszność wskazaną jest punkeya próbna, poczem, gdy się pokaże wypocina surowicza, można poprzestać na punkeyi. W razie wypociny ropnej, pewniejsza resekceya żebra.

Na dokończenie kuracyi wyjazd do miejsc klimatycznych, leczenie w gabinetach pneumatycznych. W końcu zaznaczając, że najczęstszym powodem bywa gruźlica, zwracać uwagę na możliwe objawy tej choroby i odpowiednio zarządzić leczenie, a mianowicie podawaniem kreozotu itp.

599. *Dct. cort. chinae* e 5'00
ad 100'00,
Natri Salicyl. 2'00,
Coffeini natrobenz. 0'15,
Syrup aurant. 20'00.
MDS. Co 3 godz. łyżkę.

600. *Dct. ononid. spin.* e 5'00
ad 100'00,
Liquor kali acet. 3'00,
Oxymel Scillae 15'00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

601. *Syrup ferri jodat.* 10'00,
Syr. simpl. 20'00.
MDS. 3 razy dz. po 20 kropli.

Pertussis. Koklusz, Krztusiec.

Oddzielić dzieci zdrowe zwłaszcza małe. Dyeta pożywna, karmić zaraz po wymiotach. Pobyt na świeżem powietrzu, oddychanie zgęszczonem powietrzem, zmiana miejsca pobytu. Rozpylanie 5^o/₁₀ kw. karbol. w mieszkaniu. — Przy napadach dobywać palcem w szmatkę zawiniętem wydzielinę.

W razie wystąpienia zapalenia płuc (napady czasem ustają) dawać leki wykrztuśne:

Inf. ipecac. c. Natro benzoico.

602. *Trae bellad. gtt.* 2—5,
Mixtur. gummos. 100'00,
Syrup simpl. 15'00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

603. *Chloral hydratis* 0'50,
Ammon. v. Natri brom. 2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Mixtur. gumm.
Syrup rubid. āā. 15'00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

604. *Cocain mur.* 1'00,
Aqu. dest. 10'00.
MDS. Do pędzlowań, przelyku i krtani.

605. *Morphii mur.* 0'01—0'02,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup altheae 15'00.
MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.

606. *Chinini muriat.* 0'50,
Natr. bicarb.
Sacchari āā. 1'50,
Mfp. div. in dos. 10.
S. Co 3 godz. proszek.

607. *Trae alcohol. rad. aconit.*
Trae bellad. āā. gtt. 10,
Aqu. amygdal. amar. 1'00,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup aurant. 20'00.
MDS. 3—4 r. dz. łyżeczkę.

608. *Coccionell pulv.* 1'00,
Kali carbon. 3'00,
Sacchari 10'00,
Aq. dest. 100'00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

609. *Antipyrin.* 1'00,
Terpinkhydratis 1'00,
Aqu. tiliae
Syrup aurant āā. 50'00.
MDS. 4—5 r. dz. łyżeczkę.

610. *Extr. hyosc.* 0'20,
Linctus gummosi 100'00,
Syrup rubid. 20'00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

611. *Codeini mur.* 0'05,
Linct. gumm. 60'00,
Syrup altheae 30'00.
MDS. 3—5 łyżek dziennie.

- 612.** *Antipyrin* 0·50—1·00,
Aqu. de Vichy 80·00,
Syrup rubid. 20·00.

DS. Używać zaraz po napadzie łyżeczkę. — Wyżyć w ciągu 24 godzin.

- 613.** *Det. hbae Thymi*
 10·00 ad 200·00,
Ammon. bromat. 2·00,
Syrup altheae 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

- 614.** *Bromoformii* 5·00.

DS. Dzieciom

do roku życia 2—3 kropli,
 od 2—4 lat 3—4 „
 do 8 lat 4—5 „
 3 razy dziennie podać w łyżeczce wody.

Ponieważ bromoform perelkami osiada, uważać, aby dzieci połknęły (Br. należy chronić przed światłem, a gdy zecerwienie, odrzucić).

- 615.** *Acidi benzoici*
Bismut. salicyl. āā. 5·00,
Chinin sulph. 1·00.

Mfp. DS. 2 r. dziennie wdychać do nosa.

- 616.** *Acidi borici*
Coff. tost. āā. 5·00.

Mfp. DS. 2 r. dziennie wdychać do nosa.

- 617.** *Thymoli* 1·00,
Spir. vini rectific. 250·00,
Aqu. dest. 750·00.

DS. Do inhalacji.

Jako środek, zmniejszający ilość napadów, znoszących wymioty, polecają kreozot. Podaje się albo w syropie (0·50:100·00) dzieciom od 1½—2 mies. 2 łyżeczki dzien., starszym 6—8 łyżeczek, lub też we winie z wodą aromatyczną i syropem.

- 618.** *Creosoti* 0·25,
Sulphonal 0·20,
Syrup tolutani 150·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę (przed użyciem wstrząsnąć).

- 619.** *Antispasmini* 1·00,
Aq. amygd. amar. 10·00.
 S. 1—2 r. dz. po 10 kropli.

Eclampsia infantum.

Uwzględnić przyczyny: Początki chorób ostrych i zakaźnych, zimnica, wpływ przestraszenia, użycie środków odurzających, przepalenie głowy, kolki brzuszne, niestrawność, robaki, choroby dróg moczowych (phimosis), kokałusz, skurcz głosi, ciała obce w nosie, zranienia.

Wśród samego napadu zimne okłady (woda z octem) na głowę co parę minut, lewatywy, gorczyzniki na kark i łydki, w razie długotrwałych drgawek wdychanie chloroformu (ostrożnie!) kilka kropel na chusteczkę trzymać pod nosem. Lewatywy z chloralu.

W razie powtarzających się napadów:

- 620.** *Chloral hydratis* 1·00,
Natri bromati 1·00,
Aqu. dest. 60·00,
Syrup sacchari 15·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

- 621.** *Chloral hydratis* 0·50,
Aqu. dest. 80·00,
Mucilag. gum. ar. 20·00.

MDS. Połowę do jednej lewatywy.

- 622.** *Urethani*
Sacchari āā. 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. V.
 S. Co 2 godziny proszek w łyżeczce wody.

Jeżeli stolec zaparty:

- 623.** *Calomelanos* 0·30,
Sacchari 2·00,
Mfp. div. in dos. N. X.
 DS. Co godzina proszek.

Meningitis simplex.

Zimne okłady na głowę, wcieranie szaruchy (2·00—4·00) w tyłogłowie i kark. Wewnętrznie

Calomel (0·01—0·03 co godzinę), pryszczydła — starszym dzieciom i silnym można postawić pijawki. W razie drgawek chloral w lewatywach. Przeciw wymiotom pigułki lodowe. Po uspokojeniu unikać gwaru, rażącego światła; dyeta z początku ścisła, później pożywna.

Przetwory jodowe, Natrum jodatum 1% co 2 godz. łyżeczkę, wcieranie 10% maści jodoform.

Meningitis tuberculosa.

Jeżeli dzieci chudną, gruczoły obrzmiewają dawać chinin z żelazem i wcierać jod w gruczoły. Gdy choroba wybuchnie, leczenie według objawów. W pierwszych chwilach przeciw podrażnieniu mózgu natr. bromat. (1—2 grm. pro die) zimne okłady na głowę. Pokój zaciemnić. Lewatywy i środki przeczyszczające. Pokarmy dawać często w małych ilościach. Baczność na oddawanie moczu.

624. *Calomelanos* 0·30—0·50,
Sacchari 2·00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
DS. Co 2 godz. proszek.

625. *Kali v. Natr. jodat.* 1·00—2·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup Sacchari 20·00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

626. *Natri bromati* 1·00—2·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup Sacch. 20·00.
MDS. Co 2 godz. 2 łyżeczki.

W razie wielkiego rozdrażnienia lub drgawek:

627. *Chloralhydrat.* 1·00,
Natri bromat. 1·00,
Aqu. dest. 80·00,
Syrup rubid. 20·00.
MDS. Co godzinę łyżeczkę.

628. *Urethani* 1·50,
Natri brom. 0·50,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup simpl. 15·00.
MDS. Co godz. łyżeczkę.

629. *Jodoformii* 2·00,
Lanolin
Vaselin aa. 10·00.
Mf. ungu. DS. Wcierać na tyłogłowie.

Po obciążeniu włosów przy skórze posmarowawszy przykryć cienką ceratką.

Hydrocephalus.

H. acutus. Zimne okłady, wcieranie szaruchy (po 2·0—4·0 dziennie na głowę i kark), wewnętrznie podać Calomel, (0·01—0·03 co godzinę).

Dzieciom silnym można postawić 2—4 pijawek.

W razie drgawek chloral (0·50—1·0 pro dosi). Synapizm na ną łydki i kark.

Leczenie krzywicy i zołzów.

H. chronicus. Leki moczopędne (*Kali aceticum*, *Juniperus*) leki przeczyszczające. Wypuszczenie płynu (*punkcya*) niewiele rokuje. Somma radzi leczyć działaniem słońca na głowę: codziennie $\frac{1}{2}$ godziny do 50 minut.

Trismus et Tetanus neonatorum.

Główną uwagę zwrócić na pępek, opatrunek przeciwnilny.

Chloral po 0·05 pro dosi, kilka razy dziennie, w mleku, wlać przez nos lub w lewatywie (w podwójnej dawce), Sulfonal 0·20 p. dosi w lewatywie po każdym napadzie. Sole bromowe po 0·50 na dzień. Ciepłe kąpiele 28° R. kilka razy dziennie. Karmić mlekiem, również przez nos. Lewatywy odżywcze z mleka po 50 ctm. sześć. co 2 godziny.

Chorea minor.

Dobre odżywianie, pobyt na świeżem powietrzu, gimnastyka lecznicza, chociaż w cięższych przypadkach w samym początku, lepiej dzieci trzymać w łóżku. Zabronić nauki, dozwolić dużo spać. Jeżeli na tle niedokrewności, blednicy, reumatyzmu; podawać przetwory chininy i żelaza, w ostatnim przypadku, przetwory salicylu. Kąpiele letnie, siarczane, kąpiele borowinowe (Mattoniego sól borowinowa) (24—26°) prąd stały. Rozpylanie eteru na kręgosłup. W cięższych przypadkach, w celu uspokojenia można podawać chloral, Urethan, Sulfonal, aby wywołać dłuższy sen.

630. *Solut. arsen. Fowleri,*

Trae ferri pomati āā. 5'00.

DS. 3 r. dnia po 2—3 kropli po jedzeniu. Można postąpić do 5-ciu kropli.

Wody arsenowe: Gubera 2—3 łyżek, Levico i t. d.

631. *Chloral. hydrat. 4'00,*

Natri bromati 2'00,

Aqu. dest.

Syr. aurant. āā. 25'00.

MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

632. *Kali jodati 2'50,*

Aq. dest. 150'00.

DS. 3 r. dz. łyżkę.

633. *Natri bromati 0'20,*

Chinini ferrocitrici 0'10,

Sacch. 0'20,

Mfp. Dtr. tal. dos. N. XV.

DS. 3 pr. dziennie.

634. *Sulfonali 0'25—0'50,*

Dtur. tal. oos. N. V.

S. Na noc proszek.

Prócz tych środków, zachwalano w ostatnich czasach antipyrinę po 2—3 gram. dziennie (0'50 pro dosi) nie widziałem jednak nigdy skutku.

635. *Propylamini 1'00,*

Aqu. menth. pip. 50'00,

Syrup simpl. 20'00.

MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

(Przez 3—4 dni).

636. *Exalgin 1'00,*

Solve in spir. menth. pip. 5'00,

Aquae tiliae 120'00,

Syrup aurant. 30'00.

MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

Enuresis nocturna.

Uwzględnić powody: Ascaridy, Oxyuris. Phimosi, pavor nocturnus, zboczenia w odżywieniu, Onania.

Zimne obmywania, kąpiele nasiadowe chłodne od 5—20 minut, na wieczór, wstrzymywać od napojów. Polecać przez dzień wstrzymywać moc.

Polecają unikać spania na wznak, lub ułożyć pacjenta, aby była podwyższoną miednica. Prąd stały, a mianowicie wprowadzić wąską elektrodę metalową (nasmarowaną oliwą) do odbytnicy (u dziewcząt do pochwy) drugą elektrodę zwilżoną na spojenie kości łonowych lub perineum, prąd słaby można zwolna wzmacniać — elektryzować przez 5 minut. Antipyrina po 0'50—1'00 na noc między 9 a 11 godziną przez 14 dni z rzędu.

637. *Atropin sulphur. 0'05,*

Aqu. dest. 30'00.

DS. Po tyle kropli ile dziecko ma lat, o 4 i 7 g. wieczorem.

638. *Extr. chinæ aqu. sic. 5'00,*

solve in

Aqu. dest. 100'00,

Natri bromati 2'00,

Trae bellad. gtts. X.

Syrup sacchari 20'00.

MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

639. *Extr. bellad. 0'05,*

Extr. nuc. vomic. 0'10,

Sacchari 2'00,

Mfp. div. in dos. N. X.

DS. Na noc jeden proszek.

640. *Strychnini nitrici* 0·001,
Sacchari 10·00,
Mfp. div. in dos. aequal.
N. XX.

S. Na noc proszek.

641. *Ext. fluid rhuris arom.* 10·00.
 S. 5—10 kropli 2 razy dziennie
 podawać we wodzie.

Wrazie nadezłości pęcherza,
 podać na noc Chloral na we-
 wnątrz lub też w lewatywie. Po-
 lecają też przyszczydła przyłożyć
 na kark.

Skrofulicznych i źle odżywio-
 nych leczyć zarazem chininą i
 środkami żelazistemi.

Ascaris lumbricoides

Zabraniać pokarmów mącz-
 nych, natomiast mleko, mięso.

642. *Santonin* 0·15 (—0·20),
Ol. ricini 50·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

643. *Santoni* 0·03,
Calomel. 0·05,
Pulv. rad. rhei 0·15,
Sacchari 0·20,
Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 6.
 S. Rano i wieczór proszek.

644. *Pulv. sem. cinnae* 4·00,
Pulv. rad. Jalap.
Sacchari aa. 2·00,
Mfp. divid. in dos. Nr. 4.
 DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. proszek.

Po użyciu tych środków, do-
 brze jeszcze dawać duże lewa-
 tywy z wody, lub Sublimatu
 (1:2000).

Thymol 0·10—0·30 *pro dosi.*

645. *Jodoform* 0·03,
Natri bicarb. 0·25,
Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 5.
 S. 3 razy dz. proszek.
 (Na drugi dzień *Ol. ricini*).

Oxyuris vermicularis.

Lewatywy z wody, czosnku
 roztartego w wodzie (garść na 1
 litr) z $\frac{1}{2}\%$ roztworu sublimatu,

Kalendarz lekarski. 1896.

lub też lewatywy z czystego
 tranu.

646. *Butyri Cabao* 3·00,
Calomelanos 0·05,
Mf. supposit. Dtur. tal. dos.
N. V.

S. Na noc jeden czopek.

647. *Naphthalin* 1·00,
Ol. olivar 40·00.

MDS. Do lewatywy.

Dorośłym 5—6·00:80·00 oliwy.

Morbili, Odra, Kar.

Niemowleta i chorowite dzieci
 oddzielić. Jeżeli przebieg prawi-
 dłowy nie trzeba uciekać się do
 lekarstw. Pokój ostrożnie prze-
 wietrzać, ciepłota od 15—16° R.
 okrycie średnio ciepłe, lekkie
 przysłonięcie okien, jeżeli jest
 światłowstręt.

Dyeta w czasie gorączki ścisła,
 po jej przebyciu pożywna, za
 napój lekkie kwaski, lub wody
 (szczawy alkaliczne). Dopóki
 trwa łuszczenie nie wypuszczać
 dzieci z łóżka, a mniej więcej 8—
 14 dni nie wypuszczać z poko-
 ju, zwłaszcza, gdy są objawy
 nieżyty.

Przeciw nieżyтови spojówek
 wystarczają przemywania $\frac{20}{100}$
 kw. borowego. Silny świąd uspa-
 kaja się nacieraniem tłuszczami

648. *Lanolin anhydr.* 50·00,
Vaselin americ. 20·00,
Aq. dest. 25·00.

Ms. terendo f. Ung.

S. Co 3 godziny nacierać.

Silny kaszel wymaga podania
 naparu ipecac. ze środkami nar-
 kotycznymi, wziewania pary wo-
 dnej, napoje ciepłe, odwar śla-
 zu i t. p. W razie biegunki dya-
 ta i opium.

Wysokie gorączki i majacze-
 nia, uśmierzać zimnemi okłada-
 mi na głowę. Chinina — anti-
 pyryna, Nafr. salicylicum.

Wśród upadku sił, stygnięcia kończyn: wino, cognac, camphora, Acid. benzoicum.

Przeciww drgawkom: Chloral w lewatywach (0:50:50) kali bromatum (2:100) co godzinę łyżeczkę.

Jeżeli gorączka przewleka się ponad 4 dni, zwrócić uwagę na przelyk, uszy i nerki.

Powikłania: błonica, dławiec, nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, leczyć według wskazań odpowiednio podanych.

649. *Codeini phosphor.* 0·02,
Linctus gummosi 50·00,
Syrup Altheae 30·00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę w razie silnego kaszlu.

650. *Extr. hyoscyami* 0·15,
Aqu. dest. 70·00,
Syr. simpl. 10·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

651. *Infus. ipecac. e* 0·20 *ad*
100·00,
Tinct. laudani gtt. duas.
Liquor ammon. anisat. 1·00,
Syrup altheae 20·00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Scarlatina.

Ścisłe odłączenie chorych, aż do zupełnego złuszczenia t. j. 5—6 tygodni, poczem należy mieszkanie odwietrzyć, okna, podłogi wymyć 5% kw. karbolowym. Dzieci szkolne w mieszkaniu będące, do szkoły nie porysować.

Pokój troskliwie przewietrzać, ciepłota 13—14° R. wystarcza, bieliznę można często zmieniać.

Za pożywienie: mleko, rosół, po ustąpieniu gorączki dyeta pożywniejsza, lecz nie zaraz mięsna. Za napój podawać można czystą wodę, kwaski.

Płukanie gardła częste 2% kw. borowym, 2% kali chloricum. W razie silnej gorączki, zimne

okłady na głowę, chinina, antipyrina (ostrożnie), Natr. salicyl.

Na obrzęki gruczołów okłady z liquor aluminium acet., weierania szarej maści. Skoro tylko wystąpi chębotanie, przecinać.

W razie znacznego świądu:

652. *Lanolin anhydric.* 50·00,
Vaselin. americ. 20·00,
Aqu. dest. 25·00.
M. terendo f. ung.

S. Do nacierań.

Drgawki, majaczenia uspakać okładami z lodu; lewatywami z chloralu (0:50:50·0).

W razie zapadu, osłabienia serca, Cognac, mocne wino, czarna kawa, kamfora.

Powikłania z błonicą (dyfterya), wysiękiem w opłucnej, błony brzusznej, zapaleniem stawów, chorobami ucha, rakiem wodnym, zapaleniem nerek — zob. odpowiednie rozdziały.

653. *Chinini muriat.* 0·30,
Dtur. tal. dos. 10.

S. Rano i wiecz. proszek.

654. *Antipyrin* 0·25,
Dtur. tal. dos. N. X.

S. Co 4 godz. proszek.

655. *Natr. salicyl.* 0·30.
Dtur. tal. dos. N. X.

S. Co 3 godz. proszek.

656. *Natr. salicyl.* 3·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup rubid. 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

657. *Liquor ammon. anis.*
Aether. sulphur. āā. 5·00.

MDS. Co 2 godz. po 10 kropli w czarnej kawie.

658. *Camphorae* 0·50,
Spir. vini
Aqu. dest. āā. 5·00.

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań.

659. *Acidi benzoici* 0·20,
Sacchari 2·00,
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. Co 2 godz. proszek.

Od początku płonicy należy mocz codziennie badać. Od pierwszej chwili zapalenia nerek podawać dużo mleka.

Przy zaparciu stolca 2—3 dawek Calomelu; w razie bólu w okolicy nerek, postawić 5—10 suchych baniek. Dopóki w osadzie z moczu znajduje się wiele ciałek krwi i wałeczków, nie podawać leków moczopędnych lecz ściągające.

660. *Acidi tannici* 0·50,
Chinin. sulphur. 1·00,
Sacchari 2·00,
Mfp. div. in dos. N. 6.
 S. 3 proszki dziennie.

661. *Chinini tannici* 4·00,
Div. in dos. N. X.
 S. 3 razy dziennie proszek.

662. *Solut. acid. tannici*
 2·00 ad 100·00,
Solut. natri bicarb. q. s. ad
react. alcal.
Syrup rubid. 20·00.
 MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

W razie silnego krwawienia:

663. *Liquor ferri sesquichl.*
gtts. X.
Aq. cinnamom.
Syrup simpl. āā. 50·00.
 S. Co godz. łyżeczkę.

Jeżeli się pojawia znaczna puchlina, lub ucisk na płuca, podawać wcześniej leki moczopędne a przy towarzyszącej anemii żelazo n. p. *Tra ferri* po 3 r. dzień. po 15 kropli.

664. *Infus. fol. digital.*
 e 0·20 ad 100·00,
Liquor Kali acet. gtts. XX.
Syrup simpl. 15·00.
 MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

665. *Dcti equiset. e* 3·00 ad
 100·00,
Liquor Kali acet. gtts. XX.
Syrup simpl. 15·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Można też używać w razie dłużej trwającej puchliny, kąpiei na 29° R., 5—10 minut i zawiązania w koce na 2—3 godziny; przeciwwskazanie stanowi tylko stan zapalny płuc lub osłabienie serca, w kąpiei dawać zimne okłady na głowę.

Variola.

W okresie zwiastunów, przeczyszczenie. Przewietrzać pomieszkanie, ciepłota pokoju 14—15° R., lekkie przykrycie chorego, dyeta pożywna płynna, mleko, mocny rosół z żółtkiem. Dużo wody, orszada, woda z winem. Przeciw bólowi głowy lodowe okłady. Napięcie skóry łągodzić smarowaniem tłuszczów (oliwa, vaselina, 5% maść borowa). Kąpiele ciepłe, a gdy to niemożliwe, zmywania ciepłą wodą, zwłaszcza twarz i powieki. Płukanie: 2% Kali chloricum, 3% kw. borowy.

666. *Kali chloric.* 5·00, *solve in*
Infus. flor. tiliae 300·00,
Trae laudan. 1·00,
Mell. rosati 10·00.

DS. Płukanie.

667. *Tannin. puri* 1·00,
Alumin. 0·50,
Kali bromat. 5·00,
Mucilag. gum. ar. 25·00,
Aqu. dest. 200·00.

DS. Płukanie.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub wstrzyknięcie morfiny w okolicę dołka podsercowego.

W razie bezsenności:

668. *Chloralhydrat* 3·00,
Aqu. dest. 60·00,
Syrup rubid.
Mucilag. gum. ar. āā. 20·00.
 DS. Połowę na raz użyć.

669. *Sulfonali* 0·50,
Dtur. tal. dos. N. 5.

S. Na noc proszek w herbacie
 lub rosole.

Zaraz po wybuchu wysypki
 dać na głowę, twarz i szyję
 maskę z płótna, pozostawiwszy
 otwory na nos, oczy i usta, po-
 smarowaną pastą:

670. *Acid. carbol* 3·00,
Amyli
Ol. amygdal. dulc. āā. 50·00.

Resztę ciała smarować często:

671. *Acid salicyl* 3·00,
Amyli 30·00,
Glycerin neutr. 70·00.
 Mf. Pasta.

A oprócz tych środków:

672. *Ol. amygd. dulc.* 15·00,
Syrup flor. aurant. 30·00,
Aqu. lauroc. 10·00,
Chinin. hydrochlor. 0·50,
Solve in acid. hydrochlor. q.
s. f. emulsio.
 S. Co kwadrans do $\frac{1}{2}$ godz.
 po kilka kropki (Leventaner
 z Konstantynopola).

Wstrzymuje też rozwój wy-
 sypki Cocaina, jużto 3—4 wstrzy-
 knięć podskórnych rozczy-
 nem 2^o/_o, już też (0·20:125 mixt. gum.)
 w przeciągu 24 godzin podana.
 Ciepłota ma spadać szybko i roz-
 wój wysypki ustaje.

W osłabieniu serca: kamfora,
 wino, cognac na pół z wodą
 z żółtkiem i cukrem, co godz.
 łyżkę. Ropnie wcześniej otwierać.

Varicella.

Lżejsze przypadki nie wyma-
 gają leczenia, prócz lekkiej
 diety, oraz pozostania w po-
 koju zwłaszcza, w chłodniejszej
 porze roku. Swędzenie usuwa
 się obfitami zasypkami, owrzo-
 dzenia wymagają opatrunków.
 Należy zwracać uwagę na zda-
 rzające się powikłanie z zapa-
 leniem nerek, w skutek czego
 po 3 tygodniu mocz badać trzeba.

673. *Acidi Salicyl* 0·50,
Alumin plumosi 50·00.
 Mfp. S. Zasypka.

Dr Franciszek Murdziński.

Tabela wzrostu i przybierania na ciężarze zdrowego dziecka.

1. **Przeciętna długość** noworodka wynosi: chłopca 50 ctm. — dziewczynki 49 ctm. Dalszy wzrost ciała odbywa się według następującej tabeli:


Wiek dziecka	Przybytek	Przeciętna długość
	Ctm.	Ctm.
W 1 miesiącu	4	54
" 2 "	3	57
" 3 "	2	59
" 4 "	1	60
Od 5 miesiąca aż do 1 roku	9	69
W 2 roku	9	78
" 3 "	7	85
" 4 "	6	91
" 5 "	6	97
" 6 "	6	103
" 7 "	6	109
" 8 "	6	115
" 9 "	6	121
" 10 "	6	127
" 11 "	6	133
" 12 "	6	139
" 13 "	6	145
" 14 "	6	151
" 15 "	6	157

2. **Przeciętny ciężar** noworodka wynosi od 3200—3500 gr.

W pierwszych 4 dniach noworodek traci na ciężarze około $\frac{1}{14}$ — $\frac{1}{15}$ swego ciężaru (około 200 gr.). — Od 5 dnia przybiera tak, że w 8 dniu waży tyle, co w dniu pierwszym.


Od 9 dnia w odpowiednich warunkach przybiera według następującej tabeli:

Wiek dziecka	Dzienny przybytek wagi ciała	Miesięczny przybytek wagi ciała	CieŜar ciała
	Gramów	Gramów	Gramów
W 1 miesiącu	25—35	750	4000
" 2 "	23—32	700	4700
" 3 "	22—28	650	5350
" 4 "	20—22	600	5950
" 5 "	18	550	6500
" 6 "	17	500	7000
" 7 "	15	450	7450
" 8 "	13	400	7850
" 9 "	12	350	8200
" 10 "	10	300	8500
" 11 "	8	250	8750
" 1 roku . .	6	200	8950—9000
" 2 " . .	—	—	1100



Prawidłowe zębowanie.

Porządek, w jakim zęby wychodzą	Czas, w którym wychodzą
1 i 2 dolny ząb sieczny	6—9 miesiąc
1 i 2 górny ząb sieczny 3 i 4 górny ząb sieczny	9—12 miesiąc
1 i 2 ząb górny trzonowy 3 i 4 ząb dolny trzonowy 1 i 2 ząb dolny trzonowy	12—15 miesiąc
1 i 2 górny kieł 1 i 2 dolny kieł	18—24 miesiąc
3 i 4 górny ząb trzonowy 3 i 4 dolny ząb trzonowy	30—36 miesiąc



Dawki przeciętne dla dzieci (pro dosi).

L e k i	Do 1 roku	od 1—5 lat	od 5—10 lat
Acetanilidum	0·02	0·05	0·1
Acetum Digitalis	—	5 gtt.	10 gtt.
Acetum Scillae	—	5 gtt.	15 gtt.
Acidum benzoicum	—	0·03	0·05
Acidum hydrobromicum	—	—	30 gtt.
Acidum tannicum	—	0·005	0·01
Aether	—	3 gtt.	5 gtt.
Aether aceticus	2 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Alumen	0·01	0·05	0·1
Ammonium bromatum	0·15	0·25	0·3
Ammonium chloratum ferratum	—	0·03	0·05
Antipyrinum	0·2	0·3	0·5
Apomorphinum hydrochlor. emet.	0·0007	0·0025	0·0045
expect.	0·0004	0·0015	0·0025
Aqua Amygdalarum amararum	—	1—5 gtt.	5—10 gtt.
Argentum nitricum	0·001	0·003	0·005
Atropinum sulphuricum	—	0·0001	0·0002
Bismutum subnitricum	0·05	0·1	0·3
Bromoformium	2·3 gtt.	3·4 gtt.	4·6 gtt.
Camphora trita	0·0075	0·01	0·02
Chininum ferro-citricum	—	0·05	0·1
Chininum hydrochlor. antipir.	0·1	0·3	0·5
antispasm.	0·05	0·15	0·2
Chloralum hydratum	0·1	0·25	0·45
Codeinum phosphoricum	0·0002	0·002	0·005
Coffeinum	—	0·02	0·04
Coniinum hydrobromicum	0·0005	—	—
Cuprum sulphuricum	—	0·1	0·15
Curare	0·0001	—	—
Extractum Belladonnae	—	0·001	0·003
Extractum Filicis	1·0	2·0	5·0
Extractum Opii	—	0·005	0·02
Extractum Secalis cornuti	—	0·03	0·05
Extractum Strychni	—	0·002	0·005
Ferrum reductum	—	0·005	0·01
Flores Koso	—	2·0	5·0
Folia Digitalis	—	0·02	0·03
Hydrargyrum bichloratum	0·0001	0·0002	0·0003
Hydrargyr. chloratum antisyf.	0·002	0·005	0·01
laxans	0·01	0·02	0·03

L e k i	Do 1 roku	od 1—5 lat	do 5—10 lat
Hydrargyrum tannicum oxydulat.	0·005	0·02	0·03
Hydrochinon	0·05	0·2	0·3
Kalium bromatum	0·1	0·3	0·5
Kalium chloricum } pro die . . .	1·0	2·0	3·0
Kalium jodatun }	0·1	0·5	1·0
Kreosotum	0·005	0·01	0·02
Liquor Ferri sesquichlorati pro die	0·3	0·5	0·5
Liquor Kalii arsenicosi	—	0·05	0·1
Morphinum hydrochloricum	—	0·001	0·003
Naphtalinum	0·05	0·2	0·2
Natrium paracresotinicum	—	0·25	0·5
Natrium salicylicum pro die	1·0	2·0	3·0
Phenacetinum antipyr.	—	0·1	0·3
antispasm.	0·001	0·05	0·1
Pilocarpinum hydrochloricum (inj.)	0·001	0·002	0·004
Plumbum aceticum	0·003	0·005	0·01
Phosphorus	—	0·0001	0·0002
Podophyllum	—	0·005	0·015
Pulvis Ipecacuanhae opiatu	—	0·005	0·02
Radix Ipecacuanhae emetic.	0·05	0·1	0·2
Resorcinum	0·2	0·4	0·5
Santoninum	—	0·01	0·02
Sirupus Ferri jodati	1 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Strychninum nitricum (inj.)	—	0·0005	0·001
Tartarus stibiatus	—	0·0075	0·01
Thallinum sulphuricum	0·01	0·02	0·03
Tinctura Opii simplex	0·025	0·05	0·2
Tinctura Strophanthi	—	—	3 gtt.
Urethanum	0·05	0·1	0·2

Porównanie dawki leków

według rozmaitego wieku chorych.

Dawki zmieniają się mniej więcej, jak następuje:

aż do ukończonego	1	roku	$\frac{1}{10}$
od 2 do 4	"	"	$\frac{1}{8}$
" 5 " 7	"	"	$\frac{1}{5}$
" 8 " 10	"	"	$\frac{1}{4}$
" 11 " 14	"	"	$\frac{1}{2}$

Począwszy od roku 50 należy dawki znowu zmniejszać tak, iż u starców między rokiem 60 a 70 należy znów dawać tylko $\frac{1}{3}$ dawki dla osób dorosłych.

Kobietom zadają się wogóle mniejsze dawki, mniej więcej $\frac{2}{3}$ tej, jaką się przepisuje mężczyznom odpowiedniego wieku.

IV. CHOROBY OCZU.

Conjunctivitis catarrhalis.

W przypadkach ostrych i silniejszego stopnia chronicznych, ze znaczniejszem rozpulchnieniem spojówki i wydzieliną obfitą, lapisowanie 1% rozczyne nitr. arg. Obecność następowego wrzodu rogówki (*ulcus corn. catarrh.*) nie zmienia tego leczenia, a nakazuje prócz tego zapuszczać atropinę dla zapobieżenia następowej iritis. Opaska, jak w ogóle w zapaleniach spojówki przeciwskazana.

W przypadkach chronicznych, lżejszych o wydzielinie skąpej zapuszczenie 2—3 razy dziennie jednej z następujących wód ocznych:

674. *Acidi borici* 1·50,
Aqu. dest. fer. 50·00,
Zinci sulfur. 0·25.
MDS. Woda do ocz.

675. *Collyr. adstr. lat.* 30·00,
Aqu. dest. 20·00,
Detr. ad vitr. nigr.
DS. Woda do ocz. *)

676. *Plumbi acet. perf. neutr.*
0·50—1·00,

Aqu. dest. 100·00.

Solv. filtra.

DS. Woda do ocz.

Octan ołowiu jest przeciwskazany wobec wrzodów lub złuszczeń przybłonka rogówki, powstałyby bowiem nieuleczalne białe zaćmienia z inkrustacyj ołowiem. Używając jakichkolwiek wód ocznych, należy unikać zapuszczania późnym wieczorem.

Wskazanie przyczynowe nakazuje wystrzegać się wszelkich zewnętrznych szkodliwości, jak: kurz, dym itp., nadto w przypadkach chronicznych zwrócić uwagę, czy katar spojówki nie ma lokalnej przyczyny w innych cierpieniach, jak blepharadenitis, blennorrhoe sacci lacr., ectropium, distichiasis, u starszych wreszcie złogi wapniste w gruczołach Meiboma. Wówczas obok zwykłego, wskazane leczenie przyczynowe.

Conjunctivitis crouposa.

Jestto tylko silniejszy katar oczny z wypociną krzepnącą w postaci szarej błonki włóknikowej na powierzchni spojówki. Wydarza się wyjątkownie niemal u dzieci.

*) Jakkolwiek *Collyr. adstr. lut.* wedle ostatniej farmakopei austr. o połowę jest słabsze niż dawniej, przecie dzięki różnorodnym swym częściom składowym (*Zinc. sulf., ammon. chlor., camphora, spir. vin., crocus*) bez rozcieńczenia zanadto jeszcze silne sprawia pieczenie.

W okresie tworzenia się błonek unikać kauteryzowania, a polecić tylko zapuszczanie co 2—3 godz. roztworu sublimatu 1:5000 lub 3‰ kwasu borowego obok okładów lodowych (3—6 razy dziennie po 1 godz.). Gdy po kilku dniach błonki się odziera, leczyć jak zwykły katar ostry.

677. *Acidi borici* 3'00,
Aqu. dest. 100'00.

DS. Woda do ocz.

678. *Sublim. corros.* 0'02,
Aqu. dest. 100'00.

DS. Woda do ocz.

Conj. blennorrhöica adultorum.

Śluzoropótok ostry jest zawsze następstwem zakażenia spojówki jadem trypra (2—4 dni po infekcyi). W obrazie choroby góruje 1) silny obrzęk powiek zwłaszcza górnej, 2) poduszkowate obrzmienie spojówki gałki (chemosis), 3) znaczne rozpułchnienie i jednostajne ciemno czerwone przekrwienie spojówki, przez co zacierają się kontury gruczołów Meiboma, 4) obfita wydzielina, która w pierwszych 2—3 dniach bywa brudno krwawa, łatwo krzepnąca, do opłuczyn mięsnych podobną, później zmienia się ropną. Wydzielina ropna w odróżnieniu od kataralnej nie uклада się w nitki, ale miesza się jednostajnie ze łzami. W wątpliwych przypadkach rozstrzyga obecność rzeżączki części rodnych lub wykazanie gonokoków w wydzielinie spojówkowej.

Rokowanie zawsze wątpliwe, grozi bowiem zropienie rogówki przebiegające pod formą wrzodu lub abscesu. Rzadszą i mniej niebezpieczną komplikacją jest łuszcza, wydarzająca się jednak w późniejszych dopiero okresach.

Leczenie: Przedewszystkiem uchronić drugie oko od infekcyi suchym opatrunkiem (na oko zwitek waty, który pokrywa się owalnym płatkim borlintu, od biedy zwykłego płótna lub ceiatki, brzegi przytwierdzić do skóry kolodyonem, na to założyć zwykły monoculus). Opatrunek ten zmieniać należy co dzień tak długo, dopóki przez leczenie nie usuniemy wydzieliny ropnej z oka chorego.

W okresie I (wydzielina surowicza) wskazane przepłukiwanie co 1/2 godz. worka spoj. sublim. 1:5000 tudzież okłady lodowe stosowane przez dzień i noc, a zmieniane co parę minut. Wobec gwałtownych bólów 6—8 pijawek na skroni.

Z chwilą, gdy wydzielina przybiera charakter ropny (II lub III dzień choroby) przystąpić do energicznego kauteryzowania 2‰ 3‰ roztworem nitr. argenti. Lapisować wystarcza 1 raz dziennie — w cięższych przypadkach, gdy strup po lapisie się oddzielił, nawet 2 razy dnia. Gdy nastąpił wrzód lub absces rog. zrazu (obok lapisowania) atropinę, gdyby jednak wrzód głęboki groził przebicciem 1/2‰ eserynę lub 2‰ pilocarpinę.

Przy odwijaniu powiek zachować jak największą ostrożność, unikać ugnięcenia oka lub dotykania rogówki. Gdyby delikatne odwinięcie powiek wobec wrzodu rogówki było niemożliwe, ułatwi to i na przebieg wrzodu korzystnie wpłynie rozcięcie zewnętrznego kącika powiek (kantoplastyka prowizoryczna).

W przypadkach lekkich, lapisowanie usuwa doszczętnie chorobę, w cięższych, pozostaje przerost spojówki znany pod nazwą: *conjunctivitis, blennorrhoea chronica*, przypominającą *trachoma papillare*. Wówczas przejść należy do tuszowania siarkanem miedzi.

679. *Arg. nitr. crist.* 2·00—3·00,

Aqu. dest. 100·00.

Dct. in vitro nigro.

DS. Lapis.

Blennorrhoe neonatorum.

Śluzoropotok noworodków różni się od takiejże choroby dorosłych tylko lżejszym stopniem objawów zapalnych i łagodniejszym przebiegiem. Czas występowania 2—5 dni po urodzeniu się. Charakterystycznym jest tylko brak okresu wydzieliny surowiczej. Wydzielina jawi się tu od razu w formie ropnej, do gęstej śmietany podobna. Leczenie jak u dorosłych.

Dla zapobieżenia chorobie w każdym przypadku fluor albus u rodzących antyseptyczne przestrzykiwania pochwy, u noworodków zaś wnet po przyjściu na świat zapuszczenie do oczu kropli 1—2% lapisu.

Conjunctivitis follicularis.

Cierpienie to przypominające I okres jaglicy da się jednak odróżnić na podstawie:

1) umiejscowienia na dolnej tylko spojówce, 2) dla regularnego ułożenia mieszków limf. w szeregach, 3) powierzchownego ułożenia i barwy różowawej.

Leczenie: pędzlowanie 2% Acet. plumb., po czem obficie wodą spłukiwać. W lżejszych przypadkach zapuszczanie 2—3 razy dnia 1/2% plumb. acet.

680. *Plumb. acet. neutr.* 2·00,

Aqu. dest. 100·00.

Filtra.

DS. Do pędzlowania.

Trachoma.

Leczenie: w formie ostrej, względnie rzadkiej (obrzęk powiek, chemosis, w rozpulchnionej spojówce powiek drobne głęboko ukryte ziarna jaglicowe) okłady lodowe, częste przepłukiwania roztworem sublimatu (1:5000) głównie jednak lapisowanie 1—2% roztworem. Po ustąpieniu objawów ostrych leczyć, jak formę chroniczną.

Leczenie jaglicy chronicznej zależy od każdorazowego okresu choroby. W każdym przypadku, gdy spojówka jest rozpulchniona a wydzielina obfita, należy rozpocząć od lapisowania. Z ustąpieniem zbytnej wydzieliny rozchodzi się o usunięcie zmian przerostowych (ziarna i przerosty brodaweczki). Środki do tego służące są następujące:

1) Systematyczne tuszowanie cum cupr. sulf. in subst. tak długo, aż spojówka nie stanie się gładką i bladą. Środek ten

jednak może być przeciwwskazany chwilowo, jeżeli wystąpi świeży infiltrat, wrzód lub ostra łuszcza wśród żywego nastrzykania rzęskowego. Wówczas wrócić do lapisu, aż do ustąpienia nastrzykania rzęskowego.

2) Gdzie przeważają ziarna jaglicowe a są powierzchowne, najkorzystniej zastosować wygniatanie bądź to przez uciskanie załamka chwyconego pomiędzy paznogiowe powierzchnie obu palców dużych, bądź też osobną „ad hoc“ pensetą Knappa. Po wygnieceniu, które czasem wypadnie powtórzyć, okłady lodowe, przestrzykiwanie sublimatem a po kilku dniach powrót do leczenia zwykłego (lapis względnie cuprum).

3) Nielicznie rozsiane a do wygniecenia zagłębokie lub zbyt młode ziarna jaglicowe, można pojedynczo wypalać galvano-cauterem Sattler-Niedena.

4) W przypadkach ciężkich opierających się leczeniu powyższymi środkami przy znacznym przeroście załamka, skraca znacznie przebieg wycięcie częściowe załamka wedle Heisratha. Metoda ta, jakkolwiek ma swoich przeciwników, wolną jest przy umiejętnem wykonaniu od wszelkich szkodliwych następstw.

W przypadkach lekkich lub na ukończeniu leczenia, można pędzlować cum plumb. acet. (cave przy wrzodach) lub zasypywać proszek tanninowy z kw. borowym w stosunku 1:3. Gdzie niemożliwem jest leczenie przez lekarza, wskazanem jest przynajmniej zapuszczanie roztworu cupr. sulf. lub tanniny.

681. *Cupr. sulf. 1'00,*
Glycerini puri 15—20'00.

DS. Krople do ocz.

(1—2 kropli raz dziennie).

Lub też gdzie wskazana ostrożność:

682. *Tannini puri 1'00,*
Glycerini puri 8—15'00.

DS. Krople do ocz.

(1—2 kropli raz dziennie).

Dobrze jest zmieniać te środki, aby wykluczyć wpływ przyzwyczajenia. Komplikacje, jak łuszcza i wrzody nie wymagają zazwyczaj osobnego leczenia. Przyczyną przewlekania się komplikacji mogą być następstwa jaglicy, jak distichiasis, trichiasis, blepharophimosis, entropium. Stany te wymagają operacyi. Aż do chwili oper. należy baczną zwracać uwagę na rzęsy i często epilować wadliwie rosnące lub wkręcone.

Kerato conjunctivitis phlyctaenulosa.

Wspólną cechą wszystkich postaci tego cierpienia, występującego pod formą pryszczyków na spojówce, lub rogówce, łuszcзки, czy też miotełki naczyniowej, jest ich tło skrofaliczne.

Leczenie musi więc być nietylko lokalne ale i ogólne: posilna dyeta (pokarmy mięsne, jaja, mleko, zdrowe suche mieszkanie, w zimie zażywanie tranu, w lecie kąpiele słone (Rabka,

Iwoniecz, Rymanów). Lokalnie: zasypywanie calomelu przez czas dłuższy, nawet z parę tygodni po ustąpieniu cierpienia.

683. *Calomel. vap. p. alcoholis.*

subt. pulv. 5'00.

DS. Proszek do ocz.

Pędzelek.

Wobec znaczniejszej wydzieliny spojówkowej, lepiej zacząć leczenie od lapisu a później dopiero przejść do calomelu. Unikać calomelu przy równoczesnym podawaniu jodku potasu, wywołujące się bowiem przy tem połączenia jodu z rtęcią, działają silnie gryząco. W formie złośliwej (infiltrat głębszy, barwy szaro-żółtej) dążyć wpierw do oczyszczenia się nacieku za pomocą środków podanych w leczeniu wrzodów rogówkowych.

Energiczniej jeszcze niż calomel działa zmodyfikowana maść Pagenstechera.

684. *Mercur. praecip. flav.*

0'15—0'2,

Vaselini flavi 5'00.

Mfung. DS. Maść do oka.

Środek ten wprowadza się bądź grubszą sondą okul., bądź precikiem szklanym pod powiekę, po czem z lekka masuje się palcem przez powiekę. Maść ta nadaje się szczególnie w formach naczyniowych kerat. phlyct. Gdzieby postępowanie to nie wstrzymało progresyi miotelki naczyniowej, najlepiej przypalić galwanocauterem brzeg wrzodu znajdującego się na szczycie miotelki.

Conjunctivitis diphterithica.

Jestto najniebezpieczniejsza z chorób ocznych, u nas na szczęście rzadka, częstsza w północnych Niemczech.

Leczenie: pierwszém zadaniem odosobnienie chorego dziecka. W okresie infiltracyi (deskowato twardy obrzęk powiek, naciek brudno szary w spojówce, zdjąć się nie dający) leczenie przeciwzapalne i antyseptyczne, jak w conjunctivitis blenorrhoica: przestrzykiwanie pilne sublimatem i okłady lodowe, jednak mierne i bez przesady stosowane. Francuscy okuliści radzą nadto pomazywanie spojówki sokiem cytrynowym. W okresie ropienia i exfoliacyi błon dyft., lapisowanie 2% roztworem lub co lepiej cum lapide mitigato w miejscach już od błon wolnych. Stadyum zbliźnowacenia zmniejszają dolegliwości i środki osłonne, jak mleko i maść borowa.

Combustio conjunctivae cum calce.

Sparzenie wapnem przedstawia obraz podobny do dyfteryi spojówki. Charakterystycznym jest mleczno białe zazwyczaj nie wyjaśniające się zaćmienie rogówki, o ile ta sparzoną została. Pierwszym zadaniem lek. jest wydobyć starannie łyżeczką Daviela szczątki wapna, kryjące się w fałdach spojówki, przy czem unikać wszelkiego spłókiwania, prócz chyba roztworem

cukru trzcinowego, który zobojętnia wapno. Dla usunięcia bólów i objawów zapalnych okłady lodowe obok zapuszczania w pierwszych dniach 3—5% kokainy, w razie potrzeby z dodatkiem atropinu, na strupy zaś oparzelinowe zasypywanie jodoformu.

685. Cocaini mur. 0·3—0·5,

Aqu. dest. 10·00.

DS. Krople do ocz.

686. Jodoformi subtil. pulv.

5·00.

DS. Proszek do ocz.

W okresie zablizniania rozrywać końcem tępej sondy świeżo powstające zrosty, aby zapobiec symblepharon. W razie, gdyby takowe mimo to wystąpiło, operacya.

Keratitis parenchym. diffusa.

Obraz choroby na szczycie rozwoju może nasunąć nie wprawnym myśl łuszczki. Dla odróżnienia pamiętać należy, że naczynia nowo wytworzone w cierpieniu tem leżą w głębszych warstwach rog. stąd też przez zaćmienie rogówki wydają się brudno-czerwone podczas, gdy w łuszcze leżą powierzchnownie, rozgałęziają się widocznie, a barwy są żywo czerwonej.

Leczenie musi uwzględnić tło, a więc lues congen. Natrium lub kal. jodat. wewnątrznie, w kile nabytej wcięcia szaruchy. W okresie zapalnym (nastrzykanie rzęsek. i łzawienie) lokalnie poprzestać należy na zapuszczaniu atropinu dla zapobieżenia iritis. Z resztą posilne pożywienie, pobyt na świeżem powietrzu a tylko wobec ciężkiej komplikacji z Iridokykklitis lub Iridochoroiditis, ciemny pokój. Po ustąpieniu objawów zapalnych, przejść należy do środków wyjaśniających, jak calomel, maść Pagenstechera, tra. opii crocata lub Ol. terebintinae cum glicerini. āā do zapuszczania 1 raz dziennie. W szeregu środków tych Calomel jest najłagodniejszym, Ol. teribint. najsilniej drażniącym środkiem. Od Calomelu więc zacząć należy i zwolna do co raz silniejszych przechodzić.

687. Natr. jod. 5—8·00,

Aqu. dest. 200·00.

DS. Po 2 łyżki dziennie.

688. Ung. Ciner. 1·50—2·00.

D. t. d. Nr. 30.

DS. Po 2 pak. uż. do wcięcia.

689. Ol. terebint. rectific.

Glycerini āā.

DS. Jedną kroplę raz dziennie zapuszczać do oka.

Wrzody rogówki.

Zawdzięczają one swe powstanie infekcyi lokalnej na tle exkoryacyi rogówki. Dla tego to obok drobnych urazów rogówki (ciała obce, trichiasis, entropium, lagophthalmus, exophthalmus) najczęstszą przyczyną wrzodów rog. są zapalenia spojówki, gdzie wydzielina śluzowa lub śluzowo-ropna stanowi materiał zakaźny. Odróżniamy więc:

- 1) Wrzody kataralne charakteryzujące się swem położeniem obwodowem i kształtem półksiężycowym.
- 2) Wrzody na tle jaglicy.

- 3) Wrzody na tle śluzoropotoku.
- 4) Wrzody na tle dyfteryi.
- 5) Wrzody traumatyczne.

Zboczeniom stanu ogólnego zawdzięczają swoje powstanie wrzody po Keratitis phlyctenulosa tudzież po herpes corneae febrilis.

Leczenie: Zależy od etiologii. Wrzody następowe goją się pod wpływem leczenia choroby spojówki (Trachoma, conjunctivitis blennorrhoica, conjunctivitis catarrhalis). Obok tego dla zapobieżenia Iritis, należy utrzymać źrenicę w rozszerzeniu za pomocą atropinu. W leczeniu wrzodów pierwotnych rogówki zależy postępowanie od stadyum wrzodu. W okresie progresyi tj. wobec silniejszego nastrzykiwania rzęskowego, żółtawego zabarwienia dna i brzegów wrzodu, należy dążyć wpierrw do oczyszczenia nacieku. W przypadkach lżejszych osiągamy to przez zapuszczenie atropiny, zapraszanie jodoformu i opaskę. W przypadkach cięższych wskazane jest obok atropiny zapuszczanie sublimatu 1 na 5000 co 1— $\frac{1}{2}$ godz., ciepłe okłady z siemienia lnianego przez kilka godz. dziennie, na noc jodoform i opaska. Wobec wrzodów głębszych, gdzie grozi przebicie, lub zachodzi obawa zniszczenia przeważnej części rogówki, lepiej jest zastąpić zwłaszcza przy wrzodach obwodowych atropinę, pilocarpiną lub eseryną, środki te bowiem obniżając ucisk śród-oczny, poprawiają odporność rogówki. Dopokąd wrzód wybitnie ropny (np. *ulcus serpens corneae*) jest niezbyt rozległy, najlepszym środkiem wstrzymującym progresję jest przypalenie galvanocauterem. Przy większych jednak rozmiarach wrzodu lub abscesu rogówki wskazaną będzie keratotomia wedle Saemischea.

Doprowadziwszy leczeniem tem wrzód do oczyszczenia się (oko blade, dno wrzodu już zaledwie szare lub zupełnie czyste) przystąpić należy do przyspieszenia regeneracyi przez środki lekko drażniące a zarazem wyjaśniające, jak calomel i maść Pagenstechera.

Maculae corneae.

Łatwo je odróżnić od nacieków zapalnych uwzględniając: 1) brak nastrzykania rzęsk, 2) ostre odgraniczenie, 3) barwę białą lub niebieskawą, 4) gładką zwierciedłą powierzchnię.

Tylko świeże plamki można do pewnego stopnia wyjaśnić przez dłuższe stosowanie środków podanych przy Keratitis parenchym. diff. Plamy grubsze zasłaniające źrenicę dają wskazanie do iridectomii optycznej. W celu kosmetycznym można szpecące plamy uczynić mniej widocznymi przez tatuowanie.

Staphyloma corneae.

Garbiaki częściowe bez względu na stopień upośledzenia wzroku jaki wywołują, dają wskazanie do iridectomii, aby ocalić wzrok podupadający skutkiem podwyższenia ucisku śród-ocznego. W razie wrośnięcia źrenicy całkowitego w bliznę, można przy utrzymanym poczuciu światła (światło stoczka na

6 m. lokalizacja dobra) przez iridectomię nawet wzrok przywrócić.

Garbiaki całkowite o ile wywołują dolegliwości przez swe rozmiary, a utrzymane jest poczucie światła, mogą być usunięte drogą operacyjną (Wecker, Knapp). Wobec braku jednak poczucia światła zwłaszcza przy równoczesnym wyđęciu twardówki, wskazana jest enukleacja gałki ocznej.

Iritis, iridokylitis.

Prosta iritis zdradza się:

- 1) nastrzykaniem rzęskowem,
- 2) często zmętnieniem cieczy wodnej, czasem obecnością ropy w przedniej komórcie (iritis supur.).
- 3) Zmianą barwy tęczówki (porównaj z okiem II-em).
- 4) Zatarciem promienistego rysunku właściwego tęczówce.
- 5) Obecnością tylnych przyczepień łatwo uwidaczniających się po zapuszczeniu atropiny. Jestto najczęstszy objaw iritis.
- 6) W pewnych przypadkach szaremi osadami na tylnej ścianie rogówki (Iritis serosa).

Nie rzadko przychodzi zapalenie na ciałko rzęskowe co przynajmniej w ostrych przypadkach zdradza się silnym bólem przy dotykaniu okolicy ciała rzęskowego (Iridokylitis).

Leczenie. Ponieważ iritis, pomijając wrzody i zapalenia rogówki, jest zawsze niemal następstwem chorób ogólnych (syphilis w około 70% przypadków, rheumatismus, diabetes melitus, tuberculosis, gonorrhoe) więc przedewszystkiem leczenie ogólne zależenie od etiologii a więc: wcierania ung. ciner. kalium jod. interne natr. salicył. i t. d. W przypadkach ostrych ciemny pokój, w lżejszych okulary dymne.

Lokalnie: zapuszczanie atropiny tak często, aby źrenicę do maximum rozszerzyć, w pierwszych dniach zatem co 2 do 3 godz., później rzadziej. Przy większej ilości tylnych przyczepień zapuszczanie atropiny z cocaineą. Jeżeli źrenica opiera się rozszerzeniu, 6—7 pijawek na skroń. Z powodu bólów tudzież dla pobudzenia szybszej resorbeyi, ciepłe okłady (zimne przeciwwskazane z wyjątkiem świeżej iritis traumatica). Wobec idiosynkrazyi do atropiny zapuszczanie duboizyny, jak powyżej.

690. *Atropini sulf.* 0.05,

Aqu. dest. 5.00.

DS. Krople do oka.

691. *Atropini sulf.* 0.05,

Cocaini mur. 0.15,

Aqu. dest. 5.00.

DS. Krople do ocz.

692. *Duboisini sulfur.* 0.025,

Aqu. dest. 5.00.

DS. Krople do ocz.

Ophthalmia sympathica.

Przyczyną choroby jest iridokylitis traumatica oka 2-go po urazie przebijającym gałkę. Choroba w najlżejszym swym stopniu objawia się łzawieniem i łatwym nużeniem się oka (Iritatio symp.). Właściwe zapalenie symp. przebiega najczęściej pod formą ciężkiej iridokylitis plast., rzadziej neuritis opt.

Leczenie: Enukleacja oka pierwszego, zresztą postępowanie, jak w ogóle przy iridokykklitis: Kali jodat. wewnątrznie, w cięższych przypadkach wcięcia szaruchy.

Następstwa w postaci secclasio i oclasio pupillae, dają wskazanie do iridectomii, ale dopiero po zupełnem uspokojeniu się oka.

Iridochoorioiditis suppur. Panophthalmitis.

Oba cierpienia te dla oka bezwzględnie zgubne, kończą się z reguły zanikiem gałki ocznej. Pierwsze charakteryzuje się obrzmieniem powiek wysokiego stopnia, obecnością chemosis, hypopion, tudzież reflexem żółtawym z głębi oka. Gdy choroba wzmogła się do panophthalmitis, do powyższych objawów przyląca się wysadzenie gałki ku przodowi, nie rzadko także gorączka. Przyczyną bywa infekcja ropna, bądź to po urazie przebijającym gałkę, bądź też metastaza na tle pyemii, endocarditis ulcerosa, meningitis cerebrosppin.

Leczenie: Ze względu na złe rokowanie, rozchodzi się tylko o złagodzenie bólów i skrócenie choroby. Polecie więc należy ciepłe okłady, na noc iniekcję morfiny; wobec rozwiniętej panophthalmitis, gdy zbliża się czas przebicia ropy, incizya w twardówce w okolicy równika cięciem równoległym do brzegu rogówki. Enukleacja przeciwskazana z powodu niebezpieczeństwa meningitis.

Ciała obce i zranienia oka.

Drobne a lekkie ciała obce, znajdziemy zazwyczaj pod powieką górną lub dolną tuż po nad, względnie po pod wolnym brzegiem powieki. Ukryte w załamku górnym, co bywa rzadziej łatwo wykazać i wydobyć lyżeczką Daviela. Odpryski metaliczne, (zendra, opiłki żelazne) jeśli drobne, wbijają się powierzchownie tylko w rogówkę, skąd je, po poprzednim znieczuleniu rogówki kokainą (5%) dokładnie wydobyć należy igiełką dyscysyjną lub t. z. dłutkiem rogówkowym. Ciała obce, tkwiące w komórcie przedniej, wymagają już delikatniejszego zabiegu operacyjnego. Ciała obce, które przebiwszy twardówkę lub rogówkę, dostały się wgłęb oka, sprowadzają z reguły utratę oka, bądźto za pośrednictwem chronicznej iridokykklitis plastica, bądź też panophthalmitis. Ważniejszym jest niebezpieczeństwo sympatycznego zapalenia oka 2-go, dla tego w przypadkach podobnych wskazana jest enukleacja. Tylko tam, gdzie ciałem obcym jest stal lub żelazo, można w świeżych przypadkach uniknąć enukleacyi, przez wydobyte elektromagnesem.

Wobec każdego cięższego zranienia oka, pierwszym zadaniem jest skrupulatna czystość i założenie antyseptycznego opatrunku. Specjalista oceni, jaki zabieg, a względnie leczenie, będzie w dalszym ciągu wskazane.

Katarakta.

W rozwoju zaćmy odróżnić należy 4 okresy: 1) Catarakta incip. dająca się wykazać oświetleniem ogniskowem lub wzier-

nikiem, gdzie wzrok jeszcze jakiś utrzymany. 2) Cat. intumescens, gdzie utrzymane już tylko poczucie światła, kom. przedn. płytka, soczewka niebieskawo szaro zaćmiona, okazuje połysk perłowej maciey i rysunek klinów. 3) Cat. matura, gdzie soczewka już dokładnie zaćmiona, barwa szara lub żółtawo szara, komórka zaś wróciła do dawnej głębokości. 4) Cat. hypermatura: kom. przed. głębsza, z poza zeszczipiałej kory przegląda żółtawe jądro, nie rzadko dołącza się zaćmienie torebki.

U dzieci nie należy wyczekiwać dojrzałości, ale operować (Discissio) już w pierwszych latach życia, aby uniknąć otrętwienia siatkówki (amblyopia ex anopsia) u dorosłych wskazaną operacya (extraquea) dopiero w okresie dojrzałości. W warunkiem odzyskania wzroku po operacyi jest zdolność rozpoznawania światła stoczka na 6 m. i lokalizacya dobra.

Glaucoma.

Niebezpieczna ta choroba nakłada na lekarza obowiązek wczesnego rozpoznania, aby nie zaniedbać odpowiedniej chwili do operacyi. W samym początku (okres zwiastunów) występują przelotne zamglenia wzroku, widzenia kół barwnych do koła światła, wreszcie mniej lub więcej wyraźne bóle w czole i głowie. Przedmiotowo w chwili napadu można już stwierdzić pewne objawy jaskry, które jednak po pewnym czasie ustępują. Gdy iskra przechodzi w okres 2-gi (Glanc. evolutum) nie ma już przerw pomiędzy pojedynczymi napadami — oko stale okazuje wybitne zmiany:

- 1) Przekrwienie przednich żył rzęskowych.
- 2) Zamglenie rogówki, rozlane głównie w środku o powierzchni jakby pokłutej.
- 3) Komórka przednia płytka.
- 4) Tęczówka łupkowo szara.
- 5) Żrenica szeroka, często owalna, na bodźce nie oddziałująca.
- 6) Jako przyczyna wszystkich tych objawów, a zarazem jako najgłówniejszy objaw przedmiotowy — podniesienie ucisku śródocznego.

Zwolna wśród chwilowych remisji i zaostrzeń, wzrok co raz niżej podupada, wreszcie poczucie światła ginie (Glanc. absolutum). Przebieg bywa ostry lub chroniczny. W pierwszym przypadku do opisanych objawów przyłącza się silniejsze nastrzykanie rzęskowe czasem chemosis, podmiotowo zaś gwałtowne bóle w okolicy oka i w głowie.

Jaskra prosta przebiega tylko z lekkim stwardnieniem oka bez objawów zapalnych, bez bólów, wziernik zaś wykazuje exkawacyę tarczy dobrzeżną.

Leczenie: Środkiem radykalnym jest wczesne wykonanie iridektomii obwodowej i szerokiej. Mniej pewną jest sclerotomya. Aż do chwili operacyi wskazane są środki obniżające ucisk śródoczny jak, zapuszczanie $\frac{1}{2}\%$ eseryny lub 2% poliearpiny, które w miarę ciężkości przypadku zapuszczać należy co 3 do 2 godzin dziennie. Działanie ich jest bardzo korzystne, jednak tylko przemijające. Nadto nie działają one tam, gdzie żrenica np. z powodu atrofii tęczówki nie zwęża się.

693. *Eserini salicyl.* 0·025,*Aqu. dest.* 5·00.

DS. Krople do ocz.

694. *Pilocarpini mur.* 0·1,*Aqu. dest.* 5·00.

DS. Woda do ocz.

Hordeolum.

W razie, gdy już widnieje czop ropny — nacięcie. U osób bojaźliwych ciepłe okłady. Przy habitualnej skłonności do jęczmieni, dłuższe używanie maści z praecipitatu białego lub żółtego.

695. *Hydrarg. praec. albi*

0·15—0·2,

Vaselini flavi 5·00.

DS. Maść na powieki.

Lub też:

696. *Mercuri praecip. flav.* 0·15

—0·2,

Vaselini flav. 5·00.

MDS. Maść na powieki (do smarowania przed ułożeniem się do snu, w wielkości ziarna grochu między rzęsy).

Blepharadenitis.

W formie łuskowej i strupkowej maść z praecipitatu białego lub żółtego, pilne usuwanie strupów, zmywanie brzegów powiek wacikiem zmoczonym w wodzie kolońskiej. W formie wrzodziejacej, przypalanie cum lapide mitigato. Uwzględnić nadto przyczynę (scrophulosis, blenorrhoë sacci lacr.).

Chalazion.

Od jęczmienia różni się brakiem objawów zapalnych, tudzież punktem wyjścia z chrząstki powiekowej (Gruzoły Meiboma). Usunięcie za pomocą nacięcia od strony spojówki powiekowej cięciem równoległym do przebiegu gruczołów Meibora po czem galaretowatą treść wygnieść, a torebkę wyskrobać należy.

Blennorrhoe sacci lacrym.

Objawy: łzawienie, tudzież śluz ropiasty za uciskiem okolicy woreczka łzowego, wydobywający się z punktów łzowych. Od czasu do czasu przyłącza się ostre ropne zapalenie woreczka łzowego (dacryocystitis) z ogólnymi objawami abscesu, charakteryzującego się tem, że odpowiada położeniem woreczkowi łzowemu, a nie przekracza ku górze lig. canthi int. Dacryocystitis nie leczona przebiega na zewnątrz, a rezultatem jest przetoka woreczka łzowego.

Leczenie: W blennorrhoe sacci lacr., tudzież wobec przetoki niezbędnem jest systematyczne sondowanie przewodu noso-łzowego sposobem Bowmana. Rozpocząć należy od Nr 2-go a skończyć na Nr 4-tym. Po każdorazowym wyjęciu sondy (son-

da leży $\frac{1}{2}$ godziny) przestrzykać należy przewód noso-łzowy przez kanalik łzowy, za pomocą szpryki Aneta lub dobranego zakraplacza sublimatem 1 na 5000. Gdy przy leczeniu tém już żadnej wydzieliny z wor. łzow. wycisnąć nie można, sondować jeszcze w rzadszych odstępach czasu dla zapobieżenia recydywie.

Przetoki granulujące, goją się pod wpływem tego leczenia same, przetoki zaś o ścianach zabliźnionych wymagają nadto operacyi. Przypadki zbyt zadawnione z zarosnięciem przewodu noso-łzowego lub ze znacznem wydęciem wor. łzow. dają wskazania do extyrpacyi woreczka łzowego.

Dacryocystitis.

Gdy nie trwa nad 24 godz. można często wyleczyć poronnie, przez wywarcie ucisku zapomocą waleczka waty na woreczek łzowy i założenie staranne opaski uciskowej. Gdy jednak jest fluktuacya, należy przeciąć cięciem prostopadłym do skóry, tuż po pod lig. canthi int. Następnie zaś traktować, jak zwykły absces, a więc dla zapobieżenia sklejenia się brzegów rany wprowadzenie paska gazy jodoform. do woreczka tak długo, dopokąd wydzielina nie straci charakter ropny i obrzmienie zapalne nie ustąpi, po czem przejść należy do sondowania.

Doc. Dr Franciszek Sroczyński.

V. CHOROBY SKÓRNE.

Acne vulgaris.

Starać się usunąć przyczynę choroby, jaką bywają przewlekłe nieżyty żołądka i kiszek, u kobiet zboczenia w narządzie rodny (anti-retroflex. uteri etc.)

Miejscowo: nacięcie ropni gruczołowych, wyciskanie zaskórniaków (chwilowy odczyn w postaci obrzęku i zaczerwienienia skóry przemija wkrótce przy okładach Liquor Burovii). Kiedy usunięte zostały zropiałe gruczoły, polecić zmywanie wieczorem miejsc zajętych c. Saponaphtolosulfuricum, następnie wcieranie na noc.

697. *Sulfur. citrini* 10·00,
Spirit. sapon. Kal. 20·00,
Spirit. lavandulae 60·00,
Balsami peruviani 1·50,
Spirit. camphor. 1·00.
Olei bergamottae gtt. V.
S. Zewnętrznie.

lub

698. *Lactis sulfuris* 10·00,
Spirit. vini gallici 50·00,
Spirit. lavandulae 10·00,
Glycerini 10·00.
S. Zewnętrznie.

Z rana po usunięciu pasty, środki osłaniające, puder.

699. *Zinci oxydati* 10·00,
Ungu. emoll. 50·00.
Olei rosarum gtt. V.

cienko nasmarować, następnie puder. Polecają rano zmyć

700. *Acidi salicyl.* 0·30,
Sulfuris praecip. 0·70,
Zinci oxydati 0·30,
Vaselini 30·00,
Olei amygd. dulcium 10·00.

Na noc wetrzeć maść.

701. *Naphtol* 0·30,
Camphorae 0·30,
Resorcini
Saponis virid. āā. 0·50,
Sulfuris praecip.
Cretae albae āā. 0·20,
Vaselini 30·00.

S. Maść.

Acne rosacea.

Uwzględnić przyczynę cierpienia: zбочenia w narządzie rodny u kobiet, blednica nadużywanie napoi wyskokowych. W okresie początkowym (zaczerwienienie skóry, rozszerzenie naczyń) polecić na noc przykładanie Empl. hydrargyri; naczynia porozszerzane doprowadzić do obliteracyi przez skaryfikacye. — W okresie późniejszym, kiedy nastąpi przerost tkanki łącznej w postaci guzków, nierówności (Rhinophyma) usunięcie ich łyżeczką ostrą, termokauterem.

Alopecia areata.

Leczenie zwykle nie wywiera znacznego wpływu na skrócenie i przebieg cierpienia. Polecają wyrwać włosy w obwodzie ognisk chorobowo zajętych, wcierania środków drażniących i przeciwgrzybkowych.

702. *Spiritus vini* 20·00,
Tinct. aconiti 2·00.
 S. Zewnętrznie.

703. *Tinct. jodi* 15·00,
 „ *capsici* 5·00.

Lewin i Leistikoff polecają wcierania codziennie:

704. *Chrysarobini* 2·00,
Vaselini 20·00.

Alopecia e seborrhoea.

(Seborrhoea capitis). Celem usunięcia strupów czapkę z opasek lub płótna, którą należy napuścić oliwą. Po odpadnięciu i usunięciu za pomocą zmycia strupów.

705. *Spir. vini* 200·00,
Tntr. capsici 10·00,
Acidi thymolici 50·00.

S. Zewnętrznie.

Tym płynem zmywa pacjent głowę codziennie, dwa razy w tygodniu zamiast powyższym płynem zmywa głowę mydłem i wodą. Po każdorazowym zmyciu głowy maść.

706. *Acidi salicyl* 10·00,
Florum sulfuris 10·00,
Vaselini 100·00.

S. Maść

lub

707. *Resorcini*
Acidi salicyl āā. 10·00,
Ungu emoll. 100·00.

S. Maść.

Przy tem leczeniu trwa choroba mniej więcej do 3 miesięcy. Zwrócić uwagę pacjenta, że w ciągu leczenia włosy będą wypadać więcej nawet, niż przed leczeniem. Włosów, zwłaszcza u kobiet nie potrzeba strzyżć na krótko.

Alopecia syphilitica.

Obok leczenia ogólnego, miejscowe. Besnier poleca rano natrzeć głowę:

708. *Acidi salicyl.* 1·00,
Sulfuris praecip. 50·00,
Lanolini
Vaselini āā. 10·00.

S. Maść.

wieczorem po zmyciu mydłem i obsuszeniu natrzeć:

- 709.** *Alcoholi Rosmarini* 100·00,
Tincturae Canth. 10·00.
S. Zewnętrznie.

Eczema acutum.

Jeżeli można wyszukać przyczynę wyprysku, starać się ją usunąć (pasożyty skórne, pot, żylaki, drażnienie skóry środkami żrącymi i t. d.). Zabronić zmywania miejsc chorych wodą. Polecieć obmywanie (eczema papulosum).

- 710.** *Acidi salicyl* 1·00,
Spir. vin. gall. 100·00.

następnie zapudrowanie

- 711.** *Amyli tritici*
Zinci oxydati āā.

co pacjent robi kilka razy dnia.

Jeżeli skóra w obrębie wyprysku obrzękła, zaczerwieniona, okłady:

- 712.** *Liquor Burorii* 10—25·00,
Aqu. dest. 200·00.

które zmieniać należy co 2—3 godziny.

Tesame okłady stosować przy

Eczema madidans.

lub zastąpić je maściami.

- 713.** *Zinci oxydati*
Amyli tritici āā. 10·00,
Vasellini 40·00.

- 714.** *Acidi borici* 5—10·00,
Vasellini 100·00.

- 715.** *Dermatol* 10·00,
Lanolini 20·00,
Vasellini 70·00.
S. Maść.

- 716.** *Dermatol*
Zinci oxyd. albi āā. 2·00,
Vasellini fl. 20·00.
S. Maść.

- 717.** *Dermatol* 2·00,
Zinci oxyd. albi
Amyli āā. 24·00,
Vasellini fl. 50.
S. Maść.

- 718.** *Tumenol* 5·00,
Flor. Zinci
Bismuti subnitr. āā. 2·50,
Unguenti lenit.
Unguent. simpl. āā. 25·00.
S. Maść.

W okresie eczema crustosum usunąć strupy za pomocą oliwy, wazeliny i t. d. Po odpadnięciu strupów, przykładanie maści dwa razy dziennie.

- 719.** *Ung. Diachyli Hebrae.*

lub

- 720.** *Emplastri Diachyli simpl.*
Vasellini āā. 50·00.
S. Maść.

W okresie końcowym (stadium squamosum) ograniczyć się do smarowania miejsc zajętych obojętnymi tłuszczami 2—3 razy na dzień i pudru. Jako tłuszczu użyć można: Ungu. emoll. Vaselinum, Glicerynę. W okresie tym można również użyć dziegciu (*Oleum rusci*), jednak uważać trzeba, by nie było nigdzie miejsc sączących, po nasmarowaniu dziegciem, zaopatrzyć jakąś obojętną maścią.

Eczema chronicum.

Wskazania:

- 1) Usunięcie strupów i warstwy zgrubiałego przyskórka.
- 2) Usunięcie przekrwienia.

W tym celu polecamy ungu. diachylon Hebrae, unguent. emolliens przykładane na kawałkach płótna, które należy dokładnie przymocować za pomocą opasek; dalej empl. saponato-salicylicum 10—20%. Kiedy strupy i zgrubiały przyskórek roz-

miękną, usunąć je przez zmycie spirytusem mydlanym, inydlęm szarem i t. d.

W celu usunięcia przekrwienia:

721. *Olei rusci* 20·00,
Spirit. sapon. kalin. 50·00,
Glycerini 10·00.

S. Zewnętrznie.

722. *Olei fagi* 10·00,
Glycerini 5·00,
Unguenti emoll. 50·00,
Balsami peruv. 2·50.

S. Zewnętrznie.

równie dobrze można polecić
Tinctura rusci.

Eczema capillitii.

Strupy rozmiękczyć przez smarowanie głowy tranem, oliwą; rozmięczone usunąć przez codzienne umywanie głowy c. spirit. sapon. Kalinus. Kiedy wyprysk przejdzie w stadium squamosum *tinctura rusci*, *ungu. praecipit. albi* 1:10.

Eczema seborrhoicum.

Najczęstszą jego siedzibą jest skóra czaszki, przechodzi jednak na części sasiednie jak: kark, szyję, twarz. Miejsca zajęte polecić zmywać mydłem np. *sapo resorcino-sulfuricum* lub *resorcino-salicylicum* (Eichhoffa), następnie zaopatrzenie maścią:

723. *Resorcini* 1·00,
Ungu. emoll. 50·00.

Eczema impetiginosum faciei.

Usunąć strupy; kiedy sączenie ustąpi, maść Wilsona.

724. *Benzoes pulverisati* 5·00,
Axungiae porci 160·00,
digere, cola adde
Zinci oxydati 25·00.
Mf. ung. S. Maść.

Erythema exsudativum multiforme. — Erythema nodosum.

Przeciw swędzeniu i pieczeniu zmywania:

725. *Acidi salicylici* 2·00,
Spir. vini gallici 100·00.

S. Zewnętrznie.

następnie puder. Wewnętrznie *Natrium salicylic.* 3·00—5·00 pro die. W razie towarzyszącej gorączki pacjent powinien zostać w łóżku; polecić dyetę, antifebrilia.

Favus.

Po usunięciu strupów za pomocą oliwy i zmyciu mydłem epilacye włosów; następnie wcieranie środków, które mają niszczyć grzybki. Epilacye muszą być powtórzone tak długo, jak długo znajdują się włosy chorobowo zajęte (trwa to zwykle miesiące). Do wcierania, które winno być robione codziennie, polecić:

726. *Naphtol* 10·00,
Vasellini 100·00.

S. Maść.

727. *Lactis sulfuris* 5·00,
Olei rusci
Spir. lavand. āā. 50·00.

S. Zewnętrznie.

Herpes tonsurans capillitii.

Włosy obstrzyż krótko. W obojętne i w otoczeniu miejsc zajętych chorobą, pilne usuwanie włosów przez epilacye, następnie wcieranie środków, celem zniszczenia grzybka w torebkach włosowych (maść: *naphtol.* 10%, *chrysarobinowa* 5%).

Herpes tonsurans maculosus (Pityriasis rosea Gibert).

Według Hebry:

Przez 6 dni 2 r. dziennie nacieranie i zmywanie powierzchni

ciała mydłem szarem, przez następne 6 dni pozostawić warstwę mydła z poprzednich zmywań, 12-go dnia kąpiel.

Kaposi poleca 2—3-krotne nasmarowanie.

728. *Resorcini*

Ichtyoli āā. 10·00,

Vaselini 100·00.

następnie kąpiel.

Hyperidrosis.

Ogranicza się najczęściej do dłoni, stóp i pach. U dziewcząt czystą przyczyną bywa blednica, którą należy w leczeniu uwzględnić.

Miejscowo polecić zmywania.

729. *Tannini* 1·00,

Spir. vini gallici 250·00.

S. Zewnętrznie.

730. *Decoct. cort. Quercus*

e 20·00 ad 500·00.

Kaposi poleca zmywanie rano i wieczór.

731. *Naphtol* 5·00,

Glycerini 10·00,

Alcoholi 100·00.

następnie puder.

732. *Naphtoli pulverisati* 2·00,

Amyli 180·00.

lub

733. *Talci subtil. pulv.* 40·00,

Bismuthi subnitrici 45·00,

Kali hyperm. 3·00,

Natri salicylici 2·00.

S. Puder.

Metoda Hebry przeciwko poceniu się nóg polega na tem, że pacjent obwija dokładnie stopy płótnem, nasmarowaniem c. ung. diachyl. Hebrae, między palce wsuwa maść za pomocą kawałeczków płótna odpowiednio przyciętych. Co 24 godzin zmienia ten opatrunek, usuwając resztki poprzednio użytej maści. Tak postępuje przez 10—14 dni, po czem przyskórek

w całych płatach odpada, a dalsze postępowanie ogranicza się do użycia pudru.

Pediculi capitis.

Polecić obwiązać głowę dokładnie chustką lub zrobić opatrunek z opaski flanelowej (tak, by objęte były wszystkie włosy) napuścić takową na noc czystą naftą lub z dodatkiem balsamu peruwiańskiego. Procedura taka powtórzona dwakroty wystarczy, by wygubić pasożyty. Kiedy to się stało, wymyć głowę letnią wodą i mydłem, wycesać głowę gęstym grzebieniem.

Pediculi pubis.

Nasmarować okolice wzgórka łonowego, prącie, perineum, anus c. unguento cinereo lub 1⁰/₁₀ roztworem Hydrarg. sublimat. corrosivi, następnie kąpiel z mydłem.

Prurigo.

Dzieciom źle odżywionym, żółtawym, podawać porą zimową tran, przetwory jodu, w lecie kąpiele jak: Rabka, Iwonicz, Solec.

Leczenie zewnętrzne:

Kąpiele ciepłe z dodatkiem wątroby siarczanej lub Solutio Vleminckx stosowane codziennie przez dłuższy czas. Kaposi poleca codziennie nacieranie maścią naphtolową 3—5⁰/₁₀, następnie puder (wieczorem); rano na drugi dzień kąpiel 20—24°.

Polecają nacieranie pędzlem szczecinowym zwłaszcza kończyn.

734. *Olei jecoris aselli* 75·00,

Olei olivarium 25·00,

Balsami peruviani

Olei rusci āā. 5·00.

co powtarza się przez 5 dni z rzędu. 2 dni pauza i tylko pudrowanie.

W ostatnich czasach Hatschek z kliniki Kaposiego poleca codziennie masowanie (5—10 minut) powierzchni zajętych, robione przez 3—4 tygodnie codziennie. Już po kilku posiedzeniach chorzy doznają znacznej ulgi. Jeżeli po zastosowaniu takich kilkunastu masowań swąd powraca, to wystarcza zazwyczaj kilka nowo powtórzonych, by go usunąć. Doc. Zarewicz używa równie w swoim oddziale tej metody leczenia i zupełnie jest zadowolonym z otrzymanych wyników.

Pruritus universalis.

Uwzględnić w leczeniu przyczynę, jaką bywają: przewlekłe niezżyty żołądka i kiszki, cukrzyca, u kobiet zboczenia w narządzie rodnym. Późny wiek stanowi sam przez się przyczynę tego przykrego cierpienia (pruritus senilis). Polecieć kąpiele z dodatkiem sublimatu, wątroby siarczanej, alunu, zimne tusze, zawijania w mokre koce. Przeciwnapadowi swędzenia zmycie ciała.

735. *Acidi carbolici* 5'00,
Spir. vin. gall. 100'00.

lub 3% rozczyń alkoholowy mentolu, następnie puder. Jako maść.

736. *Mentholi* 2'50,
Balsami peruviani 5'00,
Unguenti Wilsoni
Lanolini āā. 50'00.
S. Maść.

Pruritus vulvae et vaginae.

Jeżeli przyczyną jest vulvitis, vaginitis starać się ją usunąć. Miejscowo kąpiele letnie, przestrzykiwania pochwy rozczyńami alunu, sublimatu, kwasu karbolowego. W razie powstającego swędu pędzlowanie.

737. *Acidi carbolici* 5'00,
Spir. vini gallici 100'00.
S. Zewnętrznie.

738. *Chloroformii* 5'00,
Olei olivarum 50'00.
następnie puder.

Pruritus ani.

Stosowanie maści:

739. *Calomelanos* 5'00,
Vasellini 35'00.
S. Maść.

740. *Mercurii sublimati* 0'03,
Ammon. chlorati 0'12,
Acidi carbolici 4'00,
Glycerini 60'00,
Aquae rosarum 120'00.
S. Zewnętrznie

nacierać tym płynem 2—3 razy dziennie. Skuteczne bywają pędzlowania c. oleo rusci, 5% rozczyń alkoholowym kwasu karbolowego.

Pityriasis versicolor.

Zmycie powierzchni zajętej ciała 2—3-razowe mydłem szarem, naphtolowem. Pozostawiając zaschlą pianę mydła przez 2—3 dni, polecieć następnie ciepłą kąpiel z dokładnem zmyciem jakimkolwiek mydłem.

741. *Trae Veratri viridis* 50'00.
S. Do pędzlowania na noc..

Następnego dnia kąpiel letnia i zmydlenie powierzchni ciała.

Psoriasis.

Wewnętrznie:

742. *Solutio Fovleri*
Trae malatis ferri āā. 10'00.

rozpoczynając od 12 kropli na dzień; co 3—4 dni bierze chory o 2 krople więcej. W ten sposób zwiększając stopniowo dawkę, dojść można do 40 kropli na dzień, którą ilość używa pacjent przez dłuższy czas, aż

zmiany choroby zaczynają ustępować. Zmniejszając w podobny sposób dawki o 2 krople co 3—4 dni dochodzi znów do pierwotnej ilości.

Podobnie postępuje pacjent przy używaniu *pillulae asiaticae*, rozpoczynając od 2—3 pigułek na dzień, dochodzi stopniowo do 12—15 i znów używając tę ilość przez dłuższy czas, stopniowo zmniejsza dawkę, by dojść do 2—4 pigułek na dzień.

Haslund a za nim wielu innych poleca jodek potasu w wielkich dawkach, zaczynając od 3·00—5·00 pro die co 2—3 dni zwiększa dawkę, dochodząc stopniowo do 15·00—20·00 pro die. W 4—6 tygodniu przy tem leczeniu zaczynają zmiany na skórze ustępować. Lekkie objawy zatrucia nie są zdaniem autora przeciwwskazaniem do dalszego podawania leku.

Leczenie zewnętrzne ma za zadanie:

- 1) usunięcie łusek.
- 2) „ nacieku.
- 3) „ przekrwienia.

Celem usunięcia łusek, polecamy ciepłe kąpiele i zmywanie się w nich mydłem szarem lub salicylowem. Na pojedyncze części ciała jak, łokcie, kolana można stosować okłady Priessnitza. Kąpiele zastąpić można przez tłuszcze jak: vaselina, smalec, tran zawierając pojedyncze części, opaskami flanelowymi po poprzednim nasmarowaniu jedynym z wymienionych tłuszczów.

Celem usunięcia nacieku wcierania (robione codziennie) za pomocą pędzla szczecinowego.

743. *Acidi pyrogal.* 10·00,
Vasellini 100·00.
S. Maść.

744. *Chrysarobini* 5·00—10·00,
Vasellini 100·00.

Jeżeli zmiany chorobowe na skórze są nieliczne, rozsiane, nadaje się dobrze smarowanie przez 10—14 dni ognisk chorobowych roztworem

745. *Chrysarobini* 5·00,
Traumaticini 50·00.

Kaposi poleca zwłaszcza na zmiany na głowie 5—10% maść *naphtolową*.

W razie powstającej dermatitis, po użyciu któregośkolwiek z powyższych środków, zaniechać dalszego używania, ograniczyć się do pudrowania skóry.

Przeciwno zmianom na czaszce

746. *Praecip. albi* 2·00,
Unguenti emoll. 20·00.

S. Maść.

którą maść wciera pacjent codziennie, po poprzednim usunięciu łusek za pomocą zmywania głowy mydłem szarem.

W okresie wybuchu ostrego łuszczycy, nie używać środków drażniących silnie skórę (*chrysarobin*, *oleum rusci* i t. d.), bo łatwo powstają wypryski i zapalenia powierzchowne skóry; ograniczyć się do polecenia kąpieeli ciepłych.

Scabies.

U dorosłych polecić wetrzeć 3—4 razy (wieczorem) jedną z niżej podanych maści, zwróciwszy uwagę na to, by maść została dokładnie wcierana, zwłaszcza między palcami, dłonie, staw nadgarstkowy, łokcie, pachy, pośladki, prącie, okolice stawu kolanowego i stopowego.

747. *Naphtol* 10·00,
Vasellini 100·00.

S. Maść.

748. *Florum sulfuris*
Olei fagi āā. 40·00,
Saponis viridi
Axungiae porci āā. 80·00,
Cretae albae 5·00.
S. Maść.

W praktyce ubogich Solutio Vlemineckx (300), którymto płynem chory powinien się natrzeć 2—3 razy.

Dzieciom przepisujemy:

749. *Balsami peruviani*
Styracis liquidi āā. 5·00,
Vaselini 50·00.
S. Maść.

750. *Naphtol* 5·00,
Vaselini 75·00.
S. Maść.

U dzieci zwrócić uwagę na to, by obok miejsc powyżej wskazanych równie dokładnie wetrzeć maść w stopki.

Po takim kikorazowem natarciu bierze chory kąpiel z mydłem, po czem powinien się ubrać w czystą bieliznę, zmienić pościel, części ubrania noszone w ostatnich czasach, poddać należy desinfekcyi.

Sycosis barbae.

Jeżeli cierpienie ogranicza się do nielicznych króst na małej przestrzeni, nie trzeba golić brody, ograniczając się do epilacyi włosów, w obrębie zajętym chorobą i następowego użycia maści, jak: ung. praecip. albi 1:20·0, ung. diachyli simplicis i t. d.

Przy więcej rozwiniętej chorobie polecić najprzód obstrzyżz krótko brodę (względnie i wąsy), następnie rozmiękczyć strupy przez stosowanie ung. Dyachylon, empl. saponato-salicylicum 10⁰/₀, a po zmyciu mydłem szarą ogolić.

Skoro się to stało, należy przystąpić do epilacyi, usuwając w ciągu jednego posiedzenia 20—40 włosów (zależnie od wrażliwości pacjenta), po czem, jeżeli jest silny odczyn w postaci obrzęku i zaczerwienienia skóry, polecić robienie zimnych okładów przez 2—3 godziny. Kiedy

ten minie, przykładają pacjent maść jak: ung. Diachyl. simplex, ung. praecip. 1:20·0, maści z dodatkiem acid. salicyl., resorcyny. Takim cykl powtarza się dnia następnego a więc: po usunięciu maści z dnia poprzedniego, przez zmycie wodą letnią i mydłem, golenie, epilacya i przyłożenie jednej z powyższych maści. Postępowanie takie prowadzić należy tak długo, dopóki nie upewnimy się, że nie ma już ognisk chorobowo zajętych (torebki włosowe, włosy), co trwa od 6—8 tygodni. Po ukończonem leczeniu, zwrócić uwagę pacjenta, by zarostu nie zapuszczał, ale jeszcze przez dłuższy czas golić.

Urticaria.

Starać się o wyszukanie i usunięcie przyczyny cierpienia. Takimi są: pasożyty skórne (pluskwy, pchły), nieżyty przewodu pokarmowego, u kobiet zboczenia w narządzie rodnym. Jako leczenie symptomatyczne skierowane przeciw swędzeniu i pieczeniu skór polecić używanie:

751. *Spir. vini gallici* 200·00,
Aetheris petrolei 5·00,
Glycerini 2·50.
S. Do zmywania.

752. *Aceti vini*
Aqu. dest. āā. 100·00,
Acidi salicylici 1·00.
S. Zewnętrznie.

753. *Spir. lavand.* 100·00,
Spir. vini gallici 150·00,
Aetheris sulfurici 2·50,
Aconitini 1·00.
S. Zewnętrznie.

Po każdoraz. zmyciu puder.

W wypadkach pokrzywki powtarzającej się często, kąpiele chłodne z dodatkiem $\frac{1}{2}$ —1 kg. sody, 500·0 alunu, lub 10—20·0 sublimatu, zabiegi hydropatyczne.

Dr. Eug. Borzęcki.

VI. CHOROBY WENERYCZNE.

1. Rzeżączka.

a) *Gonorrhoea acuta anterior.*

(U mężczyzn).

Leczenie poronne (Neisser) oddaje dobre wyniki, jak długo wydzielina nie jest jeszcze ropną, objawy zapalne cewki bardzo słabe, a obecność gonokoków w wydzielinie śluzowej zapewnia o jej charakterze rzeżączkowym. Polecieć wstrzykiwania Arg. nitr. 0·05:200—150, 4 razy dnia, płyn wstrzyknięty powinien zostać w cewce 4—5 minut.

Skoro wydzielina stała się ropną, obfitą (w takim stanie widzi się najczęściej pacjentów) objawy zapalne silne, bóle przy oddawaniu moczu znaczne, wstrzymać się od leczenia miejscowego, a ograniczyć do podania.

754. *Saloli* 0·75,

(lub *Natr. salic.*),

D. t. d. N. XV.

S. 3 proszki na dzień.

jako napój polecić wodę Bilińską, Kissingen etc. Kąpiele nasiadowe 26—28° R. Zabronić napoje zawierających kwas węglowy (szampan, piwo, woda sodowa), noszenie suspensorium, czyste utrzymywanie członka, zwrócić uwagę na codzienne wypróżnienia.

Kiedy okres ostry minie, co dzieje się z końcem 3-go, początkiem 4-go tygodnia (a rzeżączka nie przeniosła się na część tylną), wypływ jest śluzowo-ropny, polecić wstrzykiwanie środków, które mają na celu niszczenie i utrudnienie rozwoju gonokoków. Takimi są:

755. *Argentī nitric.* 0·05,

Aquae dest. 200·00.

S. Injectio.

756. *Kalii hyperm.* 0·05—0·15:

200.

757. *Ichtyoli* 4—10:200·00.

758. *Alumnoli* 2—5:200·00.

Każdy z tych środków wstrzykuje pacjent 4—5 razy na dzień.

W miarę jak wypływ staje się coraz skąpszy makroskopowo czysto śluzowy przejść do środków ściągających jak:

759. *Zinci sulfurici* 1·00,
Plumbi acetici 2·00,
Aqu. dest. 200·00.

lub:

760. *Zinci sulfocarbolici* 1—2:
 200·00.

lub:

761. *Bism. subn.* 2—4:200·00.

b) *Gonorrhoea acuta anterior et posterior.*

Dyeta i hygiena a więc: spokój, dyeta płynna, kąpiele leżne, codzienne wypróżnienia; jako napój wodę Bilińską. Fournier przepisuje:

762. *Natri bicarb.* 5·00,
Sacchari albi 30·00.
Succi citr. gtts. II.

S. Rozpuścić w litrze wody
 i użyć w jednym dniu.

763. *Dect. Sem. Lini* 500·00,
Syrupi Diacodii 20·00.
 S. Co 2 godziny łyżkę.

764. *Dect. Folior. Urae Ursi*
Hrbae Herniariae 500·00.
 S. Użyć w ciągu dnia.

765. *Saloli* 0·75.
 3—4 proszki na dzień.

W razie silnych bólów i częstej potrzeby oddawania moczu narkotyki w postaci czopków do kiszki odchodowej, wstrzyknąć morfiny, na międzykrocze okłady ciepłe z mąki siemienia lnianego.

766. *Farinae Seminum lini*
 300·00.

S. Do okładów.

Niemожność oddania moczu starać się usunąć kąpielami ciepłymi, podaniem narkotyków, w ostatecznym razie użyć cewnika Nelatona.

Erekcye, które w okresie ostrym bywają bolesne, a przy zajęciu części tylnej cewki częste, łagodzić przez podanie:

767. *Natri bromati* 2·00,
Camphorae rasae
Lupulini āā. 0·15.
Mfp. div. in d. N. X.

S. Jeden proszek przed pójściem spać.

Przy tem leczeniu i zachowaniu się pacyenta rzeżączka części tylnej ustępuje w 3—4 tygodnie; jeżeli to nie nastąpi trzeba przejść do leczenia miejscowego (p. gon. posterior chronica).

c) Gonorrhoea anterior chronica.

Najwięcej używanym sposobem, by przekonać się o umiejscowieniu rzeżączki jest próba dwóch naczyń (Thompsona). Jest ona pewną, jeżeli wypadnie dodatnio tj. II połowa moczu zawiera składniki chorobowe (mocz mętny, nitki i t. d.) Jeżeli jednak wypadnie ujemnie, to może być powodem błędnego rozpoznania co do usadowienia się rzeżączki. Dlatego w wypadkach wątpliwych lepiej użyć metody pewniejszej, jaką jest przepłukanie części przodowej cewki zgłębnikiem Nelatona ilością mniej więcej 500-0 wody (przy pełnym pęcherzu). Jeżeli po takim przepłukaniu mocz oddany będzie czysty, można wykluczyć zajęcie tylnej części cewki.

Leczenie czysto miejscowe (wstrzykiwania, przepłukiwania, instalacje). W wyborze środków kierować się zachowaniem się wydzieliny względnie nitek w moczu co do obecności gonokoków, i w miarę tego czy takowe są lub ich nie ma, polecić wstrzykiwania środków, które mają za zadanie niszczenie ich, lub środków ściągających (p. gonorr. acuta anterior). Jeżeli sprawa chorobowa trwa długo (n. p. kilka lat) wtedy wstrzykiwania, jakie można dać choremu nie na wiele się przydadzą.

Wskazane są instalacje za pomocą kateteru Guyona lub Ultzmannna rozczyznów Argent. nitr. $\frac{1}{2}$ —15%, Cuprum sulfur. 5—25% robione co 2—3 dzień.

W bardzo zastarzałych wypadkach nieżyty cewki moczowej, gdzie zazwyczaj błona śluzowa jest zgrubiała, naciekła, narząd gruczołowo zajęty (urethritis follicularis) obok instalacyj wprowadzanie sond metalowych (o ile można najgrubszych).

Zwężenia rozszerzać stopniowo przez wprowadzanie miękkich bougie lub sond metalowych.

d) Gonorrhoea chronica anterior et posterior.

Druga część moczu (lub cały mocz po przepłukaniu części przodowej) mętna, robić przepłukiwania części tylnej cewnikiem Nelatona rozczyznami Arg. nitr. 0.10—0.15:400, Cupr. sulf. 1—3:300 codziennie, później co 2-3 dzień.

Druga część moczu czysta zawiera strzępki, nitki (sprawa chorobowa więcej zlokalizowana, trwa dłużej) instalacje Arg. nitr. 1—15%, Cupr. sulf. 5—25% za pomocą cewnika Guyona lub Ultzmannna. Ten ostatni poleca wprowadzenie za pomocą Portereméde Dittla czopków według:

768. *Argen. nitrici* 0.10,
lub *Alum. crudi* 1.00,
lub *Tannini* 0.3—0.5,
Butyri Cacao q. s. f.
supp. ureth. brev. N. V.

Zazwyczaj sprawa chorobowa ustępuje wcześniej z części tylnej i zostaje jedynie w części przodowej, naturalnie że i leczenie ogranicza się wtedy tylko do niej (patrz c).

Przy przeroście caput gallinaginis, prostatorrhoea, wprowadzanie sond metalowych, psychrofor.

2. Powikłania rzeżączki.

a) Balanopostitis.

Obmywanie żołądździ i wewnętrznej powierzchni napletka kilka razy dziennie n. p. 3% roztworem kwasu borowego, 1/4% azotanu srebrowego itp. i zasypywanie np.:

769. Zinci oxydati

Amyli puri

Dermatoli āā. 10·00.

Przy równoczesnej phimosis czyste przepłukiwania robione pod napletek powyższymi roztworami.

Skoro jednak napletek silnie obrzęknie, przepłukiwania są bardzo bolesne, a z ujścia napletka wydobywa się ciecz surowniczo ropna, cuchnąca, zachodzi obawa zgorzeli — przeciąć napletek w linii środkowej, grzbietowej przecina na sondzie rowkowanej.

b) Paraphimosis.

Starać się odprowadzić za pomocą palców, wywierając ucisk na żołądź; jeżeli się nie udaje nacięcie pierścienia ściężniącego (strangulacyjnego) następować odprowadzenie napletka, okłady zimne.

c) Cowperitis.

Zaprzestanie leczenia miejscowego. Okłady zimne, wcieranie szaruchy na międzykrocze. Jeżeli naciek się nie zmniejsza, daje się wyczuć chłobotanie, przecięcie ropnia, dalsze leczenie według zasad chirurgii.

Takie samo postępowanie dotyczy innych ropni okołocewkowych.

d) Epididymitis.

Zaprzestać leczenia miejscowego rzeżączki. Spokój w łóżku, ustalenie i podniesienie jąder zapomocą ręcznika, chustki, dyeta, wolne wypróżnienia. W razie bardzo silnych bólów wstrzyknięcie morfiny. Miejscowe okłady zimne, jeżeli ich chory nie znosi, a nawet bóle się wzmagają, przejść do okładów ciepłych z maki siemienia lnianego. Przy lżejszych stopniach zapalenia przyjądrza chory nie potrzebuje leżeć. Polecieć suspensorium Horand-Langleberta, które ustalając bardzo dokładnie jądra, chroni od bólów i pozwala pacjentowi oddawać się swoim zajęciom. Przy tem leczeniu objawy zapalenia ostrego mijają zwykle w ciągu 4—6 dni. Dalszem zadaniem leczenia jest usunięcie nacieku przyjądrza. W tym celu okłady wysychające z Liquor Buronii (uważać, by nie wywołać wyprysku na skórę moszen), kąpiele nasiadowe 28—30° — pędzlowanie c. Tinctura jodi, Unguent.

kali jodati, maść ichtyolowa 10—20%. Kiedy okres ostrego zapalenia przeminął rozpocząć leczenie rzeżączki miejscowe.

e) Prostatitis acuta.

Zaprzestać leczenia miejscowego; polecić pacjentowi łóżko, dietę płynną, antiflogosa na międzykrocze, dbać o wolne wyprowadzenia; przeciw bólom i trudnemu oddawaniu moczu (spasmus sphincteris externi) narkotyki w czopkach:

770. *Morphii mur.* 0.10,
Extr. Bellad. 0.30.
Butyri Cacao q. s. f.
supp. ad anum N. X.

Dobre usługi oddaje przyrząd podany przez Fingera (Kühl-apparat), przez który (podobnie jak w psychroforze) przepuszcza się wodę o ciepłocie 12—15° przez 20—30 minut codziennie. Jeżeli mimo wszystkich zabiegów leczniczych gruczoł nie zmniejsza się, a nawet wybadać się da chęłbotanie — przecięcie z kiszki odchodowej, dalsze leczenie jak każdego ropnia.

e) Prostatitis chronica.

Leczyć przedewszystkiem sprawę rzeżączkową czy nieżyłową części tylnej cewki (patrz b), psychrofor, wprowadzanie czopków:

771. *Kali jodati* 0.50,
Jodi puri 0.05,
Extr. Belladon. 0.07,
Butyri Cacao q. s.
f. supp. ureth. N. V.

f) Condylomata accuminata.

Jeżeli małe, miękkie starać się usunąć przez polecenie zasypywania 2—3 razy dnia:

772. *Pulv. frond. Sabinae*
Alum. crudi āā. 10.00.

lub:

773. *Resorcini*
Acidi salicyl.
Plv. frond. Sabin. āā. 10.00.

Rozrosłe o szerokich podstawach usunąć nożyczkami, następnie przyżegać Paquelinem lub odpalić samym Paquelinem.

I. Syphilis acquisita. Kiła nabyta.

a) Sclerosis initialis. Kiła pierwotna.

Jeżeli warunki anatomiczne na to pozwalają (napletek, skóra prącia) a od chwili pojawienia się podejrzaney zmiany nie upłynęło więcej jak 2—3 dni wycięcie, wykonane w ten sposób,

TRUSKAWIEC

Zakład zdrojowo - kąpielowy

Stacya klimatyczno - lecznicza i Zakład
inhalacyjny.

Położony w uroczej górskiej okolicy (415 m. n. p. m.), posiada najsilniejsze w Europie źródła solne (25‰), słono-glauberskie, siarczane i alkaliczne.

Rozporządza też kąpielami słonymi, siarczanymi, słono-siarczanymi i borowino-żelazistymi.

Zalecany przeto bywa Truskawiec przez najznakomitszych lekarzy krajowych i zagranicznych w cierpieniach skrofulicznych, gośćcowych, dnawych, syfilistycznych, we wszystkich chorobach połączonych z wysiękami, w przewlekłych cierpieniach pęcherza i nerek, w chorobach kobiecych, skórnych i nerwowych.

Nowo założona wzięwalnia według najnowszego systemu Wassmutha, nadaje się znakomicie do leczenia przewlekłych cierpień dróg oddechowych, a zwłaszcza rozedmy płuc.

Nadto zaopatrzony jest zakład w maszynki elektryczne, pompy żołądkowe, przyrządy do natrysków nosowych, aparat suspensyjny Charcot-Mocutkowskiego i t. d.

Ordynują lekarze zakładowi:

Dr Plech, cesarski Radca z Jarosławia, i **Dr Zenon Pelczar** z Krakowa, oraz wolnopraktykujący **Dr Steinhaus** ze Lwowa, emeryt c. k. lekarz powiatowy i **Dr Kozłowski** z Sanoka.

C. k. Zakład zdrojowy

Stacya kolei
Muszyna-Krynica:

z Krakowa 8 g.
ze Lwowa 12 „
z Budapesztu 12 „

KRYNICA

W miejscu:
Poczta trzy razy
dziennie
TELEGRAF
Apteka.

(w Galicyi),

najobfitsza szczawa żelazista.

W Karpatach 590 metr. n. p. m. Od stacyi kolejowej godzina drogi bitej, znakomicie utrzymanej.

Środki lecznicze: klimat podalpejski, kąpiele żelaziste, nader obfite w wolny kwas węglowy, ogrzewane metodą Schwarza.

Kąpiele borowinowe parą ogrzewane.

Kąpiele gazowe z czystego kwasu węglowego.

C. k. Zakład hydropatyczny pod kierunkiem specjalisty Dra K. Ebersa.

Picie wód mineralnych miejscowych i zagranicznych. Żentyca, kefir, gimnastyka lecznicza.

Lekarz zdrojowy Dr L. Kopř cały sezon stale ordynujący. — Nadto 14 lekarzy wolnopraktykujących.

Spacery: bardzo rozległy park szpilkowy, znakomicie utrzymany. Bliższe i dalsze wycieczki w uroczyskach Karpaty.

Mieszkania: przeszło 1500 pokoi z komfortem urządzonych, z pościelą kompletną, usługą, dzwonekami elektrycznymi, piecami i t. d.

Kościół katolicki i cerkiew. Wspaniały **Dom zdrojowy**, kilka restauracyj. — Kilka pensyonatów prywatnych. — Mleczarnie. — Cukiernie.

Muzyka zdrojowa, pod kierunkiem A. Wrońskiego, od 21 Maja. Stały **TEATR**. Koncerta. — **Frekwencja** w r. 1895 — 4.830 osób.

Sezon od 15 Maja do 30 Września.

W Maju, Czerwcu i Wrześniu ceny kąpiel, pomieszkani i potraw w głównej restauracyi niższe.

Rozsyłka wody mineralnej: od Kwietnia do Listopada, składy we wszystkich większych miastach w kraju i za granicą.

W miesiącu Lipcu i Sierpniu ubogim żadne ulgi, jak: uwolnienie od taks zdrojowych i t. d., udzielone nie zostaną.

Na żądanie udziela wyjaśnień

c. k. Zarząd zdrojowy w Krynicy.

LUBIEŃ

Zakład kąpielowy wód siarczanych

w pobliżu Lwowa i stacyj kolejowych w Gródku i Szczercu położony, otwarty zostaje



dnia 20-go Maja



Urząd pocztowy, telegraficzny i apteka w miejscu. Codzienna poczta wozowa między Lwowem a Lubieniem po 75 ct. od osoby.

Łazienki z wannami porcelanowymi i terazzo, także posadzka, kąpiele siarczano-mułowe parą ogrzewane. Leczenie masaży (maser i maserka fachowo uzdolnieni).

NOWOŚĆ!

Przyrząd do leczenia chorób nosa, gardła i płuc, nie wyłączając gruźlicy zapomocą rozpylonej wody siarczanej.

Kąpiele zimne w rzece Wereszycy. Pomieszkania z urządzeniem i pościelą (materace sprężynowe) w cenie od 50 ct. do złr. 1.20 dziennie, pewna liczba mieszkań do opalania.

W sezonie I od 20 maja do 20 czerwca i w III od 20 sierpnia ceny mieszkań o 20% niższe. W tymże czasie doznają opustu ubodzy, opatrzeni w świadectwa przez c. k. starostwo zatwierdzone.

Fiakier zakładowy po stałych cenach do wszelkich jazd.

Obszerny wzorowo utrzymany park, aleje świerkowe — Kaplica z codzienną Mszą św. — W II i III sezonie muzyka gra po 2 godziny rano i popołudniu. — Wszelkich wyjaśnień udziela na żądanie

Dyrekcya Zakładu.

Wielki medal na wystawie przyr.-lekrskiej w Krakowie r. 1891.

WYSOWA

w Galicyi powiat Gorlice.

Zakład zdrojowo-kąpielowy i żętyczny.

Stacye kolei żelaznej Grybów lub Gorlice o 30 kilometrów
od Zakładu odległe.

**Sześć głównych źródeł chemicznie rozebranych przez
Prof. Radziszewskiego i Trochanowskiego.**

Zród słony szczawa słono-bromowo-jodowo-żelazista zawiera
z wszystkich dotąd znanych szczaw największe
ilości dwuwęglanu sody. Według Prof. Radziszewskiego i Dra
Lutostańskiego zajmuje pierwsze miejsce w dziale wód tego
rodzaju.

Zród Rudolfa szczawa alkaliczno-żelazista najsilniejsza z do-
tychczas znanych szczaw w Europie.

Zród Bronisława silna szczawa alkaliczno-żelazista.

Zród Józefa szczawa alkaliczna, nagrodzona na wystawie
przyr.-lekrskiej wielkim medalem zasługi, pol-
skim Gieshüblerem zwana, tego rodzaju zagraniczne szczawy
zastąpić może.

Zród Olgi o składzie do Słon. **Zród Wandy** słaba szczawa
żelazista.

W sezonie lekarz, apteka, łazienki, poczta, muzyka.

Wycieczki bliskie w uroczym okolicy.—Jednodniowa wycieczka do:
Krynicy, Muszyny, Żęgiestowa, Bardyowa.

Wody rozsyła Zakład w cenie:

Za pakę dużą (40 flaszek) 8 złr. || Za pakę małą (20 flasz.) złr. 4.25-
Zród Józefa paka duża 6 złr.

**Wody do nabycia we wszystkich składach
wód mineralnych w Galicyi.**

Informacye na żądanie gratis i franco.

Medal zasługi na wystawie przemysłowo-rolniczej w Przemyśle r. 1882.

CIEPLICE TRENCZYŃSKIE

zakład zdrojowy na górnych Węgrzech

20 minut odległy od stacyi Tepla-Trenesén—Teplitz.

Termy siarczano-wapienne ciepłoty 36·6—40·2 C. Kąpiele wannowe, basenowe, natryski, inhalacye. Mieszkania od 50 ct. do 3 Złr. na dobę. Kuchnia francuska. Z Krakowa via Oderberg, Żolnia, Tepla-Terencsén-Teplitz 9 godz. drogi. Frekwencya 5600 osób.

Pora zdrojowa od 1 Maja do końca Września.

W Maju i Wrześniu pensjon 3 Złr.

Bliższych szczegółów udziela **Dr Filipkiewicz** (zimą w Krakowie, Kolejowa 18).

Prospekty rozsyla bezpłatnie

Dyrekcya kąpielowa.

Ludwik Knapieński

dostawca dla c. k. klinik Uniw. Jagiel.

narzędzi chirurgicznych
maszyn ortopedycznych

bandaży i instrumentów
do intubacyi.

Pierwsza fabryka w Galicyi
popierana przez Szanowną
Komisyę przemysłową Tow. Lek. Krak.

i odznaczona wielkimi medalami
srebrnemi za staranne wyrabia-
nie narzędzi odpowiadających
wszelkim wymaganiom tak co do
trwałości jakoteż dokładności.

Adres telegraficzny:

„Knapieński, Kraków“

Kraków, Sławkowska 4.

LUDWIK KNAPIŃSKI.

Na żądanie WW. PP. Doktorów wykonuję narzędzia chirurgiczne we własnej fabryce podług ostatnich ulepszeń, wymagań nauki, które przy zupełnej doskonałości i dokładności w wykończeniu odznaczają się stosunkowo niskimi cenami.

Uważałem też za potrzebne wejść w stosunki z pierwszorzędnymi domami specjalności chirurgicznej za granicą, a to odnośnie do przedmiotów, które dziś jeszcze nie mogą należeć do obrotu krajowego przemysłu i takowemi w odpowiedniej ilości skład swój zaopatrzyłem, iżby w każdym wypadku natychmiastowo być w możności zadość uczynienia wszelkim żądaniom WW. PP. Doktorów.

Nie wątpię, iż będę mógł pod każdym względem zadość uczynić żądaniom WW. PP. Doktorów, gdyż pracując przeszło lat 15 w tym zawodzie, czuję się być zupełnie wydoskonalonym, a rzetelnością i punktualnością w wypełnianiu wszelkich zleceń, mam nadzieję zaskarbić sobie poparcie z Ich strony w szerszym zakresie.

Wszelkich informacji udziela się franco, podług nadesłanego adresu.

Przy zamawianiu większych partij instrumentów, ustępuje się stosowny procent.

L. Knapieński.

Apteka pod „złot. Słoniem“

E. HELLERA

(dawniej E. Stockmara)

w Krakowie, ulica Grodzka 22

Telefonu Nr 203.

Poleca Wp. Lekarzom

NAJWIĘKSZY SKŁAD
przyrządów lekarskich i chirurgicznych,

przyrządy do mikroskopów. jak szkiełka podstawowe i przykrywowe, dalej szkiełka zegarkowe, eprobetki, igiełki platynowe i **wszelkie barwiki** z najlepszych fabryk.

Utrzymuje na składzie wszelkie klizopompy, respiratory, rozpylacze, termometry maksymalne wypróbowane, spryki Prawaza różnych konstrukcyj i t. d. Wyrabia pastylki Thyroidinowe o 0.25 polecane przez Towarzystwo lekarskie Krakowskie, również przyspasabia wszelkie płyny sterylizowane do wstrzykiwań podskórnych.

Zawsze świeża krowianka na składzie.

Wysyłki na prowincję odwrotnie uzupełnia się.

I. D. RIEDEL

BERLIN 39.

Chemiczna fabryka i skład droguer. lekarskich,
wyrabia wszystkie przetwory objęte
Pharmakopeą.

Całkowite urządzenia do aptek.

Poleca:

Salipirin Riedel (według prof. Moseugeil i innych powag) lek swoisty w influency działa pewnie, posiada własności uspakajające i nasenne nie spowodza ubo-
cznych objawów nieprzyjemnych. Używany z dobrym skutkiem już dłuższy czas przez profesora Moseugeila w niezytach błony śluzowej nosa, przeziębieniach. Znakomity środek w bólach głowy, neuralgiach i gościecu stawowym, w obfitem miesiączkowaniu jak również w zaskąpych miesiączkach przewyższa Salipiryna przetwory Secale lub Hydrastis.

Dawka 0.5—1.0 gr. kilka razy dnia.

Żądać wyraźnie w aptekach **Salipirin Riedel**.

Tolypirin Riedel jest skuteczniejsze, tańsze i mniej niebezpieczne od Antipiryny.

Tolysal Riedel najlepsze nieszkodliwe antirheum. i antineuralg.

Thiol Riedel (liquid.) konsystencyi ichtiolu; sicc. pulv. sproszkowane) dzielny lek w

dermatologii i ginekologii,
zawiera działające składniki Ichtyolu w czystej formie bywa przeto używane w chorobach skóry, gardła, nosa, w cierpieniach gościecowych, w chorobach kobiecych, oparzeniach i t. d. Posiada wyższość nad ichtyolem, gdyż nie cuchnie, jest o połowę tańszy, nie plami bielizny.

Piśmiennictwo na żądanie.

Chloralhydrat Riedel

Phennacetin Riedel

Sulfonal Riedel

Pepsin Riedel

Acid salicylicum Riedel

Natr. salicylicum Riedel

} znane ze swej dobroci nie
ustępują przetworom z in-
nych fabryk.

Zakład Wodoleczniczy

Dra Chramca

w **Zakopanem**

otwarty cały rok.

Cena 4 złr. dziennie za wszystko,

t. j. pokój, kąpiele, honorarium
lekarskie, usługa, opał, oświetlenie
i wikt.


Kuchnia wyborna.

Ceny większe odnoszą się do
wielkich i stylowo urządzonych
pokoi.

W Zakładzie są sale gimnasty-
czne i wspaniałe maszyny do
elektryzowania.

Wszelkie przyrządy do leczenia
potrzebne z najlepszych firm krajo-
wych i zagranicznych.

K. ZIELIŃSKI
mechanik i optyk
Kraków, Rynek 1. A-B, 39,
poleca



**maszynki elektryczne lekarskie, indukcyjne
i z prądem stałym, ciepłomierze lekarskie itp.**
Obfity zapas okular, cwikierów, lornetek
teatralnych i polowych.

Wszelkie okulary kombinowane podług zleceń PP.
Okulistów wykonuje w jak najkrótszym czasie,
reperacye bezwłocznie.

Zamówienia z prowincyi odwrotną pocztą.

PENSYONAT

przy zakładzie wodoleczniczym
na **Miedziusiu**
w **Szczawnicy**

z komfortem urządzonych 120 pokoi,
wodociągi, oświetlenie elektryczne, kuch-
nia dobra, wina doborowe i t. p.

Oplata za pensję z całodziennem utrzy-
maniem, kąpielami, mieszkaniem i po-
ścielą wynosi od 3 złr. 50 c. dziennie,
wyżej.

Dr. J. Kołaczkowski,!

właściciel Zakładu.

Andrzej
c. i k. dostawca
nadworny



Saxlehner
właściciel
źródła słynnego

„Hunyadi János.”

Saxlehner'a

wody gorzkiej

według orzeczenia powag lekarskich:

Szybkie, pewne, łagodne działanie,

Przy dłuższem stosowaniu łatwo się znosi.

Jednostajny i trwały skutek.

Mała dawka. — Łagodny smak.

Skarb ten natury rozbierany i uznany przez
Liebig'a, Bunsena, Fresenius'a
jest jedynym w swoim rodzaju.

W celu uchronienia się przed naśladownictwem
uprasza się zwolenników

naturalnej wody „Hunyadi János”

zwrócić uwagę, czy na etykiecie i korku jest firma:

„Andreas Saxlehner.”

„HYGEA“

chem.-farm. laboratorium

M. Zahradnika

w Złoczowie

poleca znane już i przez Tow. lek. Krak.
polecone

Kapsułki i Perełki lecznicze „Hygea“

nagrodzone na Wystawie kraj. w r. 1894
złotym medalem.

Dobroć materyałów, dokładne dawki,
staranna robota i gustowne pakowanie,
a względnie i taniość, wyróżniają ko-
rzystnie ten wyrób krajowy od za-
granicznego.

Okazy i cennik na żądanie.

**Część zysku na korzyść Domu
Akademickiego.**

Konstantego Wiszniewskiego

Aptekarza w Krakowie

Telefon Nr 31.

Wyroby farmaceutyczno-lekarskie:

Kołaczyki (Tabletki) z wyciągiem **Kaskarowym** polecane przez Tow. lek. Krak. na wniosek komisji tegoż Towarzystwa pismem z d. 4 kwietnia 1884 r. L. 308 i odznaczone na wystawach krakowskiej i lwowskiej. Jako lek przeczyszczający odświeża się od innych środków zawierających aloes, że nie sprawia bólei i nie osłabia, a pobudza apetyt.

Zażywać można trzy razy dnia po 1, 2 do 3 jednorazowo.

Zażywa się: położywszy na język kołaczyk popija się wodą i połyka, nie czuje się smaku i obejdzie się bez opłatka. Kołaczyki składają się z ekstraktu kaskarowego i kremortary, tym to składnikom zawdzięcza ten preparat tak wyborowy skutek.

Zawsze na składzie gotowe są kołaczyki z węglanu guajakolu po 0.20 i po 0.50. Również po 0.50 z Hemoglobinu suchego, który równa się zupełnie w skutku z Pfeuferowskim, a jest łatwy do zażycia.

Na składzie jest także wyborowe w smaku i skutku **Piwo** z ekstraktem słodowym, oraz ekstrakt słodowy gęsty w słoikach.

Również rozmaite **wina lecznicze**, wyrabiane na starej Maladze i winie Lacrima Christi.

Na składzie jest także **koniak leczniczy** stary w całych i pół-butelkach.

Także **Wina**: **Malaga**, **Lacrima Christi** i **Bold Cherry**.

APTEKA
PIOTRA MIKOŁASCHA

we Lwowie, Kopernika 1

poleca

WINA LECZNICZE

własnego wyrobu

odszczególnione zaszczytnemi świadec-
twami P. T. pp. Lekarzy.

Wszelkie nowe środki lecznicze
stale na składzie.



by usunąć ile można tkanki w otoczeniu, założenie szwów. Obserwować pacyenta przez dłuższy czas, by upewnić się, czy nie wystąpią zmiany drugorzędne.

W leczeniu zmiany pierwotnej trzeba:

- 1) wrzód oczyścić, zamienić na czystą ranę;
- 2) oczyszczony doprowadzić do pokrycia przyskórką;
- 3) naciek pozostały starać się usunąć.

Jeżeli powierzchnia sclerosi initialis pokryta jest wiotkim nalotem obumarłej tkanki, polecić przykładanie kilka razy dnia na wacik:

774. *Cupr. sulf. 1'00,*
Aqu. dest. 30'00.

Gdy zmiana pierwotna przedstawia się jako wrzód. Posypywanie jodoformem 2-3 dziennie. Skoro się wrzód oczyścił zapisujemy:

775. *Empl. hydrarg.*
Empl. sapon. āā. 10'00.
MS. Maść.

776. *Hydr. praecip. rubri 0'10,*
Vaselini 20'00.
S. Maść.

Gdy zmiana pierwotna przedstawia się jako naciek o powierzchni exkoryowanej — polecić przykładanie jednej z powyższych maści. Jeżeli sclerosi initialis przybrała cechę wrzodu fagedenicznego, głęboko ropiącego, rozpad postępuję z dnia na dzień szybko, zachodzi obawa zniszczenia prącia a dotyczy osobnika zdrowego zresztą, leczenie ogólne wcieraniami obok miejscowego. Jeżeli dotyczy to indywiduum źle odżywione, skrofaliczne, przedewszystkiem leczenie wzmacniające. Leczenie ogólne przetworami rtęci w okresie I-rzędnej kiły, jako mające zapobiedz wybuchowi zmian następowych zwolenników niema i wskazanem jest tylko wtedy, jeżeli zmiana pierwotna komplikuje się z phimozą, gangreną, fagedenizmem.

Leczenie ogólne przetworami jodu w okresie kiły pierwszorzędnej wskazanem jest u osobników skrofalicznych, u których przychodzi do bardzo znacznego obrzmienia gruczołów chłonicowych.

Jako zasadę przyjęto, że leczenie ogólne rozpoczyna się z wystąpieniem

b) Syphilis secundaria.

Przygotowanie do leczenia ogólnego rtęcią:

- 1) korzenie zepsutych zębów i osad kamienia usunąć;
- 2) już przed rozpoczęciem leczenia polecić pilne czyszczenie zębów np.:

777. *Calcar. carbon. 50'00,*
Kali chlorici 10'00.
S. Proszek do zębów.

- 3) płukanie ust i gardła 3% roztworem kwasu borowego lub chloranu potasowego;

4) u palących ograniczyć liczbę cygar i papierosów, zabronić używania większej ilości napojów wysokowych, pokarmów pieprznych i słonych;

5) zbadać mocz.

Leczenie przetworami rtęci wskazanem jest (według Fingera):

1) w postaciach kiły II-rzędnej, które uważać należy za ciężkie (suche, łuszczące się wysypki);

2) przy zajęciu ważnych narządów (oko, mózg);

3) przy częstych nawrotach choroby zwłaszcza, jeżeli poprzednio chory leczony był przeważnie przetworami jodu;

4) przy ciężkich postaciach u osobników dobrze odżywionych (wyjątek stanowi lues maligna praecox).

Rtęć wprowadzać można przez:

I. wcierania;

II. wstrzykiwania podskórne lub mięśniowe;

III. przez przewód pokarmowy;

IV. przez kąpiele;

V. nakadzanie.

I. Wcierania.

Przed ich rozpoczęciem polecić kąpiel ciepłą, zmycie dokładne skóry mydłem. Najodpowiedniejszą porą jest czas przedpołudniem do robienia wcierań — nigdy wieczór bezpośrednio przed pójściem spać. W pokoju, gdzie pacjent robi wcieranie nie powinno być zimno (16—18° R.) — pokój po skończonem wcieraniu przewietrzać.

Dawka jednorazowa dla dorosłych 3—5·0, u osesków i dzieci 0·5—1·0 pr. dosi. Wcieranie powinno się robić przez 20—30 minut zwłaszcza, jeżeli je chory robi sam. Wciera się kolejno:

1 dzień obie łydki;

2 " wewnętrzne strony uda;

3 " boki klatki piersiowej i brzucha;

4 " wewnętrzne powierzchni kończyn górnych;

5 " grzbiet (co odpada, jeżeli pacjent robi sam wcierania).

Takich 5 wcierań stanowi jeden szereg, po którym pacjent bierze kąpiel (parową lub wannę) i rozpoczyna dnia następnego nowy szereg, zaczynając od łydek. Najczęstszem przeciwskazaniem jest wielka wrażliwość skóry (idiosynkrasya), lub rozległe, rozpadające się zmiany kilowe tak, że nie ma dosyć przystępnej powierzchni skóry do zrobienia wcierania.

II. Wstrzykiwania podskórne.

a) soli rozpuszczalnych:

778. *Sublimati corros.* 0·10,

Natr. chlor. 1·00,

Aqu. dest. 10·00.

S. Do iniekcij.

779. *Hydr. pepton.* 0·10,

Aqu. dest. 10·00.

S. Do iniekcji.

Z tych rozczyńców robi się codziennie wstrzyknięcie (w grzbiecie) pełną wstrzykawkę Pravatza; w całości 20—40 inhalacyj. Schwimmer poleca:

780. *Hydr. sozod.* 0·80,
Kali jodati 1·60,
Aqu. dest. 10·00.
 S. Do iniekcji.

5—6 wstrzyknięć zrobionych co 5—6 dni wystarcza do usunięcia zmian chorobowych.

b) soli nierozpuszczalnych:

781. <i>Calomel. vapore parati</i>	782. <i>Hydr. oxyd. flav.</i> 1·00,
<i>Natr. chlor. aa.</i> 2·05,	<i>Gummi arab.</i> 0·25,
<i>Aqu. dest.</i> 25·00,	<i>Aqu. dest.</i> 30·00.
<i>Gummi arabici</i> 1·00.	S. Do iniekcji.
S. Do iniekcji.	

783. *Hydr. salic.* 1·00,
Paraff. liqu. 9·00.
 lub w tym samym stosunku
Hydr. thymolo-aceticum.

Którykolwiek z powyższych środków wybierzemy, to wstrzykiwania robi się (pełna wstrzykawka Pravatza) co 5—6 dni w pośladki; liczba wstrzyknięć mniej więcej 6—8. Przeciwskażane są wstrzykiwania (zwłaszcza soli nierozpuszczalnych) u osobników źle odżywionych i przy złym stanie zębów.

III. Przetwory podawane na wewnątrz.

784. <i>Protojodur. Hydr.</i> 1·00,	785. <i>Hydr. tan. oxyd.</i> 5·00,
<i>Laudani puri</i> 0·25,	<i>Laudani puri</i> 0·25,
<i>Extr. et plr. Acori aa. q. s.</i>	<i>Extr. et plr. Acori aa. q. s.</i>
<i>f. pill. N. 50.</i>	<i>f. pill. N. 50.</i>
S. 2 pigułki dziennie.	<i>Obduce Balsamo de Tolu</i>
	<i>Consp. pulv. cinam.</i>
	S. 2—4 pigulek na dzień.

786. *Calom. laevi* 2·50,
Opii puri 0·15,
Mucilag. gummi arab.
Pulv. liquir. aa. q. s. f.
pill. N. 50.
 S. 2—3 pigułki na dzień.

IV. Kąpiele.

Mają zastosowanie przeważnie u osesków dotkniętych kłą wrodzoną. U dorosłych w wypadkach zmian kłowych, które pociągały za sobą owrzodzenia, zniszczenia tkanek i gdzie możemy spodziewać się, że w ten sposób wessanie rtęci nastąpi. Zapisujemy:

787. Mercurii sublimati corros.

10—30·00,

Aqu. dest. 400·00.

S. Do jednej kąpieli.

Woda powinna mieć 26—28° R., trwać od 1/2—2 godzin, po kąpieli chory najlepiej robi, kładąc się do łóżka. Kąpiele bierze chory codziennie.

Jakakolwiek obraliśmy drogę i przetwórz rąci, to przeciętnie w danym wypadku należy go stosować aż do ustąpienia zmian chorobowych, a po ustąpieniu takowych jeszcze przez jakiś czas przedłużyć leczenie. Jeżeli w ciągu leczenia przetworami Hg. wystąpi albo Stomatitis lub Enteritis mercurialis przerwać leczenie i nie rozpocząć na nowo aż do zupełnego ustąpienia objawów zadrażnienia dziąseł lub przewodu pokarmowego.

Leczenie przetworami jodu.

wskazanem jest:

- 1) u osobników dotkniętych równoczesnem zakażeniem żółtym;
- 2) przy zajęciu układu kostnego, narządów mięsnych, układu nerwowego;
- 3) jeżeli pacjent poprzednio był leczony przeważnie przetworami rtęci;
- 4) w kile złośliwej wczesnej.

788. Kalii (Natrii) jodati 5—

10:200·00,

Det. ad vitr. cerul.

S. 2 łyżki dziennie.

U osobników niedokrewnych zapisujemy:

789. Ferri jodati 10·00,**790. Natr. jod. 5·00,***Extr. et pulv. Gent.**Extr. et pulv. Radicis Acori**aa. q. s. f. pill. N. 100.**aa. q. s. f. pill. N. 50.*

S. 3 razy dnia po 4—6 pigułek. S. 3 razy dnia po 2 pig.

Condylomata lata.

na błonach śluzowych jamy ust pędzlować:

791. Sublimati corrosivi 1·00,*Spiritus vini 10·00.*

S. Do pędzlowania.

Jeżeli znajdują się ad anum, scrotum, zwłaszcza jako kłykciny przerosłe, dobrze działa przysypywanie:

792. Calomel. laevig. 15·00,*Natr. chlor. 5·00,**Amyli tritici 30·00.*

S. Do zasypywania.

lub plaster rtęciowy.

Leucoplacia buccalis.

pędzlować rozczytnem:

793. *Acid. chrom.* 0·10:20·00,
lub *Acid. lactici* 50%.

Psoriasis palmaris et plantaris.

Usunąć zgrubiałą warstwę przyskórka przez okłady wysychające lub przy pomocy rękawiczek, pończoch kauczukowych, celem zaś usunięcia i przyspieszenia wessania pozostałych nacieków plaster ręciovowy.

c) Kiła trzeciorzędna.

W postaciach lżejszych jod, Decoctum Zittmani (polecając rano na czczo 300·0 fortius, po południu 300·0 mitius); w cięższych (zmiany w mózgu, rdzeniu pacierzowym, oku), wcierania; u źle odżywionych starać się o poprawienie odżywienia.

W zmianach przystępnych do leczenia miejscowego a więc: kilaki skórne, zapalenia okostnej, etc. przyspieszyć wessanie przez przykładanie plastra ręciovowego.

II. Syphilis congenita. Kiła dziedziczna.

Najpewniej działają wcierania, które bez obawy robić można u osesków 4–6 tygodniowych po 0·5—1·0 pro dosi naprzemian jednego dnia na klatce piersiowej i brzuchu, drugiego na grzbiecie, a mniej pewne są kąpiele sublimatowe robione codzień według:

794. *Sublimati corrosivi*
Ammon. muriat. āā. 2·00,
Aqu. dest. 200·00.
S. Do 1 kąpiei (26—28% R.).

Wewnętrznie podać można:

795. *Calomel laevig.* 0·15,
Sacchari lactis 4·00.
Mfp. d. in d. ac. N. XII.
S. Rano i wieczór po jednym
proszku.

Co 6 dni spauszować przez jeden dzień, znów podawać przez dalsze 6 dni aż do ustąpienia zmian.

Ulcus molle.

Jeżeli nie ma żadnego powikłania (zwłaszcza żaden z gruczołów pachwinowych nie powiększony) można starać się oczyścić dno wrzodu przez środki żrące:

796. *Cupri sulfurici* 5'00,
Aqu. dest. 15'00.

Pacjent przykłada co 2 godziny na owrzodzenie tamponik waty umoczony w tym płynie, na noc zostawia takowy, poczem w miejscu wrzodu tworzy się strup, który po odpadnięciu odsłania ranę czystą. Wtedy polecić obmywanie rany jakim płynem antyseptycznym i przykładanie maści z *Argent. nitr.* 1% lub 3% borowej. Zamiast *Cupr. sulf.* użyć można *Acid. carbol.* 4%, kwasu azotowego i t. d. W miejsce środków żrących użyć można:

797. *Jodoformi oleo amygdal.*
desodorati 3'00.

a kiedy wrzód zamieni się na ranę czystą, leczyć ją jak powyżej.

Bubo.

W pierwszych chwilach, kiedy który z gruczołów jest lekko powiększony, bolesny, starać się przez okłady lodowe, wcieranie szaruchy zapobiedz ropieniu. Najczęściej wynik bywa ujemny, a wtedy, nie czekając, aż gruczoły powiększą się znacznie, nawet da się wyczuć chęłbotanie, wyciąć gruczoły zajęte, a nawet podejrzanę. Kiedy daje się wykazać wyraźne chęłbotanie można ograniczyć się do przecięcia, następne leczenie jak każdego ropnia.

Dr Eug. Borzęcki.



VII. CHOROBY NOSA, GARDŁA, KRTANI I USZU.

Choroby jamy nosowej.

Rhinitis catarrh. acuta.

Środki napotne, miejscowo pędzlowanie 10% Cocainą lub wprowadzanie długich tamponików z waty zanurzonych w rozczyźnie Cocainy, przyczem nie należy zapomnieć o tem, iż Cocaina może się dostać do trąbek Eustachiusza, sprowadzając przemijające przytępienie słuchu.

Rhinitis chron. atrophica.

często połączona z cuchnieniem z nosa i zaleganiem mas zeschniętej wydzieliny. Po wykluczeniu scleroma, lues, cierpienie zatok bocznych nosa, należy stosować przestrzykiwania nosa, najlepiej z irygatora, 2—3 razy dziennie, biorąc na każdy raz, litr wody cieplej, dodając do niej łyżeczkę od kawy z proszku:

Natri bicarbonici 10:00,
Natri chlorati 50:00.

Można też dodać kwasu salicylowego lub borowego w ilości 5:00. Gdyby zeschnięta wydzielina nie dała się usunąć przestrzykiwaniami, należy ją usuwać szczepczykami.

Przy rozpoznaniu lues leczenia teje ogólne obok miejscowego, gdzie na pierwszym miejscu należy postawić nitrates argenti w rozczyznach 20—50%, względnie sublimat 1%. Przy scleroma również przepłukiwa-

nia nosa, przy ropieniu z zatok bocznych nosa leczenie tegoż.

Rhinitis chron. hypertr.

Zbadanie nosa od tyłu, by się o stanie przerostu przekonać. Leczenie miejscowe tuszowaniem z lapisu 5—10%, wprowadzanie bougies z waty zanurzonych w rozczyźnie 3% Na. z każdej strony po dwa, odpowiednio dolnemu i średniemu przewodowi nosowemu, usuwanie wybujałości przerostowych, w końcu leczenie galwanokauterem.

Epistaxis.

Kauteryzacja broczącego naczyń, najlepiej cum acido nitrico fumante, zapomocą pręcika drewnianego zakończonych dość ostro, następnie tamponada gazą tanninowo-jodoformową. Tamponada od przodu dobrze wykonana zupełnie wystarcza.

Eczema narium.

Czopki z waty odpowiadające swą wielkością otworom nozdrzy, pomazane cum Ung. diachyl. Hebrae, 2 razy dziennie, zostawiając w każdym otworze nosowym z osobna około pół godziny. Przy furunkulach leczenie chirurgiczne.

W przypadkach ciała obcego, przestrzykiwania nosa od strony przeciwnej, względnie wydobyć tępym haczykiem o krótkim zagięciu.

Choroby gardła i krtani.

Angina catarrh. acuta.

Ciepłe płukania z nawaru kórzeni ślazowych, przy

Angina phlegmonosa.

Otworzenie ropnia w stosownym czasie; dnia następnego w razie objawów zatrzymania się ropy, należy zgłębnikiem, zerwać zlepiające się brzegi otworu.

Angina tonsill. follicularis.

Ciepłe płukania; w przypadkach natury podejrzanej, leczenie miejscowe wycieraniami sublimatem 1:500, zapomocą krótko uciętego pędzelka, lub kawałków gąbki umocowanych na szczypekach.

Pharyngitis chronica.

Leczenie winno poprzedzać zbadanie jamy noso-gardłowej, względnie nawet nosa; przy zajęciu tychże równoczesne leczenie. W przypadkach postaci zanikowej, suchej, leczenie prawie bezsilne; nieraz sprawia się ulgę chorym przy pędzlowaniach cum

798. *Jodi puri* 0·25,

Kali jodati 1·00,

Glycerini 20·00.

DS. Zewnętrznie.

Pharyngitis hypertr. granulosa lub lateralis. Kauteryzowanie miejscowe lapisem w substancji lub pędzlowanie całego gardła rozcżynami lapisu 10 i 20⁰/₀, lub taniny np.

799. *Acidi tannici* 2·00,

Spir. vini rectific. 20·00.

DS. Zewnętrznie.

800. *Sozodol* 2·50,

Aqu. dest. 50·00.

S. Do pędzlowania.

Niemniej można chorym zapisywać zimne rozpylania z rozcżynów 1—2⁰/₀ *Natri bicarb.*, *Kali carbon.*, *Natri chlor.*, *Amonii chlor.*, dalej płukania z tych środków lub z taniny np.

801. *Acidi tannici* 5·00,

Spir. vini rectific. 50·00,

Aqu. dest. 500·00.

(*Morphii mur.* 0·10—0·20).

DS. Do płukania gardła.

Perichondritis laryngis.

Okłady zimne na okolicę krtani, wzięwania z *Zincum sulfur.* 2—3 i 5⁰/₀ z dodatkiem morfiny w stosunku 0·2—0·3 i 0·5⁰/₀; w przypadkach ropnia otwarcie tegoż, ewentualnie tracheotomia.

Laryngitis acuta.

Środki napotne, okłady wysychające, w samym początku wzięwanie zimne rozpylaczem *Richardsona*, zresztą wzięwania z przyrządu *Sieglego*, używając do tychże alunu czystego 1⁰/₀ z dodatkiem 0·10⁰/₀ morfiny; podobnież boraksu lub soli kuchennej.

Laryngitis chronica.

Leczenie wzięwaniami nie wystarcza, należy stosować leczenie miejscowe, zwracając równocześnie uwagę na zachowanie się gardła, jamy noso-gardł. i nosa. W przypadkach cięższych zadmuchiwanie do krtani z czystego alunu, lub alunu z morfiną.

802. *Alum. crudi*

Sacch. lactis aa. 5·00,

Morphii mur. 0·10.

DS. Do zadmuchiwań krtaniowych.

Dalej taniny np.

803. *Acidi tannici* 1·00,

Sacch. lact. 10·00.

którą również można używać z dodatkiem morfiny w stosunku 0·10:10·00.

W postaciach nieżyty ze znaczną wydzieliną należy równocześnie stosować wdychiwania, a jeszcze lepszymi są przestrzykiwania krtani 1 $\frac{1}{2}$ % roztwór. ałunu.

Przy zgrubieniach więzadeł tuszowanie jodłem 5–10 $\frac{1}{2}$ %; przy zgrubieniach miejscowych usunięcie tychże.

Przy sprawie chronicznej, jaką jest scleroma, jeżeli nie ma potrzeby zabiegów energiczniejszych, możemy stosować zwykle wdychiwania.

Lues laryngis

wymaga leczenia miejscowego obok leczenia ogólnego i tu

znów jak wyżej lapis lub sublimat.

Tuberculosis laryngis,

w przypadkach owrzodzeń więcej ograniczonych, kwas mlekowy 40 i 80 $\frac{1}{2}$ %, przy zmianach rozleglejszych zadmuchiwanie czystym jodolem; przy bólach przy przełykaniu zadmuchiwanie morfiny.

804. *Morphii mur.* 0·50,

Sacch. lact. 5·00.

Również można połączyć jodol z morfiną. W przypadkach zasychania wydzieliny w krtani, bólów i uporczywego kaszlu, można też polecić wdychiwania ciepłe ze słabych roztworów soli kuchennej z dodatkiem morfiny w stosunku 0·10–0·20 $\frac{1}{2}$ % lub tylko z morfiny.

Choroby uszu.

Otalgia.

Przyczyna najczęściej spróchniałe zęby, dalej zimnica, przymiot. Leczenie przyczynowe; w innych razach można zapuścić Cocainę 0·20–10·00. Wszystkie krople zapuszcza się do ucha ogrzane.

Acumulatio ceruminis.

Silne wystrzykanie ucha ciepłą wodą, należy używać strzykawki dość dużej 100–200 gramowej. W przypadkach, gdy się nie udaje, dobrze jest zapuszczać przez jeden dzień kropli według przepisu.

805. *Natrii carbon.* 0·50,

Aqu. dest.

Glycerini puri aa. 5·00.

DS. 3 razy dziennie po 10 kropli ogrzanych zapuszczać,

by następnego dnia powtórzyć wystrzykanie. Po wystrzykaniu należy ucho zatkać watą na kilkanaście godzin.

Otitis externa circumscripta.

W samych początkach można zakładać waciki zanurzone w 5 $\frac{1}{2}$ % Cocainie lub w roztworze Tinet. opii 4·00, Aqu. destil. 12·0 wreszcie amygdalae auriculares gelatinosae, z których na każdą przypada 0·10 Extr opii. Przy wyraźnym furunkule otwarcie tegoż z następowym opatrzeniem antyseptycznym, do czego dobrze się nadaje gliceryna karbolowa (0·50–15·00) kwas borowy z alkoholem (0·50–10·00). W przypadkach często powtarzających się recydyw zalecają zapuszczenie spirytusu sublimatowe-

go Hydrarg. bichlr. corros. 0·05
— 0·10 na 50·0 Spir. vini rect.

Otitis externa diffusa.

Wprowadzenie gazy zwykłej zanurzonej w roztworze octanu glinowego, w płynie Burowa, niemniej wspomniane amygdale cum opio.

Ciała obce w uchu.

Silne wypłukiwania ucha ciepłą wodą, które chociażby nie doprowadziły zaraz do celu, można powtórzyć dnia następnego, by ucha nie zanadto zadrażnić. Do narzędzi uciekamy się w ostateczności i tu na pierwszym miejscu stoi zwykły haczyk lub okienkowa tępa łyżeczka, nigdy nie używać szczypcyków; w wyjątkowych razach narkoza chloroformowa może nam ułatwić zadanie.

Pęknięcie błony bębenkowej.

Unikać wszelkiego lokalnego leczenia, ucho należy zatykać watą, by jamę bębenkową chronić od wpływów zewnętrznych.

Catarrhus acutus.

Leczenie symptomatyczne, zapuszczanie Cocainy ogrzanej 20/0, ucho zatykać watą, w przypadkach bólów podawać wewnętrznie Morphium, Natr. bromatum. Gdy miną objawy ostre, stosować przedmuchiwania sposobem Politzera, wystrzegać się tychże przy sprawie ostrej. Przy znacznych objawach zapalnych paracenteza.

Catarrhus serosus.

W postaciach z niewielkim exudatem zabieg Politzera powtarzany codziennie zazwyczaj wystarcza, przy mocnym exudacie paracenteza z następnym przedmuchaniem ucha.

Catarrhus chron.

zwykły, leczyć przedmuchiwaniem ucha, za pomocą kateteru, przy niemiłych sensacjach w uchu, nieźle robią wdmuchiwanie par z eteru octowego; w formie plastycznej stosować możemy również katetyzowanie lub próbować wstrzykiwań przez kateter z roztworu:

806. *Natrii bicarb.* 0·5,
Aqu. dest. 10·00,
Glycer. puri 2·00.

lub z 20/0 roztworem Pilokarpiny 5—6 kropli.

Otitis media acuta suppurat.

Leczenie w początku choroby i przed przebicciem błony bębenkowej, jak przy ostrym katarze, gdy błona bębenkowa jest znacznie wypukłona, zielonawo zabarwiona, chory ma silne bóle, gorączkuje, należy przyspieszyć samoistne przebiccie, wykonując paracentezę. Po tejże, względnie po samoistnej perforacji, ucho lekko przestrzykiwać 2 r. dziennie lub nawet co godzinę, zaletnie od sekrecyi, stosować Politzera. Przy bolesności wyrostka sutkowego, okłady lodowe; w przypadkach ropienia w wyrostku trepanacja.

Otitis media chronica.

Przy znacznym ropieniu częste przestrzykiwania ucha zwykłą wodą ciepłą i zakładanie następować waty; w ropieniu bardzo obfitym należy użyć przestrzykiwań przez kateter, co oddaje bardzo dobre usługi. Gdyby wpływ z ucha był cuchnącem, najlepiej jeszcze używać roztworu kali hypermanganicy 0·50:100·0 W przypadkach, gdyby to ropienie było podtrzymywane przez caries kostek słuchowych, granulacyi w uchu wewn., nagromadzenie się mas żółciolaj-

kowych, te należy usunąć w postaciach zaś ropienia z atyku przestrzykiwania tegoż kaniulą Hartmana.

Przy ropieniu nieznaczem po wystrzykaniu ucha i dokładnem osuszeniu, stosować zadmuchiwanie miążkiego kwasu borowego, dalej zapuszczania

807. *Acid. borici 0·60,*

Glycerini

Aqu. dest. āā. 10·00.

DS. Krople do ucha,

Zinci sulfur. 0·20 na 20·0 Aquae dest., lub Zinci sozo-jodolici 0·4—0·6:20·0 dodając odpowiednio 1·00—3·00 Spir. vini rectific. lub bez tegoż, dalej Natrum tetraboricum w roztworze od 4—20%; zresztą chronienie ucha od wpływów zewnętrznych, przez noszenie ciągłe waty w uszach.

Surdomiditas acquisita.

Próbować wstrzykiwań podskórnych pilokarpiny po 4—10 kropli z 2% roztworu.

808. *Pilocarp. mur. 0·20,*

Aqu. dest. 10·00.

DS. Do wstrzykiwań podskórnych;

przy leczeniu ambulatoryjnym, należy chorego tak długo zatrzymać, póki nie ustaną objawy działania pilokarpiny.

W przypadkach nieżyłtów chronicznych ucha środkowego zwłaszcza jego postaci surowiczej, niemniej w ogóle przy upośledzeniu słuchu u dzieci i ludzi młodych, zawsze zbadać należy jamę nosowo-gardłową; przy obecności wyrostki adenoidalnych usunięcie tychże.

Dr Aleksander Baurowicz.

VIII. CHOROBY ZĘBÓW.

Pielęgnowanie zębów

powinno się zaczynać od zębów mlecznych. Małe otwory należy wypełniać cementami lub gutaperką. Wyrwanie powinno być na ostatnim planie, ze względu na późniejsze uzębienie stałe. Dzieciom należy podawać płukania dla odwietrzenia jamy ust, najlepiej kwas borowy w roztworze wodnym 3:100; starszym polecić czyszczenie szczoteczką, której czystość powinna być wzorową. Nie wystarcza bynajmniej szczotkę po oczyszczeniu zębów zmaczać w wodzie, otrześć i rzucić na umywalnię wraz z masą mikroorganizmów, które się z ust zbiera. Tym sposobem czyszcząc po raz drugi, znowu

wciera się zapasy zgniłej miazgi pozostałej z dnia poprzedniego. Szczoteczkę należy przedewszystkiem często zmieniać, przed i po użyciu w jakimkolwiek płynie odwietrzającym wymyć i wymoczyć czas dłuższy, tak, aby mieć przekonanie, że ona nie zanieczyści, ale oczyścić jamę ust może. Najlepiej wymywać w sublimacie 1:2000 lub 5% karbolu, a przed samem użyciem opłukać w 3% wodzie borowej. Czyszczenie zębów winno odbywać się głównie wieczorem, by przez noc nie zostawiać resztek pokarmów w ząbkach międzyzębowych. Częste płukanie środkami odwietrzającymi, szczególnie po każdym jedzeniu, ma bardzo wiele ko-

rzystnego wpływu na utrzymanie w zdrowym stanie uzeblenia.

Szczególniej uważać należy na uzębienie u osób, których odmienny stan fizyologiczny, zmiany patologiczne, lub zatrudnienie dają powód do szybko rozwijającej się pruchnicy. Takim stanem jest cięża, choroby gorączkowe, moczówka cukrowa, zmiany w krwi, kiła, a raczej leczenie rtęcią, choroby dziąseł. Z zatrudnień pruchnica powstaje u ludzi mających dużo do czynienia z pyłem mąki lub cukru, więc u piekarzy, młynarzy i cukierników. U osób, które noszą zęby sztuczne na płytach bądźto kauczukowych, bądź metalowych, prócz pilnego przestrzegania czystości w jamie ust, pilną należy zwracać uwagę na samą płytę i staranne jej oczyszczenie przynajmniej raz dziennie.

Pasty:

- 809.** *Sapon. med.* 30·00,
Calcar. carb. praec. 10·00.
Olei caryophyllor. 1·00.
M. Leni calore affunde in va-
salbum, fiat refrigerando
sapo aequalis.

- 810.** *Saponis med.* 20·00,
Carmin. 0·10,
 solve in
Spirit. vini 15·00,
 adde
Myrrhae pulv. 1·00,
Ol. menth. pip. 2·00,
Calcar. carb. praecip. 40·00,
m. c. Glycerini 4·00.
ut fiat massa cons. sap.

- 811.** *Pulv. Rhizom. Iridis*
Magnes. carb.
Sapon. medic.
Talci āā. 7·00,
Olei menth. pip. 0·50.
Mucil. Gumm. arab. q. s. ut
fiat sapo dentifr.

Proszki:

- 812.** *Magnes. carb.*
Lapid. caecror. āā. 8'00,
Rad. irid. florent. 4'00.
M. f. Pulv. subtiliss.
- 813.** *Calcar. carb. praec. 30'00,*
Sapon. medic. 2'00,
Ol. menth. pip. 0'30.
M. f. p.
- 814.** *Calar. carb. praec. 120'00,*
Rhizom. Irid. flor. 60'00,
Oss. Sepiae pulv. 30'00,
Sacchar. albi 30'00,
Natr. bicarbon. 15'00,
Ol. Rosar. 0'50.
M. f. p. dent.

Płukania:

- 815.** *Tinct. Cinnam.* 60·00,
Tinct. Catechu 20·00,
Spirit. vini dil. 100·00,
Vanillae sacch. 10·00,
Olei flor. Aurantii
Olei rosarum āā. 0·10,
Olei menth. pip. 0·50.
Misce, seponē et filtra.
S. Łyżeczkę do szklanki wody.
- 816.** *Thymol* 0·25,
Acid. benzoici 3·00,
Tinct. Eucalypt. 15·00,
Alcoh. absol. 100·00,
Olei Gaultheriae 1·00.
MS. Łyżeczkę do szklanki
wody.

Nieregularne ustawienie.

Usunąć ząb przeszkadzający, szczególnie zadługo pozostające zęby mleczne, lub ich resztki.

polecić częste napychanie ręką zęba po za szeregiem stojącego. W razie znaczniejszych nieregularności w ustawieniu, założenie odpowiedniej maszynyki.

Pruchnica zębów.

Jamki z pruchnicy powstałe pilnie wyszukiwać i takowe po dokładnem oczyszczeniu z rozmięklej dentyny, wypełniać gutaperką, cementami, amalgamami, złotem lub platyną.

Pulpitis.

Jamę w zębie oczyścić i wprowadzić na wacie którykolwiek z niżej podanych środków:

818. *Acid. carbol.* 5'00,
Cocain. muriat. 1'00.

819. *Acid. arsenic.* 1'00,
Morphii muriat.
Creosoti aa. 3'00.

820. *Acid. arsenic.*
Morph. puri aa. 2'00,
Spirit. menth. pip. q. s.
ut fiat massa mollis.

821. *Kali caustici* 5'00,
Calcar. ust. 6'00,
Alcohol. rectif. q. s. ut fiat
pasta.

Następnie należy wypełnić jamkę cementem, gutaperką, mastyksem (plomba żywiczna), a gdy i tego braknie, pokryć wate włożoną kawałeczkiem czyścigo wosku.

Periostitis.

W początkach zapalenia oczyścić jamkę, uczynić otwór do pulpy, wyczyścić kanalik, działając posmarować nalewką jodową, naciąć w kilku miejscach, zastosować okład wysychający na twarz. Skoro utworzył się już ropień, takowy naciąć, wytamponować gazą jodoformową,

a od strony zęba oczyszczać wnętrze korzenia tak długo, dopóki objawy zapalne nie ustąpią, a ranka po ropieniu w zupełności się nie zagoi. Skoro to nastąpi, przystąpić można do zaplombowania zęba. Tam gdzie zapalenie okostnej za daleko jest posunięte, gdzie zachodzi obawa przebiccia ropnia na zewnątrz, lub też oczyszczenie kanału korzenia ze względu na dostęp jest niemożliwe, nie należy ociągać się z wyrwaniem zęba, gdyż czekaniem przy stosowaniu półśrodków, jak kataplastmów i płukanek etc. można rychło doprowadzić do przebiccia ropnia na zewnątrz. Skoro takowy już powstał, leczenie należy rozpocząć od wyjęcia zęba i usunięcia obumarłych kostek, jeśli takowe się znajdują. Sama zaś przetoka prawie bez żadnej terapii rychło się zagoi.

Zęby sztuczne

powinny odpowiadać następującym warunkom: 1) Powinny być tak osadzone, aby o ile możliwości zęby w ustach będące przez klamry lub zęba sztucznego nie były uszkodzone. 2) Płyta nie powinna poruszać się przy jedzeniu. 3) Ani pod płytę ani w jakikolwiek załek miazga pokarmowa nie powinna zachodzić. 4) Artykulacja zębów sztucznych powinna być tak ścisła, aby wszystkie możliwe ruchy do gryzienia potrzebne były wygodne i możliwe. 5) Kolor zębów, działających sztucznie, jeśli takowego potrzeba, muszą być tak dobrane i przystosowane, aby przejścia między tem co sztuczne a tem co naturalne rozpoznać nie można.

Dr Wincenty Łepkowski.

IX. KOSMETYKI.

Pachnidła.

- Rp. *Tinct. moschi* 4,
" *ambrae* 2,
Spir. rosar. 1.
Rp. *Ol. Patchuli* 5,
Aq. rosar. 1,
Alcohol 120.
Rp. *Ol. lavend. angl.* 23,
Aq. rosar. 55,
Alcohol 680.
Rp. *Essent. rosar.* 56,
" *fl. aur.*
" *acaciae* āā. 28,
Tinct. vanillae 11,
Ol. caryophyl. 1.
Rp. *Essen. acac.* 500,
" *rosar.*
" *tuberos.*
Tinct. irid. āā. 250.
Ol. amygd. amar. aeth. gtt. 3.
Rp. *Spir. rosar.* 6,
Ol. pini cedr. 2,
Alcohol 32.

Octy toaletowe.

- Rp. *Ac. acet. glaciale* 600,
Camphor. 60,
Ol. Caryophyl. 2,
Ol. cinnam. 1,
Ol. lavend. 0·5.
Rp. *Tct. Benzoes.* 1,
Ac. acet. 4,
Aq. colon. 100.
Rp. *Ol. rosar.* 1,
Ac. acet. conc. 15.
Rp. *Bals. peruvian.* 2,
Bals. vitae Hofm. 30,

Tinct. Benz. 10,
Aq. colon. 25,
Ac. acet. 20,
Aq. destil. 40.

Sól do wężania.

- Rp. *Liq. amon. caust.* 250,
Ol. Caryophyl.
" *bergamot.* āā. 1,
" *lavand.*
" *rosmar.* āā. 2.

Proszki pachnące do bieleziny.

- Rp. *Rhis. ireos. flor.*
Acac. in pulv. rudi āā.
Rp. *Pulv. flor. lavand.* 75,
Benzoes 20,
Ol. lavand. v. Ol. rosar. 1.

Proszek do kadzenia.

- Rp. *Myrrh.* 5,
Oliban mastych. āā. 30·0,
Sacchari albi
Succini āā. 10·0,
Boli armen. 120·0,
Misce in pulv.

Do wydelikacenia skóry twarzy Cacao crème.

- Rp. *Ol. cacao liquef.* 5,
Ol. Ricini 30,
Ol. bergam. 1,
Aq. colon. 20.

Glicerin - Crème.

- Rp. *Cetac.* 6·5,
Paraffin. 50,

Ol. Amygdal. 25·0,
Aq. rosar.
Glycerin. āā. 10·0,
Ol. rosar. 0·02.

Crème de beauté.

Rp. Amygd. 15,
contus. misce c.
Aq. flor. aurant.
Aq. rosar. āā. 60,
Borac. 1,
Tinct. benz. 2.

Z wodą do umywania.

Proszek migdałowy.

Rp. Amygd. dulc. 100·0,
 „ *amar.* 20,
excort. contus. et sicc. redige
c. Amyl. Oryzae 120,
in pulv. aeq. cui adde
Borac. rhiz. Ireos āā. 5,
Ol. Bergamot.
 „ *citri* āā. 0·5.

Lac. virgineum.

Rp. Tinct. balsam. solut. 7,
Aq. rosar. 565,
¹/₂—1 łyżeczki na szkl. wody
 do mycia się.

Rp. Tinct. Benz. 4·0,
Kali carbon.
Spir. camph. āā. 1,
Aq. colon. 250,
Tinct. ambr. mosch. 0·25.

Mydła.

Rp. Sapon. in pulv. 25·0,
Natr. carb. sicc. 2·5,
Amyl. oryzae 10·0,
Pulv. rhis. ireos 5,
Mixt. odorif. 1·0.
Rp. Furfur amygdal.
Amyli
Sapon. in pulv. āā. 10,
Pulv. rhis. ireos 5,
Tinct. benzoës qs.
f. pasta in globul. form.
S. Savonette à la bergam.

Rp. Sapon. albi 1,
Alcohol 4,
Aq. naph., aq. rosar. āā. 1.
S. Mydlana esencya.

Eau athenienne.

Rp. Tinct. Quilayae 5·0,
Glycer. 30·0,
Bals. vitæ Hofm.
Aq. colon.
Tra ireos. āā. 40.
Essent. mos. c. ambr. 0·2.

Eau de beauté.

Rp. Kali carbon. 2·0,
Tra Benzoe 10·0,
Aq. rosar. 200·0.
S. 1 łyżka do szkl. wody do
umywania.

Lotio cosmetica.

Rp. Natr. borac. 2—4,
Aq. rosar. 100·0,
Tinct. benz. 1·0.

Lilionése.

Rp. Borac. 10·0,
Kali carb. 5·0,
Aq. rosar.
Aq. rubi idaei āā. 80·0,
Aq. colon. 40·0.

Olejki do włosów.

Rp. Ol. amygd. 25·0,
 „ *resed.* 10·0,
 „ *violar.* 20·0,
 „ *ros. aeth. gtt.* 1.
Rp. Tinct. cantar. 8·0,
Ol. ricini 60·0,
 „ *jasmini gtt.* 30,
 „ *neroli gtt.* 20.
S. Olejek.

Pomady.

Rp. Medul. ossis. liq. 30·0,
Ol. jasmini 5·0,
 „ *neroli gtt.* 5,
Tinct. canthar. 4·0.

Rp. *Extr. chinæ* 5·0,
Tinct. canthar. 0·5,
Ung. rosat. 50·0.

Rp. *Cantharidini* 0·06,
Aeth. acet. 8·0,
Solve leni calore
adde
Spir. vini rect. 100,
Ol. ricini 30·0,
 „ *levandul.* gtts 15.

S. Pomada do smarowania włosów co drugi dzień.

Rp. *Cerae alb.* 4·0,
Cetac. 8·0,
Liquef. misce c.
Ol. amygdal. 240·0,
Semirefr. agit. c.
Aq. rosar.
Glycerin. āā. 2·0,
Ol. rosar. gtts 2.

Rp. *Medul. ossis. liquef.* 30·0,
Extr. chinæ 2·0,
Tinct. canthar. 4·0,
Ol. bergamotti gtts 6,
Bals. peruv. 1·5.

S. Pomada.

Płyny do wzmocnienia porostu włosów.

Rp. *Ol. sinapis.* 0·70,
Spir. vini rect. 8·0,
Acet. aromat. 500·0.

S. Szczoteczką namoczoną w płynie nacierać skórę głowy.

Rp. *Sapo kalinus* 30·0,
Spir. vini aromat. 250·0.

S. Ut supra.

Jeżeli jest nadmiar wydzielania tłuszczu z głowy, obmyć ją z wieczora wodą kolońską, a z rana natrzeć olejkiem makasarowym lub migdałowym.

Na piegi.

Rp. *Kali carbon.* 12·0,
Natri chlor. 8·0,
Aq. rosar. 250·0,
Aq. flor. aur. 60·0.

S. Do obmywania twarzy.

Rp. *Tinct. benzoici* 8·0,
Acid. nitrici
 „ *hydrochl. āā.* gtts 20,
Aq. rosar. 120·0.

S. Do obmywania twarzy.

Rp. *Boraci* 4·0,
Aq. dest. 15·0,
Glycerini 30·0.

S. Do nacierania twarzy.

Rp. *Hydr. bichlor. corr.* 0·30,
Aq. dest. 30·0.

S. Na 2—3 godzin przykładac na płatku.

W łupieżu i świerzbie głowy.

Rp. *Hydrat. chlor.* 5·0,
Aq. dest. 250·0.

S. Na ciepło gąbką nacierać głowę.

Do mycia rąk dla wyde-likacenia skóry.

Rp. *Furfuris amygd.* 30·0,
Saponis hisp. 8·0,
Rad. hellenii
rad. irid. florent.
Natr. carbon. dep. āā. 4·0,
Ol. lavendulae gtts 12.
Mf. pulvis subtilissimus.

Rp. *Amygd. amar. excort.*
subtillis. tritarum 30·0,
Benzoes pulv.
Gm. mimosae
Boracis venetae āā. 8·0,
Rad. irid. flor. 60·0.
Mf. pulv.

ROZBIÓR CHEMICZNY MOCZU.

A. Badanie fizycznych własności.

Własność	Zmiany jakim ulega	Przyczyna
Barwa	winowo-żółta; zmienia się na: $\left\{ \begin{array}{l} \text{jasno-słomkową} \\ \text{cisawo-win.-żółtą} \\ \text{krwawo-czerwona} \\ \text{pomarańcz.-żółtą} \\ \text{cisawo-czerwonawą} \\ \text{brunatną} \end{array} \right\}$	nadmierna ilość wody Urobilina barwik krwi barwiki żółci kwas chryzofanowy kwas karbolowy
Oddziaływanie	kwaśne; może być alkaliczne (obojętne): przy odparowaniu staje się: $\left\{ \begin{array}{l} \text{kwaśne} \\ \text{silniej} \\ \text{alkaliczne} \end{array} \right\}$	węglan amonowy węglan sodowy
Ciężar gątowny	od 1,015—1,023; zwiększa się skutkiem	wieksz. ilości: moczniaka cukru
Osad	skąpy obłoczki z: $\left\{ \begin{array}{l} \text{przybłonków} \\ \text{śluzu w małej} \\ \text{ilości} \end{array} \right\}$	(patrz C.)

B. Badanie chemicznych własności.

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Urochrom.	Do $\frac{1}{4}$ kieliszka kwasu siarkowego zgęszczonego nalewa się moczu odrazu	zabarwienie: różowo-brunatne brunatne brunatno-czarne
Indoxyl Uroxanty- na, Indykan	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka kwasu chlorowodowego zgęszczonego nalewa się moczu kroplami	zabarwienie: żółtawo-różowe niebiesko-fioletowe ciemno-niebieskie
Mocznik	Oznaczenie ilościowe: w moczu zgęszcz. po dolaniu kw. azotow. zgęszczon.	osad krystaliczny: azotanu mocznika
Kwas mo- czowy	Oznaczenie ilościowe: w moczu zawierającym więcej kw. moczowego, kw. azotowy zgęszczony	daje smugę: białą, rozlaną i wysoko umieszczoną
Chlorki	Zakwasza się kw. azotowym i dodaje krople Azotanu srebrowego (1:8)	osad: biały serowaty kaskowaty obłoczkowaty
Fosforany ziem.	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się kilka kropli Amoniaku zgęszczonego	osad: krystaliczny + obfity
Fosforany potasowców	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się: Siarkanu magnowo-amonowego póki tworzy się	osad: żółtawy + obfity
Siarkany	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się: Chlorku baru z kw. chlorowodowym póki tworzy się	osad: b. w. ciężki obfity

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Białko	1) Do $2\frac{1}{3}$ kieliszka moczu nalewa się po ścianie kwasu azotowego zgęszczonego 2) Po zagotowaniu i dodaniu kw. octow. rozcieńcz.	1) smuga biała + gruba na granicy warstw. 2) osad w kw. octowym nierozpuszczalny
Cukier	1) Po zagotowaniu z równą objętością zgęszcz. ługu potasow. 2) " " z ługiem potas. i siarkan. miedzi	1) zabarwienie: żółto-brunatne brunatne 2) osad czerwony
Barwiki żółte	Do $1\frac{1}{2}$ kieliszka kwasu chlorowod. zgęszcz. nalewa się moczu a następnie kw. azotowego kilka kropli na dno	pierścienie barwne zwłaszcza zielony
Urobilina	Po dodaniu Amoniak i Chlorku cynku (uwzględnia się zabarw. moczu a niekiedy ubarwienie moczanów)	zabarwienie: żółte z zieloną fluorescencją
Barwik krwi Haemooxy-Methae-mo globino	Po zagotowaniu z ługiem potasowym (oddziaływ. dla białka, badan. mikroskop. próba spektral)	osad fosforanów czerwono zabarwiony
Fosforan. wapn. zas.	Po zagotowaniu	osad w kw. węglowym rozpuszczalny, po potwórn. zagotowaniu się wydziela
Węglan amonu	Przy zagotowaniu uchodzi Amoniak i	barwi zwilżony papier lakm. czerwony na niebiesko

b. n i e p r a w i d ł o w e

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Kw. chryzofanowy Senna, Rheum)	* Po dodaniu Amoniaku	zabarwienie: ognisto-czerwone
Kwas karbolowy	Obok braku lub zmniejszonej ilości siarkanów Obok barwy moczu ciemno-brunatnej	badanie przekropu za- pomocą: chlorku żelaz- zow. odczynnika Mil- lona
Naftalina	Do paru kropli moczu dodaje się kilka kropli kwasu siarkowego zgęszczonego	zabarwienie: zielone
Balsam ko- paliwowy	1) Po zagotowaniu z kwasem chlorowodowym 2) Po dodaniu kw. azotowego (jak przy białku)	1) zabarw. czerwone 2) smuga różowa nie- co wyżej umieszczona
Jodek potasu	1) Po dodaniu kwasu azotowego 2) Z kleikiem skrobi i kwasem azotowym	1) zabarwienie bruna- tne i woń jodu 2) zabarw. niebieskie

C. Badanie osadu drobnowidowe i chemiczne.

Składniki	K s z t a ł t	Własności chemiczne
Ciałka ropy	o charakterystycznych konturach	z ług. potas. lub Amoniakiem zmieniają się w masę galaretową
Ciałka krwi	o charakterystycznych konturach	z kw. octow. lodowatym i chlor. sodu dają: Haemine (kryształki Teichmanna)
Ciałka śluzu	małe ziarniste komórki o wyraźnych konturach	
Przybłonki	okrągłe i owalne drobne (kanaliki nerek) kształtu gruszkowatego (miednicz. nerk.) komórki przybl.: okrągłe wieloboczne, podłużne (pęcherz i moczowody) kuliste, ziarniste (cewka mocz. i dno pęch)	
Walcзки	z kanalików nerek kształtu walcowatego ziarniste przeźroczyste krwawe przybłonkowe woskowe	

Składniki	K s z t a ł t	Własności chemiczne
Kwas moczowy	kryształy pozrastane lub oddzielne \pm żółtawo zabarwione kształtu ośłek, rombów lub maczugowate	
Moczan sodow.-potas.	masa ziarnista bezpostaciowa	w ługu potasowym lub Amoniak rozpuszczalne
Moczan amonowy	kryształy kuliste opatrzone czasem kolcami	
Szcawian wapniowy	kryształki drobne kształtu kopert listowych	w kw. octowym nie-rozpuszczalne
Fosforan magn.-amonowy	kryształy duże kształtu trumienkowego	w kwasie octowym rozpuszczalne:
Fosforan wapniowy zasadowy	masa drobno-ziarnista	w ługu potas. lub amoniaku nie zmieniają się
Kulki tłuszczu	ciałka okrągłe silnie światło łamiące	w eterze rozpuszczalne
Mikroorganizmy	laseczniki, kokki, drożdże, sarcina	
Plemniki	nitki dość proste na jednym końcu zagięte, na drugim opatrzone główką	<i>Dr. Opieński.</i>

Otrucia ostre i sposób ratowania w tychże.

Trucizna	Objawy	Odtrutki
Aconitinum. Tojad mor- downik (fo- lia, flores, radix, Tinct., Extract).	Pieczenie języka, dławie- nie mrowienie, drętwienie kończyn, ślinotok, wymio- ty, tętn słabe, obniżenie ciepłoty ciała, zimne poty, niepokój, rozszerzenie źre- nie, zabójcza dawka 0'003 —0'004.	Leki wymiotne, pompa żołądkowa, kawa, her- bata, wino, kamfora, Acid. tannic. 4'0 Aq. d. 200'0. Syr. 20'0. S. Co. 5 min. łyżkę. Sztuczna wentylacja płuc.
Acidum car- bolicum.	Wymioty, ból w epigastri- um, zapad, śpiączka. Tru- jąca dawka od 5'0.	Emetica, pompa żołąd. Calcaria saccharata, mleko, kleiki, lód. Rp. Magnes. ust. in Aqua 200'0. S. Połowę na raz, później co 1/2 g. łyżkę. Lód, magnezyna, kreda, soda we wodzie, dużo płynów, woda mydla- na, kleiki.
Acidum hy- drochl. „ nitricum. „ sulphur.	Obrzmienie bł. śl. ust, pa- lenie i pieczenie przew. od ust do żołądka, boleści, wymioty kwaśne fusowate, upadek sił.	Środki wymiotne, sztu- czne oddychanie, oble- wania zimną wodą, środki drażniące skórę.
Acidum hy- drocyanic. kwas sino- wodowy kw. pruski Aq. lauroc.	Wdech krótki, wydech zna- cznie dłuższy, drgawki, po- rażenie oddechania. Mdło- ści, nieprzytomność.	Środki wymiotne, sztu- czne oddychanie, oble- wania zimną wodą, środki drażniące skórę.
Aether	Śpiączka, znieczulenie, u- stawianie oddechu i tętna. Przy wydechu czuć eter.	Sztuczne oddychanie, (faradyzacja n. phre- nic.), zbryzganie wo- dą, iniekct. Strychniny (0'001), gorczycznik na okolice serca.
Alkalia Lug potas. i sodowy, amoniak żrący, sal- miak.	Nadżarcia ust, ból silny pa- lący w przełyku, wymio- ciny składają się z rozło- żonej krwi i oddział. alka- licznie, kolka często krwa- we stolce.	Mleko, rozcieńczony kwas cytrynowy, pi- gułki lodowe, gdy stol- ce krwawe, lewatywy z wody, z lodu.
Alkohol	Odurzenia, utrata przyto- mności, wymioty, zwięźnięcie żrenie, zapad, lepka zimna skóra, piana z ust, woń wysoką z ust, tętno małe, powolne.	Zlewania zimną wodą, lód na głowę, ręce i nogi zanurzyć w go- rącej wodzie, synapizm na kark, lewatywy z zimnej wody.

Trucizna	O b j a w y	O d t r u t k i
Antimonium Tart. emetic.	Gwałtowne wymioty, osłabienie akcyi serca i osłabienie ogólne, ból palący w żołądku i kiszka, zimny pot, później rozwolnienie, pragnienie, drgawki.	Pompa żołąd., pigułki lodowe, mleko, Tanina, Opium.
Anilinum	Nudności, ból głowy, trudne oddychanie, senność, utrata przytomności, znieczulenie skóry. Sina barwa bł. śluz. i skóry, ciepłota niska, tętno wolne.	Pompa żołąd., środki wymiotne, białko, sztuczne oddychanie, leki podniecające, magnez.
Argentum nitricum	Wymioty białawe, czernieją na powietrzu, oznaki zapalenia żołądka i jelit.	Sól kuchenna, białko, mleko.
Arszenik i jego przetwory.	Ból w okolicy żołądka, nudności, wymioty, biegunka, skóra zimna, przy uczuciu palania, pragnienie. Tętno małe, szybkie, oddech przyspieszony mozołny. Czasami drgawki. Po arsenowodorze mocz krwawy, dawka zabójcza 0.1.	Środki wymiot., (zinc. sulph.) ferr. hydric. in Aqua, Magnezya, Antidot. arsenici.
Atropinum Radix, folia, baccæ bellad. Szalej.	Suchość i drapanie w gardle, chrypka, nudności, trudność mówienia i połykania, pragnienie, ból i zawrót głowy, złudzenia i omamy, rozszerzenie źrenic, parcie na mocz, osłabienie serca, szal, drgawki, tężec, podwójne widzenie.	Pompa żołąd., środki wym., tanina, kali jodat. morfina, opium, wyskok. Rp. Pilocarp. mur. 0.05, Aq. dest. 5.00 do inj. Zimne okłady na głowę.
Baryum zob. Plumbum Bromum zob. Jodum Camphora	Popęd do ruchów, gonitwa myśli, drżenie, drgawki.	Środki wym., oblewanie zimną wodą.
Cantharides	Ból w ustach, przełyku, żołądku, pęcherze w jamie ust, pragnienie, nudności, kurcze przełykowe, mocz krwawy, podrażnienie części płciowych, ból głowy, odurzenie, drgawki.	Pompa żołąd., klejki napoje z lodem, kamfora, Opium. Unikać tłuszczów!

Trucizna	Objawy	Odrutki
Chloral hydratum	Senność, zwięźnienie źrenic, zwolnione oddychanie i tętno, ciepłota obniżona.	Środki drażniące skórę inj. Strychn., Cocainy, ochranianie przed oziębieniem ciała.
Chloroform	Senność, zwięźnienie źrenic, obniżenie respiracyi i akcyi serca, obniżenie temperatury, woń chloroformowa z przewodu oddch., porażenie oddechania.	Sztuczne doddychanie, inj. Strychniny, zlewanie zimną wodą, środki drażniące skórę.
Chlorum	Skurecz głosi, krwioplucie.	Świeże powietrze, wdychanie amoniaku i ciepłej pary.
Cocainum	Tętno zmienne, powolne to szybkie, duszność, pobudzenie, drgawki.	Wdychanie amylnitritu, ciepłe kąpiele, morfina.
Codeinum z. Morfine		
Coffeinum	Niepokój, odurzenie, zawrót głowy, drżaczka, kołatanie serca.	Pompa żołąd., środki wymiotne, kali jodat., sztuczne oddychanie, Morphinum.
Colhicin Semen.	Silne bóle brzucha, wymioty, biegunka, pragnienie, tętno zwolnione, mąjaczanie, drgawki.	Środki wym., Tanina, Opium, eter, kamfora, wino.
Colch. Zimowit		
Cuprum grynszpan	Wymioty zieloną treścią, kolka, stolce krwawe, drgawki, oddech utrudniony, nieregularne tętno.	Białko z wodą, mleko, lewatywy ze skrobi, purgantia, wogóle środki osłaniające.
Digitalis	Wymioty, często biegunka, tętno zwolnione, następnie nieregularne, rozszerzenie źrenic, osłabienie mięśniowe, zapad, drgawki.	Środki wymiotne, wino, kamfora, Liquor ammon. anis, synapism.
Ergotinum seal. corn. sporysz	Slinotok, nudności, wymioty, biegunka, ból głowy, drętwienie, spazm, zatrzymanie moczu, zapad.	Emetica. opium, amylnitrit, chloralhydrat, eter, wino, kawa.
Hydrargyr. Sublimat	Smak metaliczny, ból w ustach, przełyku i żołądka, wymioty, biegunka, czasem krwawa, zatrzymanie moczu, zapad.	Pompa żołąd., mleko, białko.
Hyoscyamus z. Atropin		

Trucizna	Objawy	Odrutki
Jodum	Ból w gardle, przelyku i brzuchu, wymioty, zatrzymanie moczu, osłabienie, tętno słabnie.	Kleiki z mąki pszennej, białko, magnezja, sól, środki drażniące skórę.
Kalium chloricum	Objawy ze strony żołądka i jelit, upadek sił, zatrzymanie moczu, sinica, haematurya.	Pompa żołądk., środki wym., środki podniecające, moczo-pędne, pilocarpin, transfuzja krwi lub wlewianie śródżylnie soli kuchen.
Kreosotum	Zob. kw. karbol.	Pompa żołądk., białko-
Morphinum	Zapad, upośledzenie czucia, <i>silne zwężenie źrenic</i> , skóra blada, głowa gorąca, oddechanie zwolnione, zatrzymanie moczu, pod koniec tężec lub drgawki.	Pompa żołądk., środki wym. z wyjątkiem tart. emetici, sztuczne oddychanie, tanina, sól na głowę; ręce i nogi do gorącej wody, synapismy, lewatywy z octem, mocna kawa, Coffeina, Atropina (0.01—10.00 Aq. do inj.).
Nicotinum	Uczucie drapania i palenia ustach i przelyku, biegunka z silnem parciem, wymioty, bladeść skóry, tętno wolniej, kurcz mięśni oddechowy, z początku zwężenie, później rozszerzenie źrenic, tężec, zapad.	Pompa żołąd., kali jod., Tanina, lewatywy z octu, sztuczne oddychanie, cały aparat środków pobudzających.
Opium vide Morphium		
Petroleum	Zaburzenia żołądkowo-kiszkowe, zadrażnienie nerek, ból głowy, senność, zapad.	Pompa żołądk., Emetica, sztuczne oddychanie. Excitantia.
Phosphorus	Ból w dołku podsercowym i wymioty miazgą, świecąca w ciemności, mająca woń fosforu. Gastroenteritis, żółtaczka, bolesność w okolicy wątroby i powiększ. tejże. Lekka gorączka, później wymioty krwawe, osłabienie serca, krwotoki z nosa, jelit, macicy, śpiączka, drgawki, moc krwawy.	Pompa żołąd., purgantia, środki wymiotne: Cupr. sulphur. 1:0:40:0 Aq. dest. S. na raz połowę, po 5 minut. jeżeli trzeba, resztę. Ol. terebinth., crudum (ozonizatum), co 1/4 godz. po 10 kropli w kleiku. Unikać tłuszczów!

Trucizna	Objawy	Odrutki
Plumbum octan. oł.	Palenie w gardle i żołąd- ku, wymioty, biegunki, mo- rzysko, następnie w chro- nicznych przypadkach za- parcie stolca, zawrót głowy, mdłości, porażenia, bóle, przypadki mózgowce.	Emetica, Purgantia, kwas siarkowy roz- cieńczony, siarkan po- tasowy. W braku od- trutek: mleko, białko. Po odtrutkach znowu emetica i purgant, pó- źniej opium i ciepłe kapiela.
Santoninum	Wymioty, odurzenie, żółto- widzenie, upośledzenie res- piracyi, drgawki, (badanie moczem rozstrzygnąć może).	Pompa żołąd., emetica, Purgantia, sztuczne od- dychanie, przy drgaw- kach Chloral.
Strychninum wronie oko	Kurcze, Paraestesia wszy- stkich zmysłów, uczucie cią- gnięcia w mięśniach, karku, tężec, szczękocisk, opisto- thonus, sinica, oddech prze- rywany, tętno małe. Przy- tomność zachowana. Dawka trująca 0.015—0.03.	Pompa żołąd., Emeti- ca, Chloralhydr., wzie- wanie chloroform., mor- fina (inj.), czarna kawa.
Sublimat v. hydrgr. Trucizna kiszkowa zepsute kiszki, kiełbasy, wędliny	W kilka lub kilkanaście godz. po spożyciu mdłości, ból w okolicy żołądka, mo- rzysko, Gastroenteritis, su- chość w ustach, trudność w połykaniu, tętno przyspie- szone, upośledzenie wzro- ku, podwójne widzenie.	Emetica, Purgantia, Calomel, lewatywy, pó- źniej: Rp. Aether de- pur. 2.0 Aq. dest. 150.0, Trae laud. gtts. 10. Syr. 20.0. S. Co 1/2 g. łyżkę.
Ukąszenie jadowitych węzów	Rozwijające się obrzmie- nie w okolicy rany, skóra sina, ziębnienie i ocięża- łość, osłabienie, drżenie, mdłości, tętno ledwie yw- czuwalne, śpiączka, drgaw- ki, (krwotoki z nosa, ust, żołądka).	Wypalenie rany rozp. żelazem, c. kali caust. tic., wyssanie rany Przewiązanie powyżej rany, wymycie octem, amoniakiem. Na w e- wnątrz excitantia: Li- quor ammon. anis: kamfora, wino, cognac. Usunięcie chorego z at- mosfery zatrutej. Sztu- czne oddychanie, upust krwi. Transfusja.
Gaz świetlny Tlenek węgla	Ból głowy, odurzenie, tę- tnienie naczyń szyjnych, wymioty i śpiączka, zaczer- wienienie powłok, drgawki.	

Tablica brzemienności.

Ostatnia regularność		Dzień porodu		Ostatnia regularność		Dzień porodu	
Styczeń	1	Październ.	8	Lipiec	5	Kwiecień	12
"	5	"	12	"	10	"	16
"	10	"	17	"	15	"	21
"	15	"	22	"	20	"	26
"	20	"	27	"	25	Maj	1
"	25	Listopad	1	"	28	"	4
Luty	1	"	4	Sierpień	1	"	8
"	5	"	8	"	5	"	12
"	10	"	12	"	10	"	17
"	15	"	22	"	15	"	22
"	20	"	27	"	20	"	27
"	25	Grudzień	1	"	25	Czerwiec	1
Marzec	1	"	6	"	28	"	4
"	5	"	10	Wrzesień	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Styczeń	2	"	25	Lipiec	2
Kwiecień	1	"	6	"	28	"	5
"	5	"	10	Październ.	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Luty	2	"	25	Sierpień	1
Maj	1	"	5	"	28	"	4
"	5	"	9	Listopad	1	"	8
"	10	"	14	"	5	"	12
"	15	"	19	"	10	"	17
"	20	"	24	"	15	"	22
"	25	Marzec	1	"	20	"	27
"	28	"	4	"	25	Wrzesień	1
Czerwiec	1	"	8	"	28	"	4
"	5	"	12	Grudzień	1	"	7
"	10	"	17	"	5	"	11
"	15	"	22	"	10	"	16
"	20	"	27	"	15	"	21
"	25	Kwiecień	1	"	20	"	26
"	28	"	4	"	25	Październ.	1
Lipiec	1	"	8	"	28	"	4

Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich.

Na kąpiel pełną (po szyję) dla osoby dorosłej, liczy się 200—300 litrów płynu. 50—200 litrów na kąpiel dla dzieci. Na kąpiel sięgająca tylko do dołka podsercowego 100—150 litrów; kąpiel nasiadowa 20—30 litrów, na kąpiel na nogi 10 litrów.

Za zimną uważa się kąpiel do				+ 15° R.
"	chłodną	"	"	+ 15 do 22° R.
"	letnią	"	"	+ 22 " 27° R.
"	cieplą	"	"	+ 27 " 32° R.
"	gorącą	"	"	+ 32° R.

K. gorczyczne. Na kąpiel pełną daje się 100—250·0 grubo po-tłuczonej gorczycy. Do kąpeli miejscowej np. na nogi 50—120·00.

K. igliwowe. Ponieważ przez wygotowanie igliwia niemożna otrzymać eterycznych, a właśnie głównie działających pier-wiastków, stósowniej przeto dawać ekstraktu. (Extr. turionum pini sylv. ad balnea, Nitribitta w Krynicy) 150—500 gram.

K. jodowe. (Wanna drewniana). Kali jodati 50—100·0 na ką-piel pełną; 5·0—10·0 na litr wody. — Jodi 10·0 kali jodati 20·0 rozpuścić w kilogr. wody i dodać do kąpeli, przyczem należy tak osłonić wannę, aby pacjent nie wdychał parującego jodu.

K. klejowe. 1—2 funtów Colla animalis, rozpuszczonego we wrzącej wodzie.

K. z kory dębowej lub z kory wierzby, kasztana itp. odwar z 1 funta w 2 litrach wody, lub też (ponieważ tutaj chodzi o środki ściągające) można użyć Taniny (acid. tannicum) 20—100 grm. rozpuszczonej w szklance wody.

K. z liści orzecha włoskiego. (Fol. Inglandis) Dekokt z 1—2 fnt.

K. ługowe. Dwa do ośmiu funtów popiołu bukowego lub dębowego, gotuje się z kilkoma litrami wody, lub też potażu ($\frac{1}{4}$ —1 funta, na kąpiel pełną, dla dzieci połowę tej ilości).

K. mrówczane. Napar (Infusum) z 300·0—700·0 formicy rufa.

K. mydlane. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ funta pokrajanego mydła na pełną kąpiel (Sapo domesticus, Sapo aromatic. lub Sapo kalinus).

K. z otrąb. 1—3 funtów otrąb pszenicznych odgotowanych w woręczku w 4—6 litrach wody.

K. siarczane. 50·0—2000·0 Kalium sulphuratum ad balneum, w celu wzmocnienia działania dodaje się 15—20·0 Acidum sul-phur. crud.; aby jednak złagodzić, dodać można Colla animalis $\frac{1}{2}$ funta.

Bogatszym można zapisać:

Rp. Calcii sulphurati crudi 20·00,

Natri chlorati 7·50,

Extr. Saponar. 5·00,

F. c. Aq. font. o q. s. Gibulus. Dtur. tal. dos. 5.

S. Jedną kulę do kąpeli.

(Wanna drewniana, nie metalowa).

K. słodowe. Słodu jęczmiennego 4—6 funtów gotuje się z kilkomalitrami wody przez $\frac{1}{2}$ godziny, odcedza i wlewa do kąpieli.

K. słone. 3—5—15 funtów soli kuchennej lub morskiej.

K. sodowe. Natri carbon. crudi 200—500·0 na kąpiel pełną. 100—200·0 na kąpiel miejscową.

K. sublimatowe. (Tylko w wannie drewnianej) 2·50—10·0 Hydrarg. bichlor. corros. rozpuszczonego w 50—200·0 Aq. Na kąpiel miejscową tj. ręce i nogi 0·05—0·25.

K. ziołowo-aromatyczne. Napar rumianku lub mięty, korzenia tataraku, lub spec. aromatic. z 200—500·0 na 2000·0 wody, wlewa się do kąpieli, albo też dodać można: Aq. coloniens., Spir. Calami., Spir. Angelicae, Spir. Serpyll. (60·0—100·0 na dawkę). Dla dzieci połowę tych ilości.

K. żelaziste. Ferrum sulphur. siccum (50·0—200·0), Liquor ferri sesquichlorati (15·0—60·0), Tart ferratus s. globuli martiales pulv. (50—200·0), lub też do przyrządzania kąpieli żelazistej z kwasem węglowym; 1 część Ferr. sulph. sicc. (30·0), 2 części Natr. chloratum (60·0), i 3 części (90·0) Natr. bicarbon. nasypuje się warstwami do szklanki i razem wrzuca do wody (pro balneo 150·0—200·0 tej mieszaniny).

Rp. Ferri sulphur. sicci

Argillae aa. 100·00,

M. pul. d. tal. dos. 10.

S. Jeden proszek do kąpieli.

Dla dzieci wszystkich przetworów po $\frac{1}{4}$ części.

Szkodliwe połączenia leków.

1. Dając kwas solny wewnątrz, nie należy przepisywać kalomelu, bo w żołądku utworzy się sublimat.

2. Nie należy kłaść plastru merkurialnego na miejscu posmarowaniem jodem, bo wytwarza się Hydr. bijodat. rubrum, wywołujące ból i zapalenie.

3. Nie dawać do wewnątrz jodu ani bromu gdy się oko posypuje kalomelem (najwcześniej można zasypać oko kalomelem w 24 godzin po ostatniej dawce jodu).

4. Nie łączyć kali chloricum z garbnikiem, kamforą, siarką, węglem w proszkach, bo nieostrożne potarcie wywołuje eksplozję.

5. Nie łączyć kwasów z zasadami, bo tworzą się sole.

6. Nie łączyć opium z garbnikiem, bo tworzą się garbnikany nierozpuszczalne.

7. Nie łączyć Arg. nitr. z Aq. amygd. amar., bo wytworzy się sinek srebra.

Warunki przyjmowania chorych obłąkanych do zakładów publicznych lub prywatnych.

Według §. 273 ust. cyw. za obłąkanego lub głupkowatego ten tylko uznany być może, który za takiego sądownie, po dokładnem zbadaniu zachowania się jego przez wyznaczonych do tego przez sąd lekarzy, uznanym zostanie. W przypadku takim postanowienie sądu do publicznej wiadomości podane być powinno. Sąd w tym razie ustanawia kuratora (§. 269).

Zakłady dla obłąkanych są prywatne albo publiczne. Do prywatnych, zakładanych jedynie za pozwoleniem politycznej władzy krajowej, przyjmowani być mogą chorzy, tylko na podstawie świadectwa lekarskiego, potwierdzającego istniejącą chorobę umysłową. Świadectwo to musi być wystawione przez lekarza powiatowego lub gminnego miejsca pobytu chorego, lub gdyby przez innego lekarza było wystawione, musi być potwierdzone przez lekarza powiatowego lub gminnego i wygotowane najpóźniej w 14 dniu przed wniesieniem prośby o przyjęcie. Jeżeli chory był poprzednio w kuracji lekarskiej, dodana być musi historia choroby, skreślona przez lekarza ordynującego. Chorzy, których władza bezpieczeństwa z powodu zagrażającego ogółowi bezpieczeństwa do zakładu prywatnego oddać jest zniewolona, mają być przyjęci na podstawie świadectwa wystawionego przez lekarza, którym ta władza rozporządza. Lekarz kierujący zakładem ma o przyjęciu chorego w przeciągu 24 godzin donieść trybunałowi pierwszej instancyi, w którego okręgu zakład się znajduje, z prośbą o potwierdzenie odbioru doniesienia. Doniesienie to wtedy tylko ma być zaniechane, jeżeli nie ma wątpliwości, że chory jeszcze pozostaje pod władzą ojcowską. Jeżeli taki chory podczas pobytu swego w zakładzie dojdzie do 24 roku życia, należy o tem, wyszczególniając stosunki jego osobiste, donieść trybunałowi pierwszej instancyi. Tosamo ma nastąpić, jeżeli zajdą okoliczności, które pociągają za sobą zmianę osoby prawnego zastępcy, a sąd opiekuńczy lub kuratelarny zkażinąd o tych okolicznościach nie wie. Osoby umieszczone w prywatnych zakładach dla obłąkanych, które uważać należy za wyleczone, mają być z zakładu wypuszczone, po porozumieniu z temi osobami, które prosiły o przyjęcie chorego do zakładu, albo w miejsce tychże pieczę nad chorym przyjęły. Także chorzy nieuleczalni nie mogą być w zakładzie dłużej zatrzymywani, jeżeli ich wypuszczenia żądają krewni, lub ich prawni zastępcy. Chorzy niewyleczalni mogą być oddani tylko swym prawnym zastępcom, lub osobom przez tychże wskazanym. Jeżeli z zakładu będą wypuszczone osoby, które władza bezpieczeństwa oddała z powodu grożącego ogółowi niebezpieczeństwa, poprzednio o wypuszczeniu tę władzę należy zawiadomić. Taksamo należy postąpić w razie uwolnienia osób takich na próbę. O wypuszczeniu chorych wyleczonych zostających pod kuratelą należy ódnosny sąd zawiadomić.

Zakłady publiczne dla obłąkanych rządzą się własnymi statutami, które muszą być potwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych, Zakłady publiczne dla obłąkanych mają czynić doniesienia wyżej wymienione do tychże władz sądowych. Gminy a w szczególności ich organa lekarskie są obowiązane utrzymywać w naocznosci tych obłąkanych, którzy nie są umieszczeni w domach obłąkanych i czuwać nad pielegnowaniem tychże. Chorych na umyśle, którzy nie pozostają pod władzą ojcowską lub opiekuńczą, mają gminy w celu dalszego zarządzenia wskazać temu trybunałowi, do którego okręgu są wcielone. Władze sądowe są obowiązane o ustanowieniu opiekuna i kuratorów dla umysłowo chorych, znajdujących się w zakładach dla obłąkanych zawiadomić te zakłady. (Dz. p. p. z r. 1874. L. 71).

Przyjmowanie do Kulparkowa i wydalenie. (Tożsamo stosuje się i do Szpitala św. Łazarza w Krakowie). Chorych przyjmuje do zakładu dyrektor na żądanie stron lub władzy bezpieczeństwa. Aby chory mógł być przyjęty, należy dyrektorowi przedłożyć: Świadectwo władzy miejscowej z wymienieniem stosunków rodzinnych i majątkowych chorego, a także historią choroby, sporządzoną przez lekarza i poświadczoną przez fizyka powiatowego. Jeżeli oddaje władza bezpieczeństwa, to powinna wymienić fakty. Jeżeli chory ma leczyć się własnym kosztem, to należy jeszcze dołączyć pisemne zobowiązanie się tej osoby, która ma spłatę uiszczać. Chorzy winni być oddani do zakładu należycie odziani.

Dyrektor zakładu do 24 godzin powinien donieść o przyjęciu chorego trybunałowi pierwszej instancji.

O zamierzonym wydaleniu chorych wyleczonych, lub nieuleczalnych nie zagrażających publicznemu bezpieczeństwu lub obyczajności i o terminie wydalenia, powinien dyrektor zakładu zawiadomić rodzinę lub prawnego zastępcę, urząd gminy, do której chory jest przynależny, władzę opiekuńczą, jeżeli pod tą władzą zostaje i władzę bezpieczeństwa, jeżeli ona oddała chorego do zakładu ze względów policyjnych.

Przy odbieraniu chorego niewyleczonego, odbierający powinien złożyć dyrektorowi: przyzwolenie władzy opiekuńczej, przyzwolenie gminy, w której chory ma mieszkać i pisemne zobowiązanie się do dalszego pielegnowania chorego. (Dz. u. k. 1876. 15 Lutego. Nr 6).

SPIS ŚRODKÓW LEKARSKICH

officynalnych i ważniejszych nieofficynalnych
wraz z podaniem ich cen,
sposobu stosowania i dawkowania.

Środki officynalne oznaczone są *. — Czcionkami rozstrzelonemi drukowane są te leki, których najwyższe dawki nie mogą być przekroczone bez oznaczenia ich wykrzyknikiem (porów. str. 43).

Ceny wyjęte z taksy na rok 1895.

Skrócenia: *p. d.* = pro dosi; *k. r. d.* = kilka razy dnia.

×

Abri precatorii Sem. (Jequirity); Inf. 0·5—1·0:100; stos. w niekt. chorobach ócz. 1·0=4 kr.

Absinthi herba. Inf. 5·0—15·0:100 Col., Pulv. 0·5—2·0 kilka razy dnia 100·0=15 kr. — **Extr.** 0·5 d. 1·0=3 kr. — **Ol. aether.** 1—2 kropli *pro dosi* 1·0=10 kr. **Tinctura Abs.** i ***Tinct. Abs. compos.** 20—60 kropli *k. r. d.* 10·0=4 kr. **Absinthinum** 0·1—0·25 *p. d.* *k. r. d.*

Acetanildinum zob. **Antifebrinum.**

Acetalum (Diaethylacetal) Hypnotic i Anaesthaetic 8·0—12·0 *p. d.* w emulsyi i miksaturze, także w lewatywach.

Acetonum (Spir. pyroacet. depur.) 5—20 kropli *k. r. d.* aż do 5·0! *p. d.* do wziewań 0·10—1:100 aqu., także jako maść. 10·0=10 kr.

Acetphenetidinum patrz Phenacetin.

***Acetum (purum)** jako napój 100—150 na litr wody ocukrzonej; jako woda do ust lub płukanie 20·0—50·0:150·0; do zmywań, okładów, iniekcij czysty lub *aa* z wodą. 100=5.

***Acetum aromaticum** 7·0—15·0 *k. r. d.*; do miksatur 15·0—50·0:150·0; jako środek orzeźwiający, do kadzeń. 100=10 kr.

— **pyrolignosum crudum** tylko zewnętrznie, czysty lub lub 10% z wodą, do penzlowań, zmywań i t. d. 100=4.

— **rectificatum** wewn. 0·3—1·0 t. j. 10—30 kropli *k. r. d.* także w rozcieńczeniu z wodami aromatycznymi; 1:10—20 aqu. jako woda do ust lub płukanie; do okładów, zmywań. 100=12 kr.

— ***Scillae**, jako diuret i exp. w mixt. po 1·0—5·0 *p. d.* 10·0=3 kr.

***Acidum acet. concentrat** (96% kwas octowy) tylko zewn. jako środek żrący lub rubef. 10·0=4 kr.

***Acidum acet. dil.** (20–30% kw. octowy) 0·5–2·0 k. r. d.; w mixturze 5·0:20·0–150·0 zewn. jak Acetum. 100=12 kr.
— **aromat.** tylko jako pachnidło.

— **trichlorat.** Anesthetic i Hypnot., 3 razy dnia po 0·1–0·20, zewnątrz. jako środek żrący w 1–5%. 1·0=5 kr.

***Acidum arsenicosum** (Arsenicum album) 0·001 aż do 0·005 i 0·006! *p. d.*, 0·02! *pro die* w pigułkach lub rozpuszcz.; zewn. jako środek żrący w maściach, pastach po 0·10–0·30:20·0; do kąpieli i okładów 0·50–2·0 na litr; do iniekcji 0·50–1·0:100. 1·0=1 kr.

Solutio (Liquor) arsenicalis Fowleri zawiera w 100 częściach sol. 1 część acid. ars.; 2–10 krop. (0·5) *p. d.* 1·2! *pro die*; zewn. do zastrz. podsk. 1–2 krople z wodą 1:1–3. 1·0=2. — **Sol. arsen. Bietti** (Ammon arsenic. 1:500 Aqu.) w 5–10 razy większej dawce od poprzedniego, tak samo i **Sol. arsen. Pearsonii** (Natr. arsen. 1:600 aqu.). 1·0=1 kr. — **Pillulae asiaticae** skł. się z acid. arsenic., piper. nigr. i gumi arab., 1 pigułka zawiera 0·005 ars. 100 pig.=98 kr. — **Pulv. arsenic. Cosmi** (skł. się z acid. ars., Sang. dracon., Carb. anim., Cinnabaris) używ. do maści, past i w proszku etc.

Acidum aseptinicum 5% wodny roztwór boraxu w 100 cz. (3%) wody utlenionej z acidum salicyl. lub bez niego. 10·0=20 kr.

— ***benzoicum (sublimat.)** (Flores Benzoë) 0·03–0·05 *p. d.* k. r. d. jako expect.; przy polyarthrit. 0·5–1·0 co 1–3 godziny, aż do 10·0–12·0 *pro die* w proszku lub mixturze; zewn. do wziewań, opatrunków (5–10%) także do wdych. zapomocą papierosów. 1·0=5 kr.

— ***boricum** (boracieum) 0·2–1·0 *p. d.* k. r. d. aż do 5·0 *p. die* w proszkach, pigułkach i rozpuszcz.; zewn. jako zasyпка, w roztworze 1–5% do zmywań, przestrzykiwań, płukań, wziewań, także do opatr. ran jako Boroglycerin (92 cz. Glyceryny i 62 cz. a. bor.), borlint, wata borowa (10–20%), borphenolint; do maści i czopków (20–25%) 10·0=3 kr.

— **borosalicylicum** zewn. jak ac. salicyl. 1·0=5 kr.

— **camphoricum** (antisept.) 0·5–1·0 *p. d.* k. r. d. aż do 6·0 *p. die* 1·0=8 kr.

— ***carbolicum crystalisatum** (Ac. phenylicum, Phenolum) 0·01–0·10! *p. d.* k. r. d. aż do 0·50! *p. die* w pigułkach, roztworach alkoh. i emulsji; zewn. jako środek żrący (5–30%); jako antysep. do lecz. ran w roztworach wodnych, alkoh., oliwie z collod. (1·0:10·0 Coll.); do zmywań, penzlowań, wcierań, zastrzykiwań w 0·10–15%; do linim. i maści w stos. 1:5 aż do 50 oliwy, glyc., linim. calcis; jako Carbolspray (1–5%) do wstrzykiwań podskórnych (0·10–0·20:10·0 Aqu.) do miąższowych (1:50 Aqu.). 10·0=3 kr.

— **crudum** tylko do dezynfekcji w roztworze (1:20) albo jako proszek z innymi ciałami. 100=10 kr.

- *Acidum liquefactum** (10:1 Aqu.) jako środek żrący, jak powyżej. 10·0 = 3 kr.
- **chloronitrosium** (Aqu. regia) z. Acid. nitr. 10·0 = 3 kr.
- ***chromicum** jako środek żrący, czysty albo rozcieńczony (1:20—50 Aq.). 1·0 = 4 kr.
- **chrysohanicum** p. Chrysarobinum.
- ***citricum** 0·3—1·0 p. d. k. r. d. w proszku, saturat. mieszaninie burzającej (2·0—2·5 kw. odpowiada jednej cytrynie). zewn. do penzl. (1:10 Aqu.); do zmywań, płukanek (1—2%). 10·0 = 10 kr.
- **cubebicum** 0·3—1·0! p. d. k. r. d. do 5·0! p. die w pigułkach lub bol.
- **formicicum** jako rubefac. i żrący; czysty albo w rozcieńczeniu (1—10% roztworze wodn. lub alkoh.). 1·0 = 2 kr.
- **gallicum** 0·5—0·6 p. d. k. r. d. w prosz., pigułkach, solut.: zewn. jako płukanie do ust (1—5%), woda do ocz. (0·5—2%) inject. (1%), penzlów. (1:6 glycer.). 10·0 = 12 kr.
- **hydrobromicum dilutum** (10%) w krztuścu, Vomitus gravid.; w dyspeps., szumie w uszach, w rozcieńczeniu (1:100—150 Aqu.) 2—20 kropli p. d. k. r. d. do 40! kropli p. d. i 200! kropli p. die; zewn. do penzlowań i antysept. opatr. 1·0 = 1 kr.
- ***hydrochloric.** (Acid. muriat.) **concentr.** pur. (24%) i
- **hydrochloric crudum** (33%) zewn. jako żrący; 1%—3% jako płukanka; do penzl. (1—3:25—30 syropu lub miodu); do zmywań i okładów (1—2%); do kąpieli 60·0—120·0 na kapiel. 10·0 = 5 kr. — ***dilutum** (12%) 10—30 kropli p. d. k. r. d. aż do 5·0—10·0 p. die w rozcieńczeniu 1—2% jako napój lub w miksaturach. 10·0 = 2 kr.
- **hydrocyanicum** (kwas pruski wodnisty, zaw. 2% woln. kw. sinowodr.) $\frac{1}{5}$ —1 kropli czyli 0·01—0·05 p. d. k. r. d. aż do 0·20 p. die kroplami; zewn. do penzl. (0·25—0·50:5·0 Aqu.), jako woda do ocz. (0·05—0·25:5·0 Aquae), do maści (0·5:5·0). 0·1 = 1 kr.
- **hydrofluoricum** ($\frac{1}{2}$ %) 3 razy dnia 10—30 kropli w bardzo znacznym rozcieńczeniu; do wziewań i opatr. (0·5—1·0:500). 10·0 = 20 kr.
- **hydrojodicum** 0·50—2·0 p. d. k. r. d. rozcieńcz. wodą.
- **hyperosmicum** (Acid perosmicum, osmicum) 0·001 p. d. k. r. d. w rozcieńczeniu wodnym lub w pig. (0·015! p. d. a 0·05! p. die w padacze); podsk. zastrzyk. raz dnia $\frac{1}{3}$ —1 strzyk. Prav. 1% roztworu w nowotworach, wolu, nerwobólach. 0·1 = 50 kr.
- **jodicum** 0·10—0·30 p. d. k. r. d. aż do 1·20! p. die w rozcieńczeniu lub w pigułkach, zewn. w maściach albo podskórn. (1:5—10 Aqu.).
- **kreosotinicum** (Antipyretic) jak acid. salicyl. 1·0 = 8 kr.
- ***lacticum** 5—20 kropli = 0·3—1·50 p. d. k. r. d. w roztworze wodnym (1:200 Aqu.) w pastylkach aż do 10·0 p. die; zewn. do wziew. (15—20 kropli: 15—30 Aqu.), jako płukanka do ust (1:100—150 Aqu.); do penzlowań (1:5—10 Aqu.); do

zmywań ran (1—2‰); czysty albo 50—80‰ do przyżegania wrzodów gruźlicznych. 1·0 = 4 kr.

***Acidum nitricum conc. pur.** (około 48‰ czyst. kw.) 10·0 = 3 kr. jako środek żrący i znacznie silniejszy

— ***nitriconitrosus** (fumans) czysty lub jako t. zw. Acid. nitric. solidifactum. 10·0 = 5 kr. — ***A. nitr. dilutum purum** (około 21‰ kw.) 5—15 kropli = 0·5—1·0 p. d. k. r. d. w znacznym rozcieńczeniu, jako napój (nieodpow.). 10·0 = 2 kr.

— **chloronitrosus** (**Aqua regia** składa się A. nitric. 1·0, A. hydrochloric. 2·0) wewn. 1·0—2·0:150·0—200·0 Aqu. łyżkami; zewn. do kąpieli (30·0—50·0). 10·0 = 3 kr.

— **oleinicum** używ. do rob. plastrów (Dietricha). 10·0 = 5 kr.

— **oxalicum** 0·05—0·3 p. d. k. r. d. w proszku lub w 1‰ roztworze; jako płukanie do ust (1‰). 10·0 = 4 kr.

— ***phosphoricum** (16‰ czysty kwas fosf.), 10—30 kropli 0·5—1·5 p. d. k. r. d. aż do 10·0! p. die; jako napój ($\frac{1}{2}$ —1‰), w mixturze (2·0—10·0:100·0), w pigułkach; zewn. w roztw. 1—4‰ jako płukanie do ust, do zmywania ran. 10·0 = 6 kr.
siccum (glaciale) 0·1—0·3 p. d. k. r. d. w pigułkach. 1·0 = 1 kr.

— **pieronitricum** (pierinicum, carbagoticum); 0·10—0·25—0·50 p. d. k. r. d. do 1·50! p. die w pigułk. lub w rozpuszcz.; zewn. jak kw. karbol. 10·0 = 10 kr.

— ***pyrogallicum** (kwas pyrogallusowy) zewn. w alkoh. (5—30:100) lub w maściach 1—10:20 wazeliną lub lanoliną. 1·0 = 5 kr.

— ***salicylicum** (antisept. i antypyret.) 0·15—1·0 p. d. co 1—3 godzin aż do 2·0—8·0! p. die w proszk., pigułk., roztwor., mixt. lub emulsyj.; zewn. jako zasypka czysty lub z amyl. talcum, carbo; jako proszek do zębów lub tabaka (0·10—1·0:10—100 carbo., sacch., acid. tannic. etc.); do insufl. do pharynx. (1:5—50), w roztw. 1—3‰ do opatrunków, także jako wata i gaza salicylowa, jako woda salicyl. 2—3‰ z dodatkiem spir. vini, wody arom., gliceryny; do wziewań (1:500—1.000), do lewatyw (jako antipyr. 3·0—8·0), jako miejscowy antysept. 1·0—3·0 do przepłukiwań kiszek; mniej używany do zastrz. podsk. (1:600—1.000 Aqu.); do plastrów (1:2 empl. diachyl.), do maści i linim. (1:10—50). 1·0 = 2 kr. —

A. borosalicylicum (skł. się Ac. bor. 1, Ac. salic. 2, Aqu. 5, Spir. 10 odparow. do suchości). — Pulv. salic. c. Talco (P. c. pudores pedum. Ac. salic. 3, Amyl 10, Talci 87). 1·0 = 5 kr.

— **salicylosum** (Acid. spirituosum) 0·1—0·5 p. d. k. r. d. w roztw. alkoh. lub z syropem.

— **sclerotinicum** 0·15—0·25—0·30 p. d. k. r. d. podsk. (1:10 Aqu.) 0·01—0·06! p. d. aż do 0·25! p. die. 0·10 = 10 kr.

— **silicicum** (hydrat) 0·06—0·10 p. d. 2 razy dnia jako trochisci, pigułki, proszki lub w rozpuszczeniu. 1·0 = 2 kr.

— **sozolicum** zob. Aseptol.

— **succinicum** (bursztynowy) 0·3—1·0 p. d. k. r. d. w pig., proszkach, roztworze wodn. lub alkoh.; wewn. jako płukanie (1:10—50) do penzl. (1:5—10 miodu lub glyc.). 1·0 = 2 kr.

Acidum sulfoichthyolicum zob. Ichtyol.

— **sulfuricum anglicanum** (crudum; zawiera 75% kw.) 100·0 = 4 kr. — ***Acid. sulfuric. conc. purum** (96%) 10·0 = 3 kr. i **Acid. sulfuric.** wszystkie 3 tylko zewn., jako środki żrące lub z proszkiem roślinnym (1:7—8) jako pasty;

— ***sulfuric. dilutum** (zaw. 100 cz. Ac. sulf. conc.: 476 Aqu.) 0·25—1·5 p. d. k. r. d. w pig. lub kroplami (5—30 kr. p. d.) z syropem, wodą osłodzoną, jako napój (2·0—4·0:500 Aqu.), zewnetrz. jako płukanka do ust i gardła (1—4%), do penzl. (1·0—3·0:25·0) i zmywań. 10·0 = 1 kr.

— **sulfurosum liquid.** (Aqua sulfurosa) 5—10 kropli p. d. k. r. d.; do penzl., płukań (5 kropli:100 Aqu.). 100 = 20 kr.

— ***tannicum** czyli **Tanninum** kwas garbnikowy 0·03—0·4 p. d. k. r. d. aż do 2·0 p. die w proszkach, pigułkach lub rozpuszcz. (w wodzie z dodatkiem alkoh., gliceryny) jako mixt. (w wod. arom.); zewn. czysty albo w stos. 1:1—10 z amyl., zinc. oxyd., borax., cukrem; do wdmuchiwań do nosa, krtani; do wziewań, zastrzykiwań (0·5—5·0:100—200 Aqu.) płukanka do ust i gardła (1—20:100), do kąpieli (10·0—50) do lewatyw (0·5—2·0:100), do maści (1:4—15), do czopków (0·20 tanniny, 2·0 Cacao, 0·20 cerat fl.). 1·0 = 2 kr.

Acid. tannic. boratum (ac. tann. 1:3 Ac. boric.) jako zasyпка. — **Baccila tannica** (z taniny, tragacanth, gliceryny, żelatyny).

— **collodium tannic.** (1:10 coll.). — **Glycerinum tannic.** (1:4—10 Glycer.). — **Sapo tannini** (sap 15, tannini 1).

— ***tartaricum** (kwas winny) 0·2—1·0 p. d. k. r. d. aż do 10·0 p. die w proszkach, w pastylk.; w mixt. 4·0:30·0—50·0 syr., 200·0 Aqu.) co godzinę 1—2 łyżek; jako napój (5·0—10·0:50·0—100·0 syropu na litr wody) 10·0 = 4 kr.

— **thymicum** p. **Thymol.**

— **valerianicum** 5—10! kropli p. d. k. r. d. aż do 40! kropli p. die z alkoh. albo z klejkami płynami (często jako sole amonowe, cynkowe, żelazowe). 1·0 = 6 kr.

Aconitum (b. zmienne działanie!) 0·0003—0·001—0·004 p. d. 2—3 r. d. aż do 0·007! p. d. i 0·04! p. die w pigułk., rozp. w alkoh. (1:60) w pastylk.; zewn. w maściach (1—2:60), w alkoh. (1:25—50), do podskórnych wstrzyk. (0·10:10·0 Aqu. z doda. kilku kropli kw. soln. z tego 5—20 przedziałek strzyk. Pravaza = 0·001—0·004 p. d.). — **Aconiti tuber** 0·03—0·10 p. d. 2—3 r. d. aż do 0·5! p. die w proszkach, pigułkach.

***Extract. Aconit.** 0·005—0·01 p. d. 2—4 r. d. aż do 0·03! p. d. i 0·12! p. die w pig. i roztw. alkoh.; zewn. w rozpusz. (1:20—50), w maściach (1:5—10). 1·0 = 14 kr.

***Tinct. Aconit.** 2—10 kropli (0·1—0·5!) p. d. k. r. d. aż do 1·5! p. die; zewn. często do nacierań. 10·0 = 6 kr.

Acorus zob. **Calami Rhizoma.**

Adeps benzoatus zob. **Axungia.**

— **suillus** zob. **Axungia.**

Adonidis vernalis Hb. Infus. 4·0—8·0:150·0—200·0 colat. co 2—3 godziny łyżkę. 10·0 = 4 kr.

***Aether (sulfuricus)** 5—20 kropli (0·1—0·5) *p. d. k. r. d.* aż do 8·0 *p. die* czysty lub z innemi środkami; w kaps. (Perles d'Ether zaw. 5 kropli); zewn. do anestezyi ogóln. (Aeth. 9+1 Chlorf.) i do miejsc. (czysty), do wieierań (czysty lub w maściach), do lewatyw (1·0—1·5:100 Aqu) do penzl., do wstrzyk. podsk. w zapadzie ($\frac{1}{2}$ —1 strzyk. Prav.). 10·0=2 kr.

— **crudus** tylko zewn.

— ***aceticus** jak sulf. 10·0=7 kr.

— **bromatus** zob. Aethylum bromat.

— **camphoratus** (Camph. 1·0 Spir. Aeth. 9) do zastrzyk. podsk.

— **methylicus** do miejscow. i ogóln. anestezyi.

— **petrolei** zob. petrol.

— **valerianicus** 10—20 kropli *p. d. k. r. d.* do 5·0 *p. die* w kropl. albo kapsułk.

Aethylenum chloratum (Chlorethyl, liquor hollandie.) 5—20 kropli *p. d.* 3—4 r. d. z eterem, alkoh., olejotłuszczami; zewn. jako miejsc. anest. (czysty albo z eterem). 1·0=5 kr.

— **bromatum** 3—10 kropli *p. d.* 2—3 r. d. postęp. aż do 50 kropli (w padacze).

Aethyl. chlorid. tylko zewn. do miejsc. zniecz.

Aethylidenum bichloratum jak chloroform do narkozy przy oper. zębów. 1·0=15 kr.

Aethylum bromatum jako sedat. 5—20 kropli (0·3—1·0) *p. d.* 2—4 r. d. na cukrze albo w kapsułkach, do wziewań 0·20—0·50. 1·0=6 kr.

— **jodatum** do wziewań przy astmie 5—10 kropli *p. d.*

Agaricus albus (Boletus Laricis, fungus Laricis) jako słabe drastic. po 1·0—2·0 *p. d. k. r. d.*, jako przeciwpotny po 0·2—0·5 *p. d.* 2—3 r. d. w proszk. pigułek. 10·0=8 kr. — **Agaricinum** (kwas) jako przeciwpotny 0·005—0·01 *p. d. k. r. d.* aż do 0·02! *p. d.* w pig. (zwykle razem z pulv. Doveri, aby zapobiedz rozwoln.). 0·1=3 kr.

— **chirurgorum** do tamowania krwi.

Agathinum (Salicyl-a-Methylphenyl-hydraxon) antirheum. i antineuralg. 0·50—0·75, 3 r. d. 0·1=8 kr.

Aletris farinosae Rad. (tonic. amar.) decoct. 15·0—30·0:100—150·0 Coll., także w proszkach 0·6 *p. d. k. r. d.* — **Tinct. a. f.** 4·0—8·0 *p. d. k. r. d.* — **Ext. fluid. a. f.** 0·5—2·0 *p. d. k. r. d.*

***Aloë** 0·02—0·03 *p. d. k. r. d.* jak amar. lub stomachic.; 0·05—0·3 jako rozwalniający; a 0·3—0·6 aż do 1·0! *p. d.* jako drasticum tylko w pigułkach; zewn. tylko w clysm. (0·5—1·25) 10·0=3 kr. — **hepatica** w trochę większych dawkach.

***Extr. aloës** jak popr. po 0·02—0·03 *p. d. k. r. d.* jako stom., 0·05—0·2 jako rozwaln., a po 0·5 jako drastic. 10·0=11 kr. — **Massa pilular Rufi** (zł. Aloë 60, Myrrha 30, Crocus 10) w podwójn. dawkach jak Aloë. — ***Pilul. laxantes** (Aloë 40, Jalap. 60, Saponis med. 20, Anis vulg. fruct. 10) jedna pigułka waży 0·20. 10·0=22 kr. — **Tinct. Aloë** jako tonic. i dig. 5—30 kropli *p. d. k. r. d.* 10·0=3 kr. — **Tinct. Aloë comp.** $\frac{1}{2}$ —1 łyżki. 10·0=4 kr. — **Aloënum** v. Aloinum

0·1—0·2 *p. d.* jako purg., 0·2—0·5 *p. d.* jako drastic. w pig. albo w glicerynie (1:5—8). 1·0=6 kr.

Altheae sciss. ***Fol.** 100·0=10 kr. i ***Rad.** 100·0=18 kr. jako macer., inf., decoct., 5·0—10·0:100—300 Coll. albo jako jako species; Pulv. rad. al. jak consp. i jako masa do pig.; zewn. do katapl. i okład., inf. do płukań i lewatyw; do przestrzykiw. (3·0—5·0:100 Col.). — ***Species Alth.** (Fol. alth. 10, Rad. alth. 5, Liquir 2·5, Flor. malv. 1). 100·0=15 kr. — ***Species emolientes** (Fol. alth., malv. i herb. Melilot $\bar{a}\bar{a}$ 1, Sem. lini 2). 100·0 = 18 kr. — ***Species pro cataplasm.** (składu jak poprzedz. grubo proszkowany). 100·0=25 kr. — ***Species pectoral.** (Fol. alth. 4, Rad. liquir, rad. alth., Hord. perl. fruct. Cerat. — carie. $\bar{a}\bar{a}$ 10, Flor. Verb., F. Malv., Rhoead, fruct. anis. stell. $\bar{a}\bar{a}$ 1); jako decoct. z wodą lub mlekiem. 100·0=17 kr. — ***Syrupus altheae** łyżeczkami, także jako corrigens. 10·0=3 kr.

— ***Alumen** 0·05—1·0 *p. d.* k. r. d. do 5·0 *p. die* w proszk., pig., rozpuszcz. w żółtycy lub w mleku (1:200 mleka) jako **Serum lactis aluminatum** $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ litra dziennie; zewn. jako żrący czyst. lub jak Crayon d'Alun; jako zasypka jako proszek do wdmuch. do nosa, gardła, oczu (czysty albo 1:20—25 cukru), jako woda do ust, gardła, oczu, (0·5—10:100—200) do wziewań, lewatyw (2%), zmywań (5%), do kąpieli (200·0) w maściach (0·1—2·0:10—25). 10·0 = 2 kr. — **Al. plumesum s. Talcum praep.** 100·0=10 kr. — ***A. ustum** (Al. calcinatum) działa silniej od poprz., ma to samo zastos. zewn. 10·0=4 kr. — ***Aluminii acetici liquor** (Aluminium aceticum, argilla acetica) 5—20 kropli (0·05—2·0) *p. d.* k. r. d. w rozp. z syropem; zewn. czysty albo rozcieńcz. do okładów (1:5—200), opatr., zmywań (1:5—10), przestrzykiwań (0·5—1:100). 100·0=18 kr.

Aluminium acetico-tartaricum tylko zewn. jako adstring. i antysep. czysty albo w rozpuszcz. także jako płukania (1—2%), penzlow. (5—50%). 10·0=18 kr. — ***Aluminium sulfuricum** w zastos. jak Alum. 10·0=2 kr.

Alumnol. (5% alumin. i 15% siarki) adstring. i antisept. tylko zewn. 0·5—2% do obmywania ran, przestrzykiwania, w maści 3—6% lub jako zasypka (na ulcus molle). 1·0=6 kr.

Ambra grisea (nigra) 0·06—1·0 w proszk., pigułek., pastylk. 0·01=15 kr.

***Ammonia** (pura liquida), Liquor ammonii caustici, Amoniak; około 10% bezwodny amoniak, wewn. 3—20 kropli (0·1—0·5) *p. d.* k. r. d. znacznie rozcieńczony płynami klejkami; zewn. do wachania, do injek. (5—15:60—100) do zmywań i nacierania (2—6%); do wziewań, lawatyw (5—10 kropli *p. d.*), do maści i linim. (1:5—10), podskórn. (1:5—10), a do żył (1:2—20). 10·0 = 2 kr. — ***Liquor ammoniae anisatus** (ol. anis. 1, alkoh. (90%) 20, amm. 5) 3—20 kropli *p. d.* k. r. d. do 5·0 *p. die*; zewn. do wachania, do wziewań. 10·0=4 kr. Do wcierań używa się ***Linimentum ammoniatum s. lin. volatile** (ol. oliv. 4, am. 1). 10·0=3 kr.

Linim. ammoniato-camphoratum — ***Linim. saponato-camphoratum** (Balsam Opodeldoc.) 10·0 = 3 kr. — **Linim. saponato-camphorat. liquid.** — ***Ammoniacum** (Gummi resina A., A. depuratum) 0·3—1·0 p. d. k. r. d. do 5·0 p. die w pig. albo zawies.; zewn. do plastrów. 10·0 = 7 kr.

***Ammonium acetic. solut.**, Liquor ammon. acetic. (jest 15% Amm. acetic.) 2·0—10·0 p. d. k. r. d. czysty albo w mixt. (10·0—50·0:100) z środkiem diaphor.; zewn. do płukań i nacierania. 10·0 = 5 kr.

— **benzoicum** zob. **Natrium benz.** 1·0 = 5 kr.

— ***bromatum** zob. **kal. bromatum.** 10·0 = 19 kr.

— ***carbonicum** (sal alkali volatile) 0·2—0·6 p. d. k. r. d. aż do 2·0 p. die w proszku, rozpuszcz., mixt., satur.; zewn. do wachania, do zmywań, maści i liniment. 10·0 = 3 kr.

Aqua am. bicarb. (0·2:200). **Am. carbonic. pyrooleosum** (Sal volatile cornu cervi). 10·0 = 7 kr.

— **Liquor am. carb. pyro-oleos.** (Spir. cornu cervi) 15—30 kropli p. d. k. r. d. 10·0 = 3 kr.

***Ammo. chlorat.** (sal. amm. depur. salmiak) 0·2—1·0 p. d. k. r. d. do 10·0 p. die w proszku, pig., powid., rozczyń., mixt.; zewn. jako zasypka; do płukanek (1—3%), do zmywań, kąpiel (50·0—100·0), penzlow. (3—5:50) i wziewań; także do maści i linim. (1:5—10). 10·0 = 3 kr. Są także pastylki salmiak. (Tablettes pectorales). — **Am. chlorat. ferrat.** (Ferrum ammoniatum) 0·2—1·0 p. d. k. r. d. w rozp. lub mixt. (2—5%). 10·0 = 5 kr. — **Amm. jodatum** (zaw. 63% jodu) 0·10—0·6 p. d. k. r. d.; do maści (1:20—50). 1·0 = 7 kr. — **phosphoricum** 0·5—4·0 p. d. k. r. d. aż do 6·0 p. die w rozpuszcz., 1·0 = 2 kr.

Am. picrinicum (picronitricum) 0·05—0·10 p. d. k. r. d. aż do 0·4 p. die. Łatwo wybuchający!

— **sulfoichtyolicum** zob. **ichtyol.**

— **valerianicum** 0·1—0·3 p. d. k. r. d. aż do 1·0—4·0 p. die w pig., mixt., 1·0 = 10 kr.

***Amygdalae amarae** (Semen amygd. amar.) wewn. w emulsji ze słodk. migd., zewn. w proszku i w pastach. 10·0 = 3 kr. — ***dulces** 1:25 do emulsji. — ***Emulsio amygdalina** (Amygd. dulc. decortie. 25, Sach. 15, Aqu. 250). — ***Ol. amygd.** łyżeczkami czysty, albo z wodą jako emulsja fałsz., wreszcie jako mixt. oleosa 10—20:200 Aqu.; zewn. jak ol. oliv. 10·0 = 6 kr. — **Ol. amygd. amar. aether.** $\frac{1}{4}$ —1 kropli (0·01—0·05) rozp. w alkoh. albo eterze, także na cukrze, albo w emuls., ext. czysty albo w miesz. do wcierań, maści (0·1:10·0). 1·0 = 8 kr. — ***Syrup. amygdalinus.** 10·0 = 4 kr.

Amylenum hydratum (Amylenhydrat) (Hypnotic. i sedativ.) 3·0—5·0 p. d. rozp. w wodzie, także w lewatywie. 1·0 = 6 kr.

***Amylium nitrosum** (Amylnitrit.) 1—5! kropli p. d. do wziewań; podsk. (1:10 Spirit.) 1·0 = 3 kr.

***Amylum** (Tritici) jako constit. do proszku, do mucil., consp.;

zewn. jako zasypka; także do lew. (1—2 łyżeczki zagotowane z 200·0 aquae). 100·0=15 kr.

***Amylum Marantae pulv.** (Arrow-root) (1—2 łyżeczki zagotow. z filiżanką rosołu, wody, mleka). 100·0=30 kr.

Analgen (antirheum., antineuralg.) 1·0 *p. d.*, skuteczny jako antineuralg. 1·0=20 kr.

***Angelicae** rad. pulv. 0·5—2·0 *p. d. k. r. d.*; Inf. 5—8% 10·0=6 kr.

Extr. angelic. 0·20—1·0 *p. d. k. r. d.* 1·0=3 kr.

Spirit. angel. composit. 10—20 kropli *p. d. k. r. d.* 10·0=4 kr.

Angusturae cortex 0·2—1·0 *p. d. k. r. d.* w proszku, lub dect. (5·0—15·0:100—200). 10·0=4 kr.

Anilinum sulfuric. 0·05—0·12 *p. d.* 1—3 *r. d.* w proszku, pig. w rozp. (0·05—0·20:150); ext. w maściach (1:20—30). 1·0=2 kr.

***Anisi fructus** (Semen anisi vulg.) 0·3—1·5 w proszku, inf. (3—5%). 10·0=6 kr. — **Ol. anisi vulg.** 1—3 kropli *k. r. d.* w elaeosacch. 1·0=4 kr. — ***Spirit. anis. vulg.** $\frac{1}{2}$ —2 łyżeczek *k. r. d.* 10·0=3 kr.

— **stellati fructus** jak poprzedni.

Anthrarobinum zob. **Chrysarobinum.** 1·0=6 kr.

Antidotum arsenici = Liquor ferri sulfuric. oxyd. 100, Aquae 200, do tego przy ustaw. mieszaniu 15 Magn. ust. z 250·0 Aqu. winien być zawsze świeżo przygotowywany, podaje się łyżeczkami co $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ godziny.

***Antifebrinum** 0·25—1·0! *p. d. k. r. d.* do 2·0! *p. die* jako antipyr., rheumat., neuralg., w proszk., pigułk., rozp.; zewn. jako antisept. 1·0=2 kr.

Antipyrinum 0·5—1·0—3·0 *p. d.* 3—4 *r. d.* aż do 8·0 *p. die* (dzieciom najw. 0·75 *p. d.* 3—4 *r. d.*) jako proszek lub mixt.; zewn. jako zasypka, także do lewatyw; do wstrzykiwań do cewki $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ %. 1·0=10 kr.

Antiseptol (Oinchoninum jodosulphuric.) zaw. 50% jodu, ma zastęp. jodoform.

Antitoxin c. tetanum Tizzoniego do zastrzykiwań podskórnych w tetanus. 1·0=75 złr.

Apiolum cryst. album 0·25—1·0! *p. d. k. r. d.* aż do 4·0 *d. die* w proszku lub syropie, polec. w zimnicy i dysmenorrhoe. 0·1=4 kr.

Apocodeinum 0·01—0·03 *p. d. k. r. d.* aż do 0·08 *p. die* w pig. lub w rozpuszcz.; działa podobnie jak apomorph. 0·1=8 kr.

***Apomorphinum** hydrochl., jako expec. 0·001—0·005 *p. d.* w proszk., pigułk., mixt.; jako emetic. 0·01! *p. d.* aż do 0·05! *p. die*; także podskórnie jako emetic. w dawce 0·001—0·01; dzieciom 4-tą część dawki lub 0·01—0·03 w lewatywie. 0·01=2 kr.

***Aqua amygdalar. amar. concentr.** (zawiera na 1000 części 1 część bezwodn. kw. sinowodorowego), 0·5—1·5 (10—40 kropli) *p. d.* aż do 5·0! *p. die* czysta kroplami albo w mixt. 10·0 6 kr.

— ***amygd. am. diluta** (na 1.000 części: 0·05 bezw. kw. sinowdr.) łyżeczkami czysta albo w mixt. 10·0=1 kr.

- ***Aqua aromat. spirit.** do nacierań. 100·0 = 14 kr.
- ***Goulardi** zob. plumbi acet.
- ***calcis** (Aqua calcariae) z. calcium oxydat. 100·0 = 3 kr.
- ***carbolisata** (zaw. 33 części kw. karbolowego i 967 części wody) do opatrunków i desinfekcyi. 100·0 = 3 kr.
- ***carminativa** (Flor. chamom. roman. 100, cort. citr., fol. menth. crisp., fruct. carvi., coriandr., foeniculi āā 30·0:4000 Aqu.) łyżeczkami. 100·0 = 3 kr.
- ***chlori** (Aqua chlorata) zob. Chlor. solut. 10·0 = 3 kr.
- ***cinnamomi** zob. cinm. cortex.
- ***foeniculi** zob. foen. fruct.
- **hydrosulfurata** przy zatruciu metalami 150·0 — 500·0 czysta albo rozcz. wodą, łyżkami. 10·0 = 3 kr.
- **kreosoti** (Aqua Binelli) łyżeczkami, także zewn. do przepłukiwań.
- ***laurocerasi** (10·0 zaw. 0·6 bezwodn. kw. sinowodorow.) używ. jak Aqu. amygd. amar. concentr. 10·0 = 4 kr.
- ***melissae** jako corrig. do mixt. 100·0 = 13 kr.
- **menthae crisp.** tak samo. 100·0 = 20 kr.
- ***menthae piperitae** tak samo. 100·0 = 16 kr.
- **phagedaenica** zob. Hydragr.
- **picis** zob. pix liquida.
- ***plumbi** zob. plumb. acet.
- ***plumbi spirit.** (a. Goulardi) zob. plumb. acet.
- ***rosae** zob. rosae flor.
- ***rubi idaei** zob. Fruct. Rub. id.
- ***Araroba** zob. Chryzarobin. 1·0 = 5 kr.
- Arbutinum** 0·5—1·0! *p. d.* aż do 4·0! *p. die* w proszku lub mixt., stos. w zap. niez. pęcherza i w chorobach nerkowych. 1·0 = 20 kr.
- Arecae nuces pulv.** pod. przeciw tasiemcowi w dawce 4·0—6·0 w proszku. 10·0 = 8 kr.
- Argentum chloratum** (muriaticum) 0·01—0·10 *p. d.* 2—4 r. d w proszku, pig. 0·1 = 3 kr.
- **foliatum** używ. do powlekania pigułek.
- **jodatum** 0·005 *p. d.* jak Arg. chlorat. 1·0 = 50 kr.
- ***nitricum crystallis.** 1·0 = 10 kr. i ***nitricum fusum** 1·0 = 12 kr. wewn. po 0·005—0·03! *p. d.* 2—4 r. d. aż do 0·20! *p. die* w pig. past. rozcz. w subst., w zgeszcz. lub rozpuszcz. (1:1—2) jako środek żrący; także jako crayon; w rozcieńcz. do przestrzykiwań (0·10—1·0:100 Aqu.), do wziewań (0·01—0·3:100), do penzłow. (1·0—10·0:100), do ocz. (0·01—1·0:100), w maści (0·20—0·80:10·0), także w proszku (0·1—0·5:5·0 cukru lub alunu) do wdmuchiwań do gardła lub krtani.
- Arg. nitric. c. kalio nitrico** (Lapis infernalis mitigatus, zaw. 1 arg. n. i 2 k. nit.) jako śr. żrący. 1·0 = 6 kr.
- Argilla alba** s. Bolus a. jako constit. do proszk., pig., także zewn. jako zasyпка. 100·0 = 12 kr.
- Aristol** (Dithymoldijodid) rozp. w oliwie i paraf., stos. w chorobach skóry i nosa (lupus) w 10% maści lanolin. 1·0 = 30 kr.

***Arnicae flores sciss.** $10:2 = 2$ kr. i ***Radix** $10:0 = 3$ kr.
wewn. $0:3 - 1:0$ p. d. k. r. d. w proszk., pig., inf. ($2:0 - 10:0$
:100:0); zewn. jako tabaka, także do okładów i lewatyw (inf.
 $5:0 - 20:0$:100). **Extr. flor. arn.** $0:7 - 0:5$ p. d. $1:0 = 4$ kr. —
Extr. rad. Arn. $0:2 - 1:5$ p. d. $1:0 = 4$ kr.

***Tinct. Arnicae** $0:2 - 0:5$ p. d.; zewn. do wcierań, okład. i t. d.
 $10:0 = 3$ kr.

Artemisiae Hb. pod. jak Hb. absinthi. **Rad. Art.** w proszk.
 $0:1 - 2:0$ p. d. albo w inf. $2 - 5\%$; $100 = 12$ kr. — **Extr. Art.**
 $0:10 - 0:5$ p. d. $1:0 = 6$ kr.

***Asa foetida** (Gummi resina dep.) wewn. $0:3 - 0:5 - 1:0$ k. r. d.
w pig. lub zawieszynie $2:0 - 6:0$:100, także w lewat. $3:0 - 10:0$
(w emuls. z żółtkiem). $10:0 = 9$ kr.

Tinct. as. foet. $20 - 60$ kropli p. d. czyst. albo w mixt
 $10:0 = 4$ kr.

Asaprol proszek rozp. w wodzie i wysk. (antipyr. i antirheum)
 $1:0 - 4:0$ p. die. $1:0 = 12$ kr.

Aseptolum (Acid. sozodolicum) gęsta ciecz działa antysp.
 $3 - 5\%$ rozc. wodnym; rozp. w oliwie, glyc., lub alkoh. nie
działa. $10:0 = 30$ kr.

Asparaginum (diuretic.) $0:05 - 0:10!$ p. d. aż do $0:30$ p. die
w proszku, pig. $0:1 = 2$ kr.

Atropinum purum nieuż.

— **sulfuricum** $0:0002 - 0:001$ p. d. aż do $0:003!$ p. die,
w pig., proszk. lub w rozp.; zewn. do oczów ($0:10 - 0:5$
:100:0 Aqu.), podskórn. $0:0002 - 0:001$ ($2 - 10$ przedzia-
łek strzykawki Pravaca z rozc. $0:01 - 0:05$:10 Aqu.)
również razem z morf. (Atrop. sulf. $0:02$, morph.
mur. $0:4$; Aqu. dest. $20:0$), w maści i linim. $0:2 -$
 $0:5$:100. $0:1 = 20$ kr.

— **valerianicum**, wewn. jak sulf. $0:01 = 4$ kr.

***Aurantii fructus cort.** (flavedo cort. aurant.) $0:3 - 2:0$ p.
d. $2 - 4$ r. d. w proszku. Inf. $5 - 12\%$, $10:0 = 6$ kr. — **Extr.**
aurant. $1:0 = 3$ kr.

***Folia aurant.** $1:0 - 4:0$ p. d. inf. jak cort. $10:0 = 2$ kr.; tak
samo **flor. aurant.**

***Aqu. flor. aurant.** (Aqua naphae) $10:0 = 4$ kr. — ***Ol.**
flor. aurant. $1:0 = 60$ kr. — ***Ol. cort. aur.** $1:0 = 4$ kr.,

***Ol. Bergamott.** $1:0 = 3$ kr. — ***Syrup cort aur. corrig.**
do mixt. $10:0 = 3$ kr.; tak samo **Syrup aur. flor.** ***Tinct.**
aur. cortie. $20 - 60$ kropli. $10:0 = 4$ kr.

***Auro natrium chloratum** wewn. $0:003 - 0:03!$ p. d. $1 - 2$
r. dz. aż do $0:05!$ p. die w pigułk., pastylk., proszkach lub
w rozp. (in vitro nigro); jako woda do ocz. ($0:1 - 0:2$:100),
w maściach $0:2:5$; $0:01 = 4$ kr.

Aurum chloratum wewn. $0:002 - 0:01$ w rozp.; zewn. jako
środek żrący. $0:01 = 6$ kr.

— **foliatum** do powlek. pig.

— **jodatum** stos. w kile.

— **oxydatum** $0:005 - 0:05$ w proszk. i pig.

***Axungia porcina** (porci Adeps suillus) tłuszcz do maści.
 $100 = 20$ kr.

***Axungia porci benzoata** 10·0 = 5 kr.

Balsamum canadense 10·0 = 10 kr.

— ***Copaivae** wewn. 0·5—2·0—3·0 t. j. od 10—40 i 60 kropli *p. d.* aż do 20·0! *p. die* w pig. a najczęściej w kapsułkach (capsulae gelatin.) razem z ext. cubeb., także w emulsyi (15·0 z 7·5 Gummi mimos. i 100·0—150·0 Aqu.) zewn. do lewatyw (7·0—15·0), do nacierań. 10·0 = 7 kr.

— **Nucistae** zewn. do nacierań.

— ***peruvianum** wewn. 0·1—1·0 *p. d.* aż do 5·0 *p. die*, w pig., past., elect. lub emulsyi; zewn. czysty lub w maściach używ. do opatr. ran; rozp. w alkohol. jako płukanie, tinct. do zębów i t. d. jako antiscabiot. 10·0—15·0 na jedno wtarcie, wreszcie do celów kosm. 10·0 = 24 kr.

Syrup bals. peruv. czyli Syr. balsamicus — expect. i corrigens.

— ***tolutanum** stos. jak bals. peruv. 10·0 = 12 kr.

— ***vitae Hoffmani** (mixt. oleoso-balsamica) 5—20 kropli *p. d.*; do wachania. nacierań, także do kosmet. 10·0 = 8 kr.

***Bardanae rad.** Dct. (10·0—50·0:100—500 Col.). 10·0 = 2 kr. także **Extr. Bardanae** 0·5—1·0 *p. d.* 1·0 = 3 kr.

Barium chloratum wewn. 0·02—0·1 *p. d.* aż do 0·50! *p. die* w pig.; zewn. 0·5—2·0:100. 10·0 = 3 kr.

***Belladonae rad.** wewn. 0·01—0·07 *p. d.* do 0·3! *p. die* w proszk., pig., inf. (0·3—1·0:100), wziewań (0·5—1·0:100), przestrzykiwań (1—4‰), okładów (2—5‰) i maści (1—5:10). 1·0 = 1 kr.

— **Extr. rad. Bellad.** 0·01—0·05 *p. d.* aż do 0·2! *p. d.* w proszk., pig. 1·0 = 10 kr.

***Fol. Belladon.** 0·05—0·2! *p. d.* aż do 0·6! *p. die* w proszk. pig.; inf. (0·5—1·5:100); jako cygareta do palenia, do miejsc. kąpiel.; do okładów, przestrzyk., do wziewań (0·5—1·0:100) lewatyw, jako woda do oczu (1·0—3·0:25). 1·0 = 1 kr. — ***Extr. fol. Bellad.** 0·01—0·05, aż do 0·2! *p. die*. 1·0 = 6 kr. — ***Tinct. fol. Bellad.** wewn. 1—10 kropli, 1·0! *p. d.* aż do 4·0! *p. die*. 10·0 = 5 kr.

Benzinum Petrolei (Benzin) wewn. 0·2—1·0 (5—25 kropli) mixt. i kaps. 2—3 r. dnia, do nacierań (1:2—4 tłuszczu); do lewatyw i wziewań. 100·0 = 10 kr.

***Benzoë, Resina Benzoë** wewn. 0·2—1·0 *p. d.* w pig., emulsyi; do proszku do zębów, do płukanek (2—4‰), do wody do oczu (1—2‰) do środków kosm. 10·0 = 10 kr.

Tinct. Benz. do wody do zmywań, do okład. 10·0 = 4 kr.

Benzonaphtol (Acid. benz. i naphtol) proszek podaw. wewn. 0·50 *p. d.* aż do 5·0 *p. die* (dzieciom aż do 2·0 *p. die*), jako antysept. kiszkowy. 1·0 = 4 kr.

Benzolguajacol czyli **Benzosol** (Acid. benz. i guajacol.) proszek używany w gruźlicy w miejsce kreozotu. 0·25—0·75 *p. d.* 2—3 razy dz. 1·0 = 20 kr.

Benzol stos. jak Benzin 1·0! *p. d.* aż do 6·0! *p. die*. 10·0 = 5 kr.

Berberidis aquifolii rad. i tinct. jako tonic. 15 kropli, aż do łyżeczki *p. d.* k. r. d. 1·0 = 3 kr.

Berberinum muriaticum i phosphoricum 0·03—0·05
p. d. 0·1 = 2 kr.

Betolum, Betol czyli **Naphtosalol** (połącz. kw. salicyl. z naphth.) proszek, polecamy przeciw gościowi, nieżyłtowi pęcherza, w chorobach kiszek z rozkładem treści jelit; 0·3—0·5 p. d. 2—4 razy dnia, aż do 2·0 p. die w proszku. 1·0 = 8 kr.

Bismuthum benzoicum v. subbenzoicum proszek używany jako zasypka na wrzód miękki. 1·0 = 10 kr.

— **carbonicum** 1·0 = 6 kr. i **citricum** 1·0 = 8 kr. używa się jak B. subnitr.

— **ammoniato citricum** 0·2—0·5 p. d. 2—4 r. dz. w proszku.

— **lacticum crystalisatum** 0·05—0·2 p. d. 2—4 razy dz. 1·0 = 12 kr.

— **oxyjodatum v. subjodatum** 1·0—2·0 p. die; zewn. jako zasypka i do maści. 1·0 = 10 kr.

— **salicylicum** 0·3—1·0 p. d. 2—4 razy dz. aż do 12·0 p. die w pig. i w proszk. 1·0 = 6 tak samo używa się **B. subsal.**

— ***subnitricum** czyli **Magist. bismuthi** 0·20—1·0 p. d. 2—4 r. dz. (dzieciom w rozwolnieniu 0·2—0·4 co 2—3 godz.) w proszk. i pig.; zewn. jako proszek do wdmuchiwań do gardła, nosa, krtani; do wstrzykiwań (w wiewiórze) (4—12%); także do maści (3—10%). 1·0 = 5 kr.

— **tannicum** 1·0 = 6 kr. jak subnitr.

— **valerianicum** 0·03—0·15 p. d. w proszk. lub pig. 1·0 = 6 kr.

Blattae orientales 0·06—1·0 p. d. w proszk. (jako diaphoretic.) także w inf. lub decoct 5—10%; 1·0 = 8 kr.

Tinct. blatt. 15—40 kropli p. d. 10·0 = 40 kr.

***Bolus alba** zob. **Argilla alb.**

***Borax** (veneta) czyli **Natrium biboracicum**, wewn. 0·5—2·0 p. d. k. r. dz. w proszku, rozp. w mixt., lub w linctus; zewn. do płukanek do ust i gardła (2—5%), do penzlowań (1·0—5·0:25·0), do zmywań (10·0—20·0:100), przestrzykiwań (1·0—5·0:100·0), wziewań i maści (1:3—10). 10·0 = 3 kr.

Bromalum hydratum (Bromalhydrat) wewn. 0·05—0·10—0·50 p. d. k. r. dz. w pig. lub w rozp. 0·1 = 5 kr.

Bromoformium podaw. dzieciom w kokluszu po 2—6 kropli na łyżce z wodą. 1·0 = 7 kr.

Bromum wewn. 0·003—0·02 p. d. aż do 0·1 p. die w wodzie lub alkoh. rozez.; Aqua Bromi czyli bromata 0·25:25·0 wewn. 5—15 kropli; do penzl. w błonicy gardła 0·25—0·50:100 albo razem z kali brom. aa.; zewn. do okładów, przestrzyk., wziewań (Bromi 1·0:500·0) do maści (1·0—2·0:50·0—100·0). 0·1 = 1 kr.

— **chloratum** 0·10 p. d., 0·1 = 2 kr.

Brucinum wewn. 0·005—0·1! p. d. 2—3 r. dz. w pig. lub z rozez. alkohol. (1·0:25·0) kroplami (2—25). 0·01 = 1 kr. — także **Bruc. nitricum i sulfuricum.**

Bryoniae rad. 0·5—2·0 p. d. w proszk. lub inf. (5—15·0:100—200 col.) purgans. 10·0 = 5 kr.

***Bulbus scillae** zob. **Scill. Bnlb.**

Butyrum cacao zob. **Cac. Sem.**

- Butyl-Chloralum hydratum**, Crotonchloral hydrat wew. 0·1—0·3 *p. d.* w większej dawce 0·3—0·6 *p. d.* działa nasennie pod. w rozp. z dodat. glyc. lub alkoh. 1·0 = 15 kr.
- Cacao Semen** v. *Fabae cac.*, Det. (15·0:100—200). 10·0 = 2 kr.
- Sem. Cac. express.** (Cac. odłuszcz.) — **Oleum (Butyrum) Cacao** 0·5—2·0 *p. d.* w proszk., past., zawies.; jako constit. do maści, suppos., baccill. 10·0 = 6 kr.
- Cacti glandiflori Tinet.** składu niepewn. lub pewniejszy **fluidextract Cact. gl.** jako analeptic. kroplami 5—15 *p. d.* 2—3 razy dziennie. 1·0 = 4 kr.
- Cadmium sulfuricum** 0·005—0·01 w pig. i rozp.; jako woda do ocz. (0·05—0·2:10·0) do przestrzykiwań (1—2⁰/₁₀) do maści (0·1:3—6) 1·0 = 3 kr. — podobnie **C. bromatum**, **C. jodatum**.
- Caincae Rad.** (Diuret.) 0·3—1·0 *p. d.* w proszku, inf. lub det. 5·0—30·0:100—200 Col. 10·0 = 8 kr. — **Ext. ca.** 0·3—0·5 *p. d.* 1·0 = 14 kr.
- *Calami Rad., Rhizoma** (Rad. acori cal.) 0·5—2·0 *p. d.* w proszk., pig., inf. (5·0—15·0:100 Col.); do proszku do zębów, dzieciom do gryzienia. 10·0 = 5 kr.
- Extr. Cal.** 0·1—0·5 *p. d.* 10·0 = 56 kr. — **Oleum cal.** $\frac{1}{2}$ —2 kropli *p. d.* w emuls. — **Tinet. cal.** 10—60 kropli *p. d.* używ. do płuk. do ust, tinct. na zęby. 10·0 = 3 kr.
- *Calcaria chlorata** zob. Calcium hypochlorosum.
- **usta** zob. Calc. oxydat.
- **saccharata** 0·5—1·0 *p. d.*; w dużych dawkach podaje się w zatruciu zgęszcz. kw. karbol.
- *Calcium carbonicum nativum** (Creta alba, kreda) jako proszek do zębów i t. d. 100·0 = 10 kr. — ***Calcium carb. purum** (praecipit., Calcaria carbonic.) 0·20—0·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., mixt.; także zewn. w proszk. 10·0 = 15 kr.
- **chloratum** (fusum) 0·1—0·6 *p. d.* w rozp.; do opatr. 1:24, do oczów (0·1—1·0:100) do kąpieli (30·0—100·0 na kąpiel). 10·0 = 5 kr.
- *C. hypochlorosum** v. *Calcaria hypochlorosa*, calcaria chlora (Chlorkalk) wewn. 0·05—0·6 *p. d.*, 4—6 r. d. pastyll. lub wodnej mixt.: zewn. do płukań (1·0—4·0:100), do peizłow. (0·5—1·5:25), do przestrzykiwań (0·05—0·1:100), do kąpieli 150·0—400·0, maści (1·0—10·0). Do nakadzań i desinfekcyi (rozwiesza się płótna namoczone w rozp. C. hyp.). Podskórne wstrzykiwanie 2⁰/₁₀ rozc. polecane przeciw ukąszeniu jadowitych węzów. 100·0 = 7 kr.
- *C. oxydatum** (Calcaria usta s. caustica) tylko zewn. jako środek żrący, jako Pasta caustica viennensis (zaw. kal. caust. 5 części na 6 cz. Calc. oxyd.). 100·0 = 8 kr.
- **extincta** używ. do wytw. **Aqua calcis** (Aqu. calcariae) wewn. jako antacidum 50·0—200·0 *p. d.* aż do 300·0—600·0 *p. die* z mlekiem; zewn. do płukań, wzięwań, okładów. — **Linimentum calcis** (Stahli) używ. w oparzeniach jest miesz. Aqu. calc. z ol. oliv. *āā*.
- Calcium phosphoricum** (Calcaria phosph.) 0·5—2·0 *p. d.* k. r. d. w pr. 10·0 = 20 kr.

Calcium hypophosphorosum 1·0=3 kr. i **C. sulfur-carbolicum** po 0·2 p. d. k. r. d.

— **sulfuratum** najcz. zewn. w maściach (1·0—3·0:25) do kąpieli (50·0—120·0). 10·0=2 kr.

— ***oxysulfuratum** do solutio Vlemingx'a, do kąpieli. 100·0=20 kr.

— **sulfurato-stibiatus** 0·1—0·3 p. d. 2—4 r. d. w pig., prosk.

— **sulfuricum ustum** czyli gips do opatrunków. 100·0=2 kr.

***Camphora** wewn. 0·03—0·2 p. d. k. r. d. jak excit., 0·3—0·5 p. d. 1—2 r. d. jako sedativ. w prosk. (in charta cerata) pig., mixt., emulz. Także do wziewań, nakadzań, jako prosek do nosa, do płukań (0·2—1·0:100), lewatyw (0·3—1·0), maści (3·0:25) mydeł, do podsk. wstrzyk. (1:12 Spir., albo 1:5 Aeth., lub oliwy); jako excit. całą strzyk. Pravaza na raz). 10·0=6 kr. — ***Ol. camphorat** zaw. 1 C. na 3 ol. oliv. 10·0=6 kr. — ***Spir. camphorat** zaw. 1 C. na 9 Spirit.; do wcierań, zmywań. 1·00=2 kr.

Camphora monobromata 0·1—0·5 p. d. k. r. d. aż do 3·0 p. die w proskach, kapsułkach, pig. kołacz. (trochisci). 1·0=3 kr.

— **carbolisata** używ. do opatr. składa się z 10 cz. rozc. kw. karb. i 25 cz. Camph. pulv.

Cancerorum lapid. pulv. po 0·1—0·3 p. d. do prosków. 10·0=10 kr.

***Cannabis indicae herb.** 0·2—0·5 p. d. w prosk., inf. (2·0—5·0:100—200) do wziewań, do cygaret. 10·0=3 kr.

***Extr. cannabis indicae** 0·03—0·1! p. d. jako sedat., 0·1—0·2—0·3! p. die jako hypn., w pig., past., mixt., rzadko w maściach (0·2—0·5:10). 1·0=8 kr.

Resina cannab. 0·2—0·5 p. d. — **Tinct. cannab. ind.** 5—20 kropli aż do 1·0! p. d. a 4·0! p. die. 10·0=6 kr. —

Haschisch pur. (Churrus) 0·01—0·05 p. d.

Cannabinum purum 0·05—0·3 p. d. i **Cannabinum tannicum** (hypnotic) po 0·25—0·5 w pr. 0·1=6 kr.

***Cantharides** wewn. 0·015—0·05! p. d. k. r. d. aż do 0·2! p. die, w prosk., pig.; zewn. w proszku lub maści (1·0:8—10) w plastrze. 10·0=14 kr.

Collodium Canth. (1:5 Coll.).

***Emplastr. canth. ordin.** (vesicat). 10·0=11 kr. — **Empl. canth. perpetuum.** 10·0=16 kr. — **Oleum canthar.** 1—6 kropli (0·05—0·3) p. d. w kaps., prosk., emulsi; do maści i wcierań.

***Tinct. cantharid.** 0·1—0·5! p. d. aż do 1·0! p. die; zewn. jak canth. 10·0=6 kr.

Cantharidinum do zewn. użytku i **Cocain cantharidin** polec. do wstrzyk. pods. w grzłicy krtani. (0·0001). 0·01=6 kr.

***Capilli Veneris Hb.** 10·0=2 kr. i **Syrup Capill. Vener.** 10·0=4 kr.

Capsici fructus 0·05—0·2 p. d. 3—4 r. d. w pr., pig.; zewn. do katapl. 10·0=4 kr.

- Tinct. capsici** 10–30 kropli (0·3–1·0) *p. d.* z wodą lub klej-
kiemi śr.; zewn. do wcierań, krople do zębów. 10·0=4 kr.
- ***Carbo ligni depuratus** (Carb. vegetabilis) 0·5–2·5 *p. d.*
w proszk., zewn. do proszku do zębów, do płukanek (3·0–5·0
:100), do maści (10·0:25·0). 100·0=14 kr. Tak samo używ.
- **Carb. animalis.** 1·0=3 kr. — **Carb. panis.** 10·0=5 kr. —
Carb. spongiae. 10·0=10 kr.
- ***Cardamomi fructus** (semen) 0·3–1·0 *p. d.* jako składnik
Species arom., niekt. tinct. i innych śr. 1·0=4 kr.
- Cardui benedicti Hb.** 1·0–2·0 *p. d.* w proszk., inf. lub
decoct. (5·0–15·0:100). 10·0=5 kr. — **Extr. card. ben.**
0·5–2·0 *p. d.* 2–3 r. d. w pig., mixt. 1·0=2 kr.
- Carpainum hydrochloricum** alkaloid z grupy Sparteiny
stos. w angina pectoris i w wadach serca 0·006 *p. d.* aż do
0·03 *p. die.*
- ***Carraheen** Dct. 3·0–5·0:100–500 Col. 10·0=2 kr.
- ***Carvi fructus** (Sem.). 10·0=5 kr. — **Ol. carvi.** 1·0=4 kr. —
Spirit. carvi mają podobne zastos. jak Anis fr.
- ***Caryophylli** (flores) wewn. po 0·3–0·6 w proszk., inf. (2·0–
6·0:100–200 Coll.), do proszku do zębów, do płukania i
tict. 10·0=8 kr. — **Oleum caryoph.** $\frac{1}{2}$ –2 kropli, zewn.
do nacierań. 1·0=2 kr.
- Cascarae sagradae cortex** czyli **cortex Purshiani**
0·5–2·0 *p. d.* w inf. 10·0=3 kr. — **Extr. fluid Case.**
Sagr. $\frac{1}{2}$ –1 łyżeczki k. r. d. do 4·0 *p. d.* a 10·0! *p. die* czy-
ste albo w syropie. 10·0=10 kr.
- Cascarae amargae cort.** także jako extr. fluid. po 40–50
kropli *p. d.* 2–4 r. d. (w syphilis). 1·0=3 kr.
- ***Cascarillae cortex** 1·0–2·0 *p. d.* k. r. d. w pr. lub lepiej
w inf., decoct. (10·0–20·0:100–200) Col.). 10·0=5 kr. —
Extr. Cascarillae 0·3–1·5 *p. d.* w pig. 1·0=4 kr. —
***Tinct. Cascar.** 20–40 kropli aż do 10·0 *p. die.* 10·0=5 kr.
- ***Castoreum (canadense)** 0·1–1·0 *p. d.* 2–4 r. d. w pig.,
proszk. 0·1=7 kr.
- ***Tinct. castorei** 10–60 kropli *p. d.* 1·0=5 kr.
- Cast. sibiricum** tak samo jak canad. (droższe).
- ***Catechu** (Terra japonica) 0·5–1·5 *p. d.* w pig., proszk., rozp.
w wodzie lub alk. (3–5 $\frac{0}{10}$); do proszku do zębów, do past
i tinctur. 10·0=7 kr. — ***Tinct. catechu** 10–60 kropli
p. d.; 10·0=4 kr.
- ***Centauri minoris Hb.** 1·0–2·0 *p. d.* w proszku; w inf.
(5–15 $\frac{0}{10}$). 100·0=40 kr.
- ***Extr. cent. min.** 0·5–2·0 *p. d.* 2–3 r. d. pig., mixt.
10·0=33 kr.
- ***Cera alba** 10·0=5 kr. i ***flava** 10·0=4 kr. wewn. w emuls.
(15·0:200 z żółtkiem lub 15·0 gummi arab.); jako constit. do
maści, plastrów, świeczek itd.
- **japonica** tak samo. 10·0=3 kr.
- Cerasorum syrupus** corrig. i const. 10·0=6 kr.
- ***Ceratium fuscum** zob. Plumbum.
- Cereoli** laseczki giętkie, cienkie; mogą być pociągane środk.
lecnicz. i wprowadzone w rozm. przewody, przetoki i t. d.

Cerium oxalicum 0·05—0·1—0·3! *p. d.* aż do 1·0! *p. die* w proszk. lub pig.; polec. w vomitus gravid, dyspeps. 1·0 = 2 kr.

Cerussa zob. Plumb. carb.

***Cetaceum** (sperma Ceti) przeważn. zewn. do plastrów, maści (1:2 ol. oliv.) 10·0 = 5 kr.

Ceratum cetac. 10·0 = 8 kr.

Cetrarinum (otrzym. z lichen. islandic.) w pig. po 0·05—0·5 *p. d.* pół godz. przed jedz., poprawia apetyt. 0·10 = 30 kr.

***Chamomillae vulg. flores** 1·0—5·0 *p. d.* w proszk., inf. (5·0—15·0:100—200 Col.) do species; zewn. do suchych lub wilg. okładów, do przestrzykiwań (25%) do kąpieli (300·0—750·0 na kąpiel). 10·0 = 5 kr. — **Aqu. chamomill.** do mixt. 100·0 = 10 kr. — **Extr. Chamomill** 0·5—1·5 *p. d.* 1·0 = 2 kr. — **Ol. Chamomill. aeth.** $\frac{1}{2}$ —2 kropli *p. d.* 0·1 = 8 kr. — **Syr. Chamom.** Corrig. 10·0 = 4 kr. — **Tinct. Chamom.** 10—30 kropli *p. d.* 2—4 r. dz. 10·0 = 3 kr.

Chelidonii Hb. 10·0 = 2 kr. — **Extr. Chelidonii** 0·1—0·5 *p. d.* w pig., mixt. 1·0 = 6 kr.

***Chenopodii ambrosioides Hb.** 0·5—4·0 w proszk. spec. Inf. (10·0—30·0:100—200 Col.); do okładów. 10·0 = 3 kr.

***Chinae cortex fuscus** 10·0 = 10 kr., **Cort. chin. calisayae** 10·0 = 16 kr. i **Cort. chinae ruber** 10·0 = 40 kr. (Pharmakopea nie rozróżnia poszczególnych rodzajów kory tylko oznacza, że ma zawierać przynajmniej 5% alkaloidu) 0·5—1·5 *p. d.* w proszk., electuarium, pig., mixt., inf., lub decoct., (5·0—25·0:100—200 Col.); kawa chinowa, czekol. ch., wino chinowe.; zewn., do zasypek, proszku do zębów, okładów; inf. lub doct. do płukania ust, przestrzykiwań, lewatyw. — ***Extr. Chinae aquosum** w 5% rozp. łyżkami 1·0 = 10 kr. i **Extr. Chinae spirituos.** 0·3—2·0 *p. d.* w pig., mixt. i zewn. do tinct. pomad.; — **Tinct. chinae** 1·0—5·0 *p. d.* 10·0 = 6 kr. i ***Tinct. chinae comp.** $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki *p. d.* 2—4 r. dz. kroplami albo w mixt. 10·0 = 4 kr. **Vinum chinae** 10·0 = 7 kr.

Chinidinum hydrochloricum

— **salicilicum** 0·10 = 6 kr.

— **sulfuricum** (Conchinin) 1·0 = 6 kr.

— **tannicum** 0·10 = 6 kr. stos. jak sole chininy.

Chininum czysty alk. 0·03—1·0 w pr., pig., w rozp. w alkoh. lub aeth. mało używ. tylko sole;

Chininum arsenicicum 0·003—0·01 w pig. 1·0 = 18 kr.

— **bihydrochloricum** 0·1 = 4 kr.

— **bihydrobromicum** 0·50—1·0 w proszku lub podsk. (1·0—3·0:10 Aqu.) 0·1 = 4. kr

— ***bisulfuricum** (rozp. w 11 częściach wody) stos. jak sulf. 1·0 = 8 kr.

— **citricum** jak Ch. sulf. 1·0 = 15 kr.

— ***ferro citricum** 0·05—1·0 *p. d.* do 2·0 *p. die* w proszk. pig., rozp. 1·0 = 6 kr.

— **hydro-bromicum** 0·05—0·5 *p. d.* do 2·0 *p. die* w proszk., pig., rozp., podsk. (10%) rozez. alkoh. 1·0 = 9 kr.

- ***Chininum hydro-chloricum** rozp. w wodzie — zastoś wewn. jak sulf.; do zastrzykiwań podsk. (0·15—0·25 : Glycer. aqua $\bar{a}\bar{a}$ 0·5). 1·0 = 9 kr.
- **hydrojodicum** 1·0 = 18 kr.
- **lacticum** łatwo rozpuszcz. w wodzie. 1·0 = 18 kr.
- **phosphoricum** 1·0 = 18 kr.
- **saccharinum** mniej gorzka zaw. 36⁰/₀ sacchar., i 64⁰/₀ chininy, trudno rozpuszcz. w wodzie. 1·0 = 30 kr.
- **salicylicum** 0·1—0·5 *p. d.* do 2·0 *p. die* 1·0 = 12 kr.
- **sulfuricum** jako tonicum 0·03—0·15 *p. d. k. r. d.*; 0·3—2·0 w ciągu 24 godzin w intermittens, neuralgiach, durze i t. d.; po 1·0—2·5 na raz w bardzo wys. goraczk. w proszk., placuszk., pig., w rozp. w wodzie, winie lub mleku; zewn. do wdmuchiwań do nosa, gardła, krtani; do przestrzykiwań nosa, cewki moczow., pęcherza (w 1⁰/₀), do zastrzyk. podskórn. (1·0:10 Aqu. i kilka kropli acid sulf., lub 1:6 Glyceryny) do maści (1:40—80) do czopków, pomad (0·5—1·0:25) 1·0 = 8 kr.
- **tannicum** (2—4 razy większe dawki jak sulf.) w proszkach lub zawiesinie. 1·0 = 8 kr.
- **valerianicum** 0·05—0·5 *p. d.* w pr. i pig. 1·0 = 15 kr.
- Chinoidinum** (2—3 razy większe dawki jak chin.sulf.) 0·1—1·0—3·0 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., w rozp. w wodzie z dodatk. kwasu lub alkoh. 10·0 = 9 kr.
- **hydrochloricum** 1·0 = 15 kr.
- **sulfuricum** 10·0 = 9 kr.
- Chinojodium** (antysept.) 0·2—0·5 *p. d.* 2—3 r. dz.; i zewn. do maści. 1·0 = 2 kr.
- Chinolinum** 1·0 = 4 kr. wewn. nie używany, tylko
- **salicylicum** 1·0 = 8 kr. i
- **tartaricum** 1·0 = 4 kr., jako antysept. i antypyr. po 0·5—1·0—2·0 *p. d.* do 6·0 *p. die* w proszku, mixt., do płukań, wzięwań, penzlowań (3—10⁰/₀).
- Chloralose** poł. chloralu z glikosami, środek nasenny 0·25—0·75 wywołuje sen bez dział. ubocznego. 0·1 = 12 kr.
- Chloralum-butyl hydrat.** zob. Butyl-chloralum hydr.
- Chloralum formamidatum** Chloramid, Chloralformamid. używ. jako hypnot. 4·0 *p. d.* do 8·0 *p. die* w rozp. w wodzie. 1·0 = 6 kr.
- **hydratum** 0·1—2·0 *p. d.* co godz. jako sedat. 1·0—3·0 *p. d.* do 6·0! *p. die* jako hypnot. (dawkę tę można w delir. potator. przekroczyć do 4·0! *p. die* a 8·0! *p. die* a nieraz jeszcze wyżej) w rozp albo pig.; zewn. do lewatyw, czopków (1:4), do zastrzyk. podskórn. (0·5—1·0:100) także do opatryw. ran. atoniczn. wrzodów, rózży (1:10—50 Aqu. albo glyce. 1·0 = 2 kr.
- ***Chlorum solutum** (Aqua chlorata, Aqua chlori) wewn. 2·0—5·0 *p. d.* aż do 50·0! *p. die* w 5-krotnem rozcieńczeniu (in vitro nigro); zewn. jako płuk. do ust, gardła, do zmywań, przestrzykiwań (5·0—50·0:500·0 Aqu.) do penzlowań (1:1—5 syropu lub miodu). 10·0 = 3 kr.

***Chloroformium** wewn. 2—10—20 kropli (0·2—1·0) *p. d. k. r. d.* w syropie albo z klejami, z alkoholem albo eterem, w zawieszynie, w kaps., do wzięcia 2·0—10·0 czysty albo z eterem (1:9); do narzekoży czysty lub z eterem i alkoholem, do maści, liniment., lewatyw (6—20 kropli), do podskór. zastrzykiwań (0·50—1·0). 10 = 6 kr.

Aqua chloroformiata cenny antyseptyk (1·0 chlorof.: 200 Aqu.) wewn. łyżeczkami aż do 150·0 *p. d.* czystej lub w mixturze; do przepłukiwania żołądka (3·0—10·0 chlorof. na 100 Aqu.) 10 = 2 kr.; **Linimentum chloroformi** (1:2 do 10 Ol. Oliv.); **Liquor morphini chloroformiatus** 5 do 25 kropli *p. d.*

Chlormethyl ciecz łatwo ulatniająca się i parą swoją wywołująca miejscowe znieczul., stosowane w neuralg. i lumbag.

Chrysarobinum (niewłaśc. nazw. *Acidum chrysophanicum*) czyli anthrarobinum, araroba, proszek żółty, wewn. stosowany jako wymiot. i rozwalniaj. 0·35—1·0 w pigułkach lub rozp. w alkal. zewn. w maściach (1—5:20) w collodium, w żelatynie (5—15 $\frac{0}{10}$). 1·0 = 6 kr.

Cichorei Hb. i Rad. używane jak *Taraxacum*. 100 = 6 kr.

***Cinae flores** (*Semen Cinae*) wewn. 0·50—2·0 *p. d. k. r. d.* w proszku, mixt., powidl., czekolad., w infus. 10·0—15:100; do lewatyw) 5·0—20·0:50·0—100·0 Aqu.) 10 = 4 kr. *

Extract. Cinae aether. 0·30—2·0. 1·0 = 5 kr.

Cinchoninum purum 1·0 = 5 kr.; **C. hydrochloricum** i **C. sulphuricum** 1·0 = 2 kr., w dawkach o $\frac{1}{2}$ r. większych niż chininum.

Cinchonidinum purum 1·0 = 5 kr.; **C. hydrochloricum** 1·0 = 3 kr. i **C. sulphuricum** 1·0 = 2 kr., stos. jak poprzedni. **C. tannicum** stos. jak Chinin. tannic.

***Cinnamomi cortex** (*chinensis*) 0·20—1·50 *p. d.* w proszku, w powidełk., w maceracyi wodnej l. winnej, w infus. 3·0—15·0:100; consperg. 10 = 6 kr. — tak samo **Cort. Cinnam. Zeylanici** 10 = 10 kr. — ***Aqua Cinnam. simplex** 100 = 11 kr. — ***Aqua Cinnam. spiritiosa** łyżeczkami l. w mixt. 100 = 23 kr. — ***Ol. aether. Cinnam.** $\frac{1}{2}$ do 2 kropli *p. d.*, corrigens. 1·0 = 4 kr. — ***Syrup Cinnam.** (10·0—20·0:100). 10 = 6 kr. — ***Tinct. Cinnam.** 10—60 kropli *p. d.*; dodatek do płuk. zębów i ust. 10 = 4 kr.

Citri fructus jako **succus citri** do mixt., saturacyi, limonad, do płuk., pedz. — ***Ol. citri** 1—3 kropli *p. d.*, corrig. — **Syrup citri** 10 = 6 kr. — **cortex fr. citri** stosow. jak **cort. aurant.** 10 = 5 kr.

***Coca folia**, wewn. 0·30—1·0 *p. d.*, 2—4 r. dz., w proszku lub decoct (2·0—10·0:100—150) 10 = 14 kr.

***Cocainum hydrochloricum** (częściej używ. niż *cocain. purum*, *citrum*, *hydrobrom*, *salicyl.*) wewn. 0·02—0·10! *p. d.* aż do 0·30! *p. d.* w proszku, rozpuszcz. w wodzie, alkoh.; najczęściej zewn. do znieczulenia błony śluz. w 2—20 $\frac{0}{10}$ rozczyynie

- czasem z morfiną; w maściach 0·20—0·30; 10—20
w czopkach 0·01—0·02. 0·01 = 10 kr.
- Coccionella** 10 = 10 kr. i **Carminum** 0·10 = 1 kr. barwik
Cocculi indici fruct. wewn. 0·05—0·20; zewn. w maściach
i decoct. (1—2 $\frac{1}{2}$). 10 = 2 kr.
- Cochleariae herba** 100 = 36 kr.; **Spiritus cochlear**
1·0—4·0 *p. d.* do płuk. do ust, do tynktur zęb. 100 = 20 kr.
- Codeinum hydrochloricum** 0·10 = 11 kr. — **C. sulphu-**
ricum i najw. używ.: **C. phosphoricum** 0·10 = 15 kr.
wewn. 0·015—0·10! *p. d.* aż do 0·40! *p. die* w proszk., pig.
mixt.; do podskórn. wstrzyk. (0·50:10 Aqu.).
- Coffeae semen** 10 = 5 kr.
- ***Coffeinum** (Theinum — Theobrominum) wewn.
0·02—0·20! *p. d.* do 0·60 *p. die* w pig., proszk., pastylk.
podskórn. 0·01—0·02 *p. d.* rozpuszcz w chlorof.
spiryt. 0·10 = 2 kr. — **Coff. citricum** 0·10 = 2 kr.
Coff. hydrobromicum 0·10 = 2 kr. — **Coff. natro-**
natrobenzoicum 1·0 = 12 kr., i **Coff. natro-**
salicylicum 0·10 = 2 kr.
- Colchicinum** 0·0005—0·003—0·009 *p. d.* w proszk., pig., ro-
puszcz. 0·01 = 2 kr.
- Colchici semen** 0·05 = 0·25 *p. d.* w proszk., pig. 10 = 2 kr.
Acetum colchici 1·0—2·0 *p. d.* 10 = 2 kr. — ***Tinct-**
colchici semin. 0·50—1·50! *p. d.* — 5·0 *p. die* cz-
sta lub w mixt. 10 = 5 kr.
- ***Vinum colchici semin.** tak samo 10 = 10 kr.
- ***Colla pisc.** zob *Ichtyocolla*.
- ***Collodium** tylko zewn. jako środek osłaniający 10 = 5 kr.
Coll. elasticum (Ol. ricini 1·0, ol. Terebinth. 5, Colle-
94) 10 = 6 kr.
- ***Colocynthis fruct.** (pulpa) wewn. 0·01—0·3
p. d. — 1·0 *p. die* w proszk., macer., infus. (10·0:1
Aqu. lub vinum) 1·0 = 3 kr. — **Fruct. Colocy-**
thid. praeparat. stos. podob. jak poprz. **Extrac-**
colocynthid. wewn. 0·005—0·01 *p. d.* jako purg.; 0·01
0·05! *p. d.* — 0·20! *p. die* jako drast. 1·0 = 14 kr.
Tinct. colocynthid. 1·0—1·50 *p. d.* — 5·0! *p. d.*
10·0 = 9 kr.
- Colocynthinum** 0·005—0·40 *p. d.* — 0·80 *p. die* w pigu-
0·10 = 25 kr.
- ***Colombo rad.** (Calumba) 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. w proszk.
pig., infus. decoct., 5·0—15·0:100—200. 10 = 6 kr. — **Extrac-**
Colombo 0·30—1·0 *p. d.* — 3·0 *p. die* w proszk., pig., mi-
1·0 = 12 kr.
- ***Colophonium** tylko zewnętrznie; **Empl. oxycroceum**
(Coloph. 1, Cer. flav. 3). 10·0 = 14 kr.
- Collyrium adstring. luteum** 10·0 = 3 kr. zob. *Zincum*
sulphur.
- Conchae marinae praeparatae** wewn. 0·50—2·0 *p.*
w proszk.; zewn. do proszk. zęb. 10·0 = 2 kr.
- ***Cundurango cortex** w infus. macer., l. decoct. (15·0—30
400 aquae ad coll. 200) 1—2 łyżk. *p. d.* 2—4 r. d. 10·0 = 4 kr.

- 2 **Extract. Condur.** 0·2—0·50 *p. d.* 1·0 = 6 kr. — **Vinum Condur.** łyżkami. 10·0 = 10 kr.
- ***Conii maculat. herb.** 0·05—0·30! *p. d.*, — 2·0! *p. die* w proszk., pig., infus. ($1\frac{1}{10}$ — $2\frac{1}{10}$), zewn. do okładów w infus. (1 — $4\frac{1}{10}$), do przestrzykiwań, wziewań (czasem z fol. hyoseyami). 10·0 = 4 kr.
- Conii fructus** 0·05—0·20 *p. d.* 2—4 r. d. 0·80! — *p. die*, **Emplastr. Conii** 10·0 = 5 kr.
- ***Extract. Conii** 0·02—0·20! *p. d.* — 0·60! *p. die* w proszk., pig., rozpuszcz., mixt.; jako woda do ócz (2 — $4\frac{1}{10}$); do wziewań (0·10—0·20:100), do lewatyw (0·10—0·30:150), do maści (0·50—1·0:10·0). 1·0 = 6 kr. — **Tinet. Conii** 5—15 kropli *p. d.* 10·0 = 20 kr.
- Coniinum purum** 0·0001—0·001! *p. d.* — 0·003! *p. die* w pig., kropl., mixt.; zewn. rozpuszcz. w alkoh., w maści (0·01—0·10:10—15), 0·01 = 2 kr. — **Con. hydrobrom.** 0·10 = 20 kr.
- Convallariae majalis herb.** inf. 5·0—10·0:100—150 Col. 10·0 = 2 kr. — **Extr. conv.** 0·1—0·5 *p. d.* aż do 2·0 *p. die*. 1·0 = 6 kr. — **Tra conv.** kroplami. 10·0 = 10 kr.
- Convallamarinum** 0·005—0·06! *p. d.* aż do 0·3! *p. die*. 0·10 = 20 kr. — **Convallarinum** jako purgans po 0·05—0·15 *p. d.* 2—4 r. dz. aż do 0·25 *p. die* 0·01 = 11 kr.
- ***Coriandri fructus** (semen) 0·5—1·5 *p. d.* w proszk., inf., macer. (5·0—10·0:100 Col.). 100·0 = 9 kr.
- Coto cort.** (antidiarrhoic.) 0·02—0·05 w proszku. 1·0 = 2 kr. — **Tinet. coto** 10—15—30 kropli *p. d.* k. r. d. 10·0 = 20 kr.
- Cotoinum** 0·005—0·08! *p. d.* aż do 0·5! *p. die*; w kaps., emulz. i mixt. 0·01 = 4 kr.
- Cort. paracoto** a właściwie **Extr. fluidum** 10—40 kropli *p. d.* 2—3 r. dz
- ***Kreosotum** zob. **Kreosotum**.
- ***Crocus** (szafran) 0·2—1·5 *p. d.* w proszk., powidl., inf. (2 — $5\frac{1}{10}$); do okładów, plastrów, maści. 1·0 = 12 kr. — **Tinet. croci** 10—50 kropli. 10·0 = 22 kr.
- ***Cubebae fructus** 1·0—10·0 *p. d.* aż do 30·0! *p. die* w proszk., pig., tabl.; do przestrzyk. w inf. (10·0—15·0:100 Col.), do lewatyw (5·0—15·0 z żółtkiem). 10·0 = 8 kr. — **Extr. Cubebae** 0·5—2·0 *p. d.* k. r. d. w pig., zawiesinie. 1·0 = 11 kr. — **Ol. Cubeb.** 5—15 kropli. 1·0 = 8 kr.
- Cucurbitae semen** (peponum) ziarenka dyni, po 30·0—60·0 w emulz. przeciw tasiemcowi. — **Ol. Cucurbit.** 15·0—30·0 *p. d.* 10·0 = 10 kr.
- Cuprum aceticum** rzadko wewn. po 0·006—0·06 *p. d.* w pig., proszk., rozp.; zewn. do płuk. (0·1:100), przestrzyk. 0·4—1·0:100), jako woda do ócz (0·1—0·5:100), do maści (1 — $10\frac{1}{10}$). 10·0 = 6 kr.
- **aluminatum** (lapis divinus) tylko zewn. jako żrący, jako woda do ócz (0·1—0·5:100), płukanka (1·0—2·0:100). 10·0 = 15 kr.
- **bichloratum** wewn. po 0·005—0·01 *p. d.* w rozp.; zewn. do desinfekcyi.
- **carbonicum** 0·2—0·5 *p. d.* w proszk., w pig., w wodzie jako odtrutka w zatruciu fosforem, co $\frac{1}{2}$ godziny.

Cuprum chloratum jak bichloratum.

— **nitricum** 0·005—0·007 *p. d.* w pig., lub pokarm. klejkiemi, zewn. 0·1—0·4:100.

— **oxydatum** (nigrum) 0·01—0·1 *p. d.* w proszk., w pig.; w maści (1:8—20). 1·0 = 3 kr.

— ***sulfuricum purum** wewn. po 0·01—0·03 *p. d.*; jako wymiotny po 0·05—0·4! (dzieciom 0·05—0·1 *p. d.* aż do skutku) w proszk., pig., rozp.; zewn. in subst. albo w proszku (1:1—20 sacch.), także w rozp. (0·2—1·0:3·0—100 Aq.), jako żrący i adstring., do penzłow. (0·1—0·2:10 Glyc.), płuk. (0·1—1·0:100), do ocz. (0·05—0·5:100), do przestrzyk. (0·2—2·0:100), do maści (1·0—3·0:10—25) i maść do ocz. (0·1—0·6:10). 10·0 = 3 kr. —

C. sulf. crudum tylko zewn. — **Cup. sulf. ammoniatum** 0·01—0·10! aż do 0·4! *p. die* w proszk., pig., rozp.; zewn. do płukań, przestrzyk. (0·1—0·4:50 Aq.) 1·0 = 2 kr.

Curare 0·001—0·002 rozp w wodz lub alk; do podsk. wstrzyk. (0·1:10 Aq.) rozpocz. od 0·002 ostrożnie w górę aż do 0·02, a nawet 0·15 *p. die*; przed użyciem wypróbować przetwórną żabię. 0·1 = 30 kr.

Cureumae rad. do barw. maści.

***Cydoniae semen** 10·0 = 7 kr. używ. do ***Mucilago Cyd.** (1:50 Aq.) 10·0 = 3 kr.

***Dammar resin.** wchodzi w skład empl. adhaesiv.

Dermatol (poł bism z kw. gallus) proszek bezwonny delikatny, używ. zewn. jak jodoform w proszku, maściach itd., także wewn. w chorob. przew. pokarm. jak bism. subnitr. aż do 2·0 *p. die*. 10·0 = 50 kr.

Diaphtherinum (Oxychinaseptol) proszek w wodzie rozp., nietrujący, antysept. do przepłuk. jam ($\frac{1}{2}$ —2%) 1·0 = 8 kr.

Digitalinum verum, proszek mało rozp. w wodzie, ma dział. podobnie jak inf fol digit.; przetwórną dig. germanicum wewn. po 0·001—0·002! *p. d.* aż do 0·01 *p. die*; przetwory francusk. i angielsk. znacznie mniej 0·00025—0·0005 *p. d.*; także w maściach 0·01 = 3 kr.

***Digitalis folia** 0·03—0·20! *p. d.* 4—6 r. dz. — 0·60! *p. die*, w proszk., pig., infus (0·50—1·0:100 Coll. wyżyć w ciągu dnia). 1·0 = 1 kr. — **Acetum Digitalis** 0·50—1·0 w kropl. mixt. — **Extractum Digitalis** 0·03—0·20! *p. d.*, 1·0 *p. die*. 1·0 = 8 kr. — ***Tinctura Digitalis** 0·50—1·50 *p. d.* — 5·0 *p. die*. 10·0 = 5 kr.

Digitoxin proszek nierozpuszcz. w wodzie, ma działać podobnie jak infus. digit.; niedostatecznie wypróbowany.

Diuretinum (Theobromin. natrosalicyl) proszek biały w wodzie rozpuszcz., działa moczopędnie, nie wpływa na serce. 1·0—2·0 *p. d.*, 5·0—6·0 *p. die* 10·0 = 70 kr.

Duboisinum sulphur. 0·01 = 7 kr. — **D. hydrobromicum** proszek bez smaku i zapachu, działa nasennie, wewn. 0·0002—0·001 *p. d.* — 0·003 *p. die*; podsk. 0·01:1·0 aquae.

***Dulcamarae stipites** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. w proszku, infus., decoct. (5·0—20·0:120 coll), także w species. — **Extract. Dulcamarae** 0·50—1·50 *p. d.* 1·0 = 2 kr.

Dulcin (Paraphenetol-Carbamid.) 200 razy słodszy niż cukier, podobne zastosowanie jak saccharyny.

Elaeosacchara składają się 50 cukru i 1 olej eter.

***Electuarium aromaticum** c. opio (Theriaca) $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki 3—4 r. dz. 10·0 = 5 kr.

***Electuarium lenitivum sennae** 1·0—10·0 łyżeczek. l. w mixt. 10·0 = 6 kr.

***Elemi resina** do maści, plastrów. 10·0 = 3 kr.

Embeliae ribis fructus 4·0—15·0 z mlekiem, stosow. przeciw tasiemcowi.

Elixir amarum łyżeczkę do $\frac{1}{2}$ łyżki p. d. 2—4 r. dz.

— **aurantiorum compositum** 1—3 łyżeczek p. d. k. r. d.

Emetinum purum 0·0005—0·002 jako expector.; 0·005—0·01 jako emetyk, w proszk., rozpuszcz. 0·01 = 10 kr.

***Emplastrum adhaesivum** 100 □ cm. = 6 kr.

— **anglicanum** 100 □ cm. = 25 kr.

— **oxyroceum** (Colophon. 1, Cerae flavae 3) 10·0 = 14 kr.

— **saponatum** (Empl. Diachyl. simpl. 600, Cerae alb. 100, sapo venet. 50, Camphor. 10, Ol. oliv. 40). 10·0 = 5 kr.

Equiseti herba decoct. (5·0—30·0:150—200 coll.). 100·0 = 8 kr.

***Ergotinum** (Extr. sec. cornuti aquos; Bonjean) 0·10—0·50 p. d. — 2·0 p. die w pig., pastyl, rozpuszcz., mixt; podskórnice 0·02—0·20 p. d. (nawet 0·50 p. d.) — 1·0 p die rozp. w wodzie, gliceryn. i wodzie, gliceryn. i alkoh.; do czopków (0·20—0·50:2), do lewatyw (1·0—3·0:100—200 aqae). 1·0 = 6 kr.

— **dialysatum** (Bombellon) 1·0 = 11 kr., stosowany jak poprzedni.

— **citricum** solubile do zastrzyk. podskórnych 0·0002—0·0007 p. d.; — **Cornutinum** (Kobert) 0·0025, w krwotok., poronien. 0·10 = 20 kr.

Eryodictionis Californici fol. (Yerbasanta), **Syrup Er. Calif.** 0·10 = 8 kr.

Eserinum zob. Physostigma.

Eucalypti globuli, cortex—folia 0·50—1·0 p. d. — 16·0 p. die w proszk., infus, decoct. (10·0—30·0:100—150) coll.) co 1—3 godz. w zimnicy; do płukanek, lewat. 10·0 = 2 kr. —

Vinum Eucalypti 1—3 łyżeczki p. d. — **Oleum Eucal.** (Eucalyptolum depuratum) wew. 0·20—2·0 p. d., do nacierañ (1—5:10 Ol. Oliv.), do wziewań, podskór. (0·10—0·50 p. d.). 1·0 = 3 kr. — **Tinctura Eucal.** łyżeczkami — 40·0 p. die, do płukan. i t. d. 10·0 = 5 kr.

Euphorbiae pilluliferae herb. jako antiastmat. w decoct. z winem l. jako **Extract. alkohol.** 0·05 p. d. — 0·10 p. die; jako **Tinet. Eupohrb.** 10—30 kropli p. d. 10·0 = 4 kr.

***Euphorbium resina** do drażniących maści, zasypek. 10·0 = 6 kr.

Euphorinum = Phenylurethanum proszek rozpuszcz. w wodzie z wyskok., wewn. 0·10 p. d. — 1·50 p. die jako antipyretyc.; zew. w maśc., rozp. działa antysept. 1·0 = 15 kr.

Europhen (Kresoljodit). Proszek rozpuszcz. w wysk., chlorof., eterze, ma podobne własności jak jodoform, stosow. w maśc. (2—10 $\frac{0}{0}$). 1·0 = 30 kr.

Exalgin antineuralg. 0·03 *p. d.*—0·12! *p. die* w proszk. l. rozp. w wodzie z dodatkiem alkohol. 1·0 = 25 kr.

Fabae calabaricae zob. *Physostigma*.

— **St. Ignatii** podobne stosow. jak *nux vom.*, dawka o $\frac{1}{2}$ mniejsza.

Farfarae folia et flores jak *folia altheae*. 100·0 = 12 kr.

Fel Tauri (recens) 5·0—15·0 *p. d. k. r. d.* w rozp. mixt., z wod. aromat., do maści, liniment. — **Fel. Tauri inspissatum** 0·50—1·50 *p. d. k. r. d.* w pig. l. jak poprzednie, do maści, liniment., lewat. 1·0 = 2 kr. — **Fel Tauri depuratum siccum i natrium Taurocholicum** w dawk. o $\frac{1}{2}$ mniejsz.

Ferratin połączenie białka z żelazem, w wodzie nierozpuszcz., l. w połączeniu z sodem rozpuszcz., stosow. w niedokrewn., blednicy, 1·0 *p. d.*, 1—3 r. dz. 1·0 = 10 kr.

Ferrum aceticum liquidum (Liquor ferri acetici) 5—20 kropli *p. d. k. r. d.* w aromat. mixt. 10·0 = 4 kr. — **Tinct. ferri acet. aether.** 10—50 kropli *p. d.* 2—4 r. dz. z cukrem, syrop., winem. 10·0 = 8 kr.

Ferrum aceticum siccum 0·05—0·20 *p. d. k. r. d.* w pig. 1·0 = 2 kr.

— **albuminatum liquidum** (Liquor ferri albuminati) $\frac{1}{2}$ —2 łyżeczek *p. d.* 2—4 razy dziennie; podskórn. 0·50—1·0 *p. d.* 10·0 = 4 kr.

— **arsenicicum oxydulatum** 0·003—0·007 *p. d.* 1—2 r. dz. w pig. l. rozpuszcz.

— **bromatum** 0·05—0·25 *p. d. k. r. d.* w pig., rozpuszcz. 1·0 = 3 kr.

— ***carbonicum saccharatum** 0·20—0·50 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig. 10·0 = 12 kr. — **Pillulae ferri carbon.** (Vallet'a) 1—10 pig. *p. d.*

— **chloratum** (muriaticum oxydulat.) 0·10—0·30 *p. d. k. r. d.* w rozp. **Liquor ferri chlorati** 0·20—1·0 *p. d.* 2—4 r. d. w syrop., winie. — **Spiritus ferri chlorat. aether.** zob. *Ferrum sesquichlor.*

— **citricum oxydatum** 0·10—0·60 *p. d.* 2—4 r. d. w pig., proszk., l. syrop.; podsk. z 10% roztworu 0·10 *p. d.*

— ***citricum amonium** 0·20—1·0 *p. d.* w pig., proszk., rozpuszcz. 1·0 = 4 kr. — **ferrum citric. c. chinino citrico** zob. *Chininum ferrocitricum*.

— **hydrooxydatum dialysatum** wew. 5—10—20 kropli *p. d.* zew. jako haemostat i styptic. 10·0 = 4 kr.

hypophosphorosum 1·0 = 3 kr.; syropus ferri hypophosph. łyżeczkami.

— **jodatum** 0·05—0·30 *p. d.*—0·50 *p. die*, w proszk., pig., rozpuszcz. (w glicerynie); do maści (1—2:5—10), do kąpieli (25·0—60·0 na kąpiel). — **Liquor ferri jodati** tak samo jak *ferrum acet. liquid.* — **Ferrum jodatum saccharatum** 0·25—1·0 *p. d.*—2·0 *p. die*, w proszk., pig., pastyl., rozpuszcz. 1·0 = 3 kr. — ***Syrupus ferri jodati** 1·0—6·0 *p. d.* 2—3 r. dz. w mixt. l. *aa* ze syrop. simpl. 10·0 = 8 kr.

— **lacticum** 0·10—1·0 *p. d.* w proszk., pig. 1·0 = 2 kr.

***Ferri malatis extractum** (Extract. ferri pomat.) 0·20—0·60 *p. d.* k. r. d. w pig., l. rozpuszcz. 10·0 = 10 kr. — ***Tinctura malatis ferri** (Tinct. ferri pomat.) 10—60 kropli (0·50—2·0 *p. d.*) k. r. d. w syrup., winie, mixt. 10·0 = 8 kr. — **Vinum ferratum** (Martiatum) zaw. 1 Exfr. ferri pomat : 100—200 wina. 10·0 = 8 kr.

***Ferrum oxychloratum solutum** (Liquor ferri oxychlorati) zobacz. Ferrum sesquichlor. solutum.

— **oxydatum fuscum** 0·20—1·0 *p. d.* w pig., proszk.

— **oxydatum saccharatum solubile** 0·50—3·0 *p. d.* (stos. w zatr. arsenikiem $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ łyżeczki co godzinę). — **Syrupus ferri oxyd. solub.** $\frac{1}{2}$ —2 łyżeczek k. r. d.

Ferrum oxydatum oxydulatum (Aetiops Martialis) 0·15:0·50 *p. d.* w proszk., pig. 1·0 = 2 kr.

Ferrum peptonatum siccum 1·0 = 7 kr. stos. jak F. Alb. solub.

Ferrum phosphoricum oxydulatum 1·0 = 3 kr. — **Ferrum phosphor. oxydatum** stos. jak F. oxydat. oxydul.

***Ferrum pulveratum** 0·10—1·0 *p. d.* k. r. d. 10 = 4 kr.

Ferrum pyrophosphoric. oxydatum 1·0 = 3 kr. stos. jak F. phosphor.

Ferrum pyrophosphorr. c. ammonio citrico 0·10—0·50 *p. d.* w proszk., pig., rozpuszcz. 1·0 = 2 kr. — ***Ferrum et Natrium pyrophosphor.** wewn. tak samo, podskórn. (1:6 Aqu.) 1·0 = 2 kr.

***Ferrum hydrogenio reductum** 0·05—0·20—0·50 *p. d.* 1—4 r. d. w proszk., pig. 1·0 = 3 kr.

***Ferrum sesquichloratum crystalisatum** 10·0 = 5 kr. a z niego ***Ferrum sesquichloratum solutum** (Liquor ferri sesquichlorati) 0·10—0·50—1·0 (2—15 kropl.) k. r. d. w rozpuszcz. mixt.; zewn. jako żrący, czysty albo jako styptic. (1:3—5 Aqu.) na wacie (Gossypium haemostate.); do przestrzyk. (0·10—5·0:100—500 Aqu.), jako woda do ust, oczów, uszu (0·20—4·0:100), jako płukanie (2—5‰), do wzięcia (1·0—20·0:500) do maści, czopków (1·0:2·0—10). 10 = 4 kr.

Ferrum sesquichlor. basicum solutum (Liquor ferri oxychlorat) 5—20 kropli *p. d.* w mixt., syrup., zewn. do obmywania ran. — ***Spiritus ferri sesquichlor. aether.** (Tinct. ferri chlor. aether. Tinct. nervino-tonica Bestuscheffii) 0·30—1·50 *p. d.* (10—50 kropli) k. r. d. czysty lub z środkami aromat., w syrupie, mixt. 10·0 = 6 kr.

***Ferrum sulphuricum** (oxydulat) czyste 0·05—0·50 *p. d.* 2—4 r. d. w proszk., pig., pastylk., rozpuszcz.; jako zasypka z alunem lub węglem; do pęzłow., do przestrzyk., (1—2‰), do okładów (2—5‰), do kąpiei (35·0—100·0 na kąpiel), jako woda do ocz (0·05—0·40:25 Aqu.); do maści, liment. (1·0—10·0:30). 10·0 = 2 kr. — **Ferrum sulphur. crudum** (vitriol) do odwiez. 100 = 2 kr.

Ferrum sulphur. siccum 0·03—0·20 *p. d.* w pigulk. **Liquor ferri sulphur. oxydati** 0·50—2·0 czyli 8—30 kropli. zob. Antidotum arsenici.

Ferrum tartaricum jako kalium ferro tartaricum (Tartarus stibiatus) 0·20—0·50 *p. d.* k. r. d. w pig., mixt., rozpuszcz. 1·0 = 2 kr. — ***Kalium ferro-tartar. crudum** (Globuli Martiales) tylko do kąpieli (30·0:120 czyli 1—4 kul na kąpiel). 1 kula = 20 kr.

***Filicis maris rhizoma** (Radix) 12·0—20·0 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., powidełk., w zawieszynie, rzadko w decoct (30·0—60·0:100 coll.). 10·0 = 6 kr. — ***Extract. filicis maris** 2·0—10·0 *p. d.* w pig., kaps., powidełk. 1·0 = 13 kr.

Foeniculi fructus (semen) 0·50—2·0 *p. d.* w proszk., inf. (5·0—15·0:100) species. 10·0 = 2 kr. — ***Aqua foeniculi** łyżeczk. 10·0 = 8 kr. — ***Oleum foeniculi** 1—3 kropli *p. d.* 1·0 = 4 kr. — Syrupus foeniculi 5·0—15·0 *p. d.* corrig. 10·0 = 3 kr.

Formicae rufae do kąpieli ($\frac{1}{2}$ —1 kilo) — **Spiritus formicarum** 20—60 kropli k. r. d.; zewn. do nacierai, zmywai, kąpiel. 10·0 = 5 kr.

***Frangulae cortex** Decoet (10·0—25·0:100—200 coll.) łyżkami, także do lewatyw. 10·0 = 2 kr.

Fuchsinum (Rosanilinum hydrochloric.) 0·025—0·25! *p. d.* do 0·50! *p. die* w proszk., pig., wodach arom., mixt. 1·0 = 6 kr.

Fungus chirurgorum zewn. jako haemostat.

Galbanum gummi resina (Pencedanum galbanifluum) 0·30—1·0 *p. d.* w pig., do plastr., do lewat. (2·0—6·0) 10·0 = 10 kr.

Galeopsis grandiflora Hb. w infus lub decoct. (15·0—30·0:100). 10·0 = 2 kr.

Gallae (halepenses, turcic.) 0·30—1·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., infus. (5·0—15·0:100) zewn. do zasypek, maści (1:10), kąpiel, (100·0—200·0 na kąpiel), lewat. 10·0 = 4 kr. ***Tinct. gallarum** (0·50—2·0) 10—40 kropli *p. d.*, zewn. do penzl., plukanek, przestrzyk. (5—10‰). 10·0 = 4 kr.

***Gelatina animal. alba** decoct. (1·0—8·0:100 coll.), zewn. do kąpieli ($\frac{1}{2}$ —2 kilo na kąpiel), przeciw odmrożeniom, do lewat., jako constit. do przyrządzania leków. 10·0 = 7 kr.

Gelsemii sempervirent. radices 0·05—0·40 *p. d.* 10·0 = 4 kr. — **Extr. fluid. gels. semp.** 0·03—0·40 *p. d.* — 0·50 *p. die.* 10·0 = 12 kr. — **Tinct. gelsem. semp.** 5—30 kropli *p. d.* 10·0 = 6 kr. — **Gelseminum hydrochloric.** 0·001—0·005 *p. d.* — 0·015 *p. die* w pig. 0·10 = 6 kr.

Gentianae radix wewn. 0·30—1·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., macerac. (alkoh. lub wodzie), w infus. l. decoct. (3·0—15·0:150) 10·0 = 2 kr. — ***Extr. Gentianae** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. w pig., mixt. 10·0 = 18 kr. — ***Tinct. Gentianae** 1·0—2·0 *p. d.* 10·0 = 3 kr.

***Glycerinum** wewn. łyżeczk. lub łyżk. aż do 40·0—100·0 *p. d.*, zewn. czysta lub z wodą do nacierai, peźlow., przestrzyk., lewat. (2·0—3·0), wziew. (czysta lub 1:5—10 aqu.), do tampon., jako const. i excip. rozmaitych środków. 10·0 = 3 kr. — **Glycelaeum** (składa się z Farina amygd. 1, Glycer. 2, Oliv. oliv. 6) do maści, opatrunk. — ***Unguent. glycerini** do opatr. 10·0 = 6 kr.

Gossypium depuratum (wata) — **Gossypii herbacei rad. cort.** 0'30—0'60 *p. d.* w proszk., decoct. (10'0—15'0:100—200 coll.). 10'0 = 4 kr. — **Extr. fluid. goss.** 1'0—5'0 *p. d.* — 15'0 *p. die.* 1'0 = 2 kr.

***Graminis radix** (rhizoma) decoct. (30'0—100'0:100—200 coll.) w spec. jak succus rec. 10'0 = 8 kr. — **Extract. graminis** łyżeczk. 10'0 = 15 kr.

***Granati cortex** w mac., decoct. (30'0—100'0:200—500 coll.). 10'0 = 6 kr. — ***Extr. granati** 4'0—8'0 *p. d.* 2—3 r. dz. w mixt. 10'0 = 50 kr.

Gratiolae hb. 0'10—2'0 *p. d.* — 3'0 *p. die.* w proszk., pig., decoct. l. infus. (2'0—10'0:100—150 coll.). 10'0 = 2 kr. — **Extr. grat.** 0'20—1'0 *p. d.* 1'0 = 5 kr.

Grindeliae robustae flor. jako extr. fluid. 0'20—0'40—1'0—2'0 *p. d.* w asthmie w mixt. l. mleku. — **Extr. grindel.** 0'10—0'15 *p. d.* — **Tinct. grindel.** 10—15 kropli.

***Guajaci lignum** wew. 15'0—20'0 *p. die* w spec., proszk., najczęściej decoct. (15'0—20'0:100—200 coll.). 10'0 = 1 kr. — ***Resina Guajaci** 0'30—1'0 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., pig., zawiesinie (2'0—8'0:100), w mixt. 10'0 = 10 kr. — **Species lignorum** (składa się Lign. Guaj. raspat 5, Rad. ononid. 3, Rad. liquirit. i lign. sassafras āā 1) decoct. (25'0—60'0:500—1000 aq.). 100'0 = 20 kr. — ***Tinct. Guaj.** 15—50 kropli *p. d.* k. r. d. w mixt. 10'0 = 4 kr.

Guajacolum (anticatarrh.) 0'05—0'10 *p. d.* w mixt. 1'0 = 12 kr. — **Guajacol. benzoic.** i **Guaj. carbonicum** stosow. u suchotn. 0'20—0'60 *p. d.* — 5'0 *p. die.* 1'0 = 20 kr.

***Guarana pasta** 0'50—4'0 *p. d.* w proszk., u dzieci 0'30—1'50 *p. d.* 2—3 r. dz. 1'0 = 3 kr.

***Gummi arabicum** 1'0—10'0 *p. d.* w proszk., rozpuszcz., zawiesin. z syrop., jako excip. dla kamfory itd. 10'0 = 8 kr. — ***Mixt. gumm.** (składa się gum. arab. 10, sacchar. 5, aq. 150) łyżeczkami czysta l. do mixtur. — ***Mucilago gum. arab.** (1:2 aq.) czyst. l. w mixt., jako constit. do rozmaitych lek. 10'0 = 5 kr. — ***Pasta gum. albuminata** (ciasto ślazow.). 10'0 = 9 kr. — ***Pulvis gum.** (składa się z amyllum, rad. liquid. āā 1'0, gum. arab., sacchar. āā 2) jako constit. do proszk. pig. 10'0 = 5 kr. — **Syrup. gum.** (składa się mucilag. gum. arab. syr. simpl. āā).

Guttapercha depur. do ustalających opatr., w dentystyce. 1'0 = 8 kr. — **Traumaticinum** (guttap. 1, Chloroform 10) stosow. jak collodium. 10'0 = 10 kr.

Gutti gummi — resina gutti 0'01—0'30! *p. d.* — 1'0! *p. die* w pig., proszk., zawiesinie (0'30—0'50:100). 1'0 = 3 kr.

Haemol i **Haemogallol** organo-metaliczne związki żelaza. Haemol proszek szary. 1'0 = 20 kr. Haemogallol czerwono-brunatny. 1'0 = 12 kr. 0'10—0'50 *p. d.* 3 r. d. w proszk., pastyl.

Hamamelidis virgin. cortex 0'10—0'50 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., decoct. (15'0—30'0:100—200 coll.). — **Extr. fluid. hamamel. v.** 2'0—8'0 *p. d.* 2—3 r. d. 1'0 = 1 kr. — **Extr. ham. v. siccum** (Hamamelin — Hamamelidin)

0·03—0·05 p. d. k. r. d. w pig., do maści (2—4:20—30), do czopk. (0·05—0·10). — **Hazelin** wodny destylat świeżej kory ham. virg. 1·0—2·0 p. d.; zew. do nacierań, okładów etc. 1·0 = 2 kr.

Haematogen żółtawy proszek łatwo rozpuszcz w alkal., organiczny związek żelaza (zawiera 0·07% żelaza).

Hellebori viridis (rad. i rhizom.) 0·03—0·30 p. d. — 1·0—2·0 p. die w proszk., decoct., macer., infus. (0·20—2·0:100., 1·0 = 20 kr. — **Extr. hel. vir.** 0·05—0·10 p. d. — 0·30 p. die. 1·0 = 8 kr. — **Tinct. hel. vir.** 10—30 kropli p. d. 10·0 = 10 kr. **Helleborinum** 0·01—0·03! p. d. — 0·12! p. die w proszk. mixt. 0·10 = 10 kr.

Herniariae glabrae hb. do spec. i decoct. (5·0—15·0:100 coll.). 10·0 = 2 kr.

***Hirudo** (pijawki). 1 szt. = 10 kr.

Homatropinum hydrobromicum (jak atropin) wewn. w pig. 0·001 p. d. — 0·003 p. die przeciw potom nocnym u suchotn., krople do ocz (0·05:10 aq.). 0·01 = 30 kr. — **H. muriaticum** i **sulfuricum** po 0·06! p. d. — 0·20! p. die wskaz. te same.

Hydrargyrum aceticum oxydat. rzadko wewn., najczęściej jako kosmetyk przeciw piegom. rozpuszcz. (1·0—1·50:100 aq.). 0·10 = 1 kr. — **H. acet. oxydulat.** do maści (1·0—2·0:25).

— **aethylo chloratum** podskór. (0·10:10·0 aq.) $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. na raz. 0·10 = 25 kr.

— **benzoicum** w wodzie nierozp. tylko w alkohol., zew. do okładów na ulcera luet. 10·0 = 3 kr.

— **bichlor. corrosivum** (sublimat) wewn. 0·003—0·03! p. d. — 0·10! p. die w pig. (często z opium) rozpuszcz. w alkohol., wodzie (0·10:20, 12—20 kropli); zew. jako środek żrący w rozczyzn. zgęszczonych (0·50—1·0:10 aq., collod., alkoh.), znacznie rozcieńczony jako antysept. do płukań (0·05—0·10:500—1000), do ocz (0·01:25—100), do wzięwań, rozpylań (0·01—0·05:500—1000); do okładów, opatrunk., przepłukiw. (1·0:1000—2000 z dodatkiem soli); do cewki moczowej (0·10—0·20:100), do pochwy (0·30—0·60:100), do nosa (0·01—0·03:100) itd., do penzlowań (0·50—1·0:100 glyc., wody l. alkoh.), do kąpieli (10·0—30·0 na kąpiel), do maści (0·50—1·0:25), podskórnice (10·0:100 aq., albo lepiej Hydrarg. b. chl. corr. 1:100 aq. + 3 Natr. chlorat.), t. j. 0·005—0·01 p. d., 1—2 r. dz. w rozmaite miejsca ciała; także do dezynfekcyi. 1·0 = 1 kr. — **Aqua fagaedenica lut.** (składa się Hydr. bichl. corrosiv. 1·0:100 aq. calcis). 100·0 = 20 kr. — **Aq. fagaed. decolor.** (składa się Hydr. bichl. corr. 1, Ammonium chlor. 2, aq. 100). 100·0 = 20 kr.; używana do opatrunków. — **Hydr. bichl. aluminat. solut.** wewn. w dawk. jak bichl. corr. w mleku, kawie, i t. d., często podskór.: 0·005—0·01 p. d. 1·0 = 5 kr. — ***Hydrarg. bichlor. amoniat.** (H. praecipitat. album) tylko zewn. jako zasypka (1·0:25—50 sacch.), do maści (1·0:

- 10—25). 1·0 = 3 kr. — **Hydrarg. bichl. amoniat. carbamidatum solut.** i **Hydrarg. peptonat. soluble** stosow. jak H. bichl. solut. — **Hydrarg. bichl. cum Natrio chlorat. solut.** jak sublimat. **Unguent. Hydrarg. album.** (składa się Hydr. praecip. albi 1, Paraffini 9). **Hydrargyrum bijodatum rubrum** stosow. jak sublimat. 1·0 = 4 kr.
- Hydrarg. carbolicum** (diphenylicum) 0·02—0·03 *p. d.* 2—3 r. dz. (dzieciom 0·004—0·005 *p. d.*) jako antilueticum. 1·0 = 8 kr.
- ***chloratum mite** (Calomel laevig.) wew. 0·01—0·20 *p. d.* 3—4 r. dz. jako antilueticum; 0·10—0·50—1·0 *p. d.* jako laxans, w proszk., pig.; zewn. jako zasypka do nosa, gardła, ocz, lewatyw (0·10—0·50 z środk. klejkimi), do maści, czopk., podskór. (0·01—0·02 *p. d.*). 1·0 = 3 kr. — ***H. chloratum mite praecipitatione parat.** $\frac{1}{3}$ dawki poprzedn. 1·0 = 4 kr. — **H. chlorat. mite vapore parat.** w dawce o $\frac{1}{2}$ mniejsz. 1·0 = 3 kr. — **Aqua fagaedenica nigra** (składa się: Calomel 1, Aq. calcis 60) do opatr. 100·0 = 10 kr.
- **cyanatum** 0·005—0·03 *p. d.* — 0·10! *p. die* w pig., proszk., rozpuszcz., w ostatnich czasach polecony przeciw dyfter. (0·01:100, eo 2 godz. łyżeczk.), jako woda do ocz (0·05—0·10:100), do okładów, przestrzykiw., podskórnie (0·006 *p. d.*), do maści (0·50—1·50:20—50). 1·0 = 5 kr.
- ***metallicum depurat.** 150—350 *p. d.* 10·0 = 6 kr. — **Pillul. coeruleae** (zawier. Hydrarg. 0·06) 2—8 pig *p. d.* jako laxans. — ***Emplastr. hydrarg.** (H. 1:4). 10·0 = 8 kr. — ***Unguent. hydrarg. ciner.** (1:2) do wcierań miejsc. po 0·50—4·0 *p. die* na jeden raz l. kilka razy wetrzeć (z dodatkiem K. Iod., Camphor., Opium, Bellad. i t. d.), do wcier. przy lues. (1·50—4·0 *p. die*), do czopk. (0·20—0·50—2·50:5 Ol. Cacao, sapo l. cera). 10·0 = 10 kr.
- **formamidatum solut.** do zastrzyk. podskór. 0·01 *p. die*. 10·0 = 7 kr.
- ***jodatum flavum** 0·01—0·05! *p. d.* — 0·20! *p. die* w proszk., pig., past.; zewn. do maści (0·50—5·0:25—50), do maści ocz. (0·10—0·50:10—25). 1·0 = 5 kr.
- **nitricum oxydat.** 1·0 = 5 kr. i **H. nitricum oxydulat.** 1·0 = 3 kr. od 0·004—0·015 *p. d.* — 0·06 *p. die* w pig., rozpuszcz., do maści (Ung. Hydrarg. citrini). do wcierań.
- **oleinicum** do wcierań 0·50—2·0 *p. d.* 1—2 r. dz. (czasem z morfing). 1·0 = 3 kr.
- **oxydatum flavum** (via humid. parat.) (0·006—0·03! *p. d.* 1—2 r. dz. — 0·10! *p. die* w proszk., pig.; zew. jako zasypka czysty (l. z innymi środk.) do nosa, krtani (1:8—50 sacch.), do ocz (1:5—10 sacch.), do maści (0·50—1·0:10—20), do maści do ocz (0·10—1·0:10—20). 1·0 = 4 kr.
- **oxydat. rubrum** (Merc. praecip. rubr.). 1·0 = 4 kr. tak samo jak poprzedni, **Unguent. ophthalmicum** (Hydr. oxyd. flav. 0·10:50 Axung.).
- **oxydulat. nigr.** (Merc. solub. Hahnemani) 0·03—0·20 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszk., pig.; do maści (1·0—5·0:25). 0·10 = 1 kr.

- Hydrarg. peptonatum liquid.** do podskór. wstrzyk.
 — **phosphoricum oxydat.** 0·01—0·06 *p. d.* stopniowo w górę postępuj. w pig., proszk. 0·10 = 1 kr.
 — **praecipit. album** zob. H. bichloratum.
 — **salicylicum** trudno rozpuszcz. w wodzie zwykłej, łatwo w wodzie z dodatkiem soli; jako antiluēt. wew. w pig. 0·01—0·05 *p. d.* 2—3 r. dz., do zastrzyk. podskór., śródmięśniowych (H. sal., kali carbon. $\bar{a}\bar{a}$ 0·10:10 aq.). 1·0 = 8 kr.
 — **sulfoichthyolicum** (składa się Natr. sulfoichtyol. 10, Hydr. bichl. corrosiv. 3) zob. Ichtyol.
 — **sulfuratum nigr.** (Aetiops mineral) 0·10—1·0 *p. d.* 2—3 r. dz. w pig., proszk. 1·0 = 2 kr. — **H. sulfurat. rubr.** (cynober) wewn. tak samo, zewn. do maści, nakadzań i t. d. 10·0 = 10 kr.
 — ***tannicum oxydulat.** 0·05—0·10 *p. d.* 2—3 r. dz. (łatwo resorbuje się) w pig., proszk., czasem wspólnie z acid. tannic. l. opium. 1·0 = 8 kr.
 ***Hydrastis canadensis** (radix-rhizoma) haemostat. 10·0 = 8 kr., najczęściej używ. ***Extr. fluid. hydr. canad.** 0·30—2·50! (5—45 kropli) *p. d.* co 2 godz. aż do 10·0 *p. die* z winem, syrup. l. mixt. 10·0 = 12 kr. — **Extr. hydr. canad. rad. siccum** 0·05—0·25 *p. d.* k. r. d. — **Hydrastinum hydrochloricum** 0·03—0·10 *p. d.* — 0·20 *p. die* w proszk., pig. 0·10 = 20 kr. — **Hydrastininum hydrochlor.** wew. 0·10—0·60 *p. d.* polecany w krwot. macicy; zewn. do maści (0·50—2·0:5 Vaselini). 0·10 = 40 kr.
Hydrochinonum 0·20—0·80! *p. d.* — 1·0 *p. die* w rozp. w proszk.; zewn. (1—2%) do przestrzyk. przy gonorrh., podskór. (10% rozezyn), do maści (1·0:30). 0·10 = 1 kr.
Hydrogenium hyperoxydat. wew. jako **Aq. hydrog. hyperoxyd.** (woda utleniona) czysta l. z dodatk. kropli acid. muriat. łyżeczk. polecana w błonicy (2%), zewn. do opatr., wziewań, płukanie. 10·0 = 3 kr.
***Hydromel infantum** (zaw. inf. lax. Vienn. 30, Syr. mannat 10) łyżeczk. 10·0 = 5 kr.
Hydronaphtholum stosowane jak Naphtol.
 ***Hyoseyami folia** (herba) wew. 0·05—0·30! *p. d.* — 1·0! *p. die* w pig., proszk., zew. do okładów, lewat. (inf. 2·0:100), wziewań (0·50—2·0:500), do okładów, papierosów; 10·0 = 3 kr. — **Extract. hyoseyami** 0·02—0·10! *p. d.* — 0·50! *p. die* w proszk., pig., mixt., zew. do przestrzyk. (1·0—3·0:100), wziewań (0·05—0·30:100), do kąpieli (100—200 na kąpiel), do lewatyw (0·05—0·20 na lewat.), do liniment., maści (1·0—2·0:10), do czopków. 1·0 = 6 kr. — **Ol. hyoseyami fol. coct.** 1·0—2·0 *p. d.* k. r. d. do nacierań, lewat. (5·0—30·0 na lewat.). 10·0 = 2 kr. — **Semen hyoseyami** 0·05—0·20 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig. 10·0 = 3 kr. — **Hyoseyaminum crystallis.** (alkaloid) wewn. 0·001—0·003 *p. d.* — 0·005! *p. die* w proszk., pig., rozpuszcz. do zastrzyków. podskór. (0·001—0·003 jako hypnoticum), umysłowo chorym 0·003—0·005; do maści (1·0—3·0:10). 0·01 = 10 kr. — **Hyoscinum muria-**

- ticum** 0·01 = 20 kr. — **H. hydrobrom.** 0·01 = 15 kr. — **H. hydrojodicum** 0·01 = 20 kr. wew. 0·0002—0·0007 *p. d.* — 0·001! *p. die* w pig., polecany do uspokojenia umysł. chorych, jako midriaticum (0·01:100 aquae).
- Hypnolum** (Monochloralantypirin) kryształki bez smaku, zapachu, łatwo rozp. w wodzie, jako hypnoticum 1·0—2·0 *p. d.* 1·0 = 40 kr.
- Hypnon** (Acetphenon) 0·20—0·50 *p. d.* w kapsułk., perełk., (po 0·05 z dodatkiem gliceryny lub Ol. amygdal) w syropie, mixturze. 0·10 — 15 kr.
- Jaborandi folia** wewn. infus. (3·0—6·0—8·0!: 100—200 coll.); do lew. infus. (3·0—10·0:100—200 coll.). 10·0 = 8 kr.
- ***Jalapae tubera** 0·05—0·30 *p. d.* k. r. d. jako rozwałn., 0·30—0·50 *p. d.* jako purg., 1·0—30 *p. d.* jako drastie. na raz lub in dosi refracta w proszk., pig., powidełk. 10·0 = 10 kr. — **Resina jalap.** 0·03—0·20 *p. d.* k. r. d., 0·30—0·60 *p. d.* 1—2 r. d. (jako drasticum) w proszk., pig. 1·0 = 13 kr. — **Sapo jalapinus** (składa się z Resin a jalap., Sapo medic. *aa* 4) 0·30—2·0 *p. d.* k. r. d. czyste lub z calom., z aloe itd., ***Pillulae jalap.** (Jalap 1 Sapo jalap. 3) 2—10 szt. na raz, jako purg. ***Pillulae laxantes** zob. Aloë. — **Tinet. resinae jalapae** 10—30 kropli *p. d.* k. r. d. 10·0 — 8 kr.
- Jambul** (owoc z drzewa Syzygium jambolanum) polecany w diabetes, w proszku 0·20—0·30 *p. d.* 3—4 r. d. lub jako **Tinet. Jamb.** kroplami. 10·0 = 30 kr.
- ***Ichthyocolla** zob. Gelatin. animal.
- Ichthyolum** b. rzadko wewn. używ. 1·0 *p. d.* — 4·0 *p. die*, najczęściej zewn. do maści (40%₀, u dzieci 10%₀), do podsk. zastrzyk. (0·10:10 Aqu.). 1·0 = 5 kr. — **Ammonium sulfoichthyolic.** 1·0 = 6 kr. — **Lithium sulfoichthyol.** 1·0 = 9 kr. — **Natrium sulfoichthyol.** 1·0 = 7 kr. — **Zincum sulfoichthyol.** 1·0 = 6 kr. — **Hydrarg. sulfoichthyolic.** wewn. w roztworze wodn. 15—20 kropli *p. d.* k. r. d. w chorob. przewodu pokarm., oddech., moczowego, zewn. do pedzłow., maści (1:50) itd.
- Jequirity** zob. Abri praecat.
- Ingluvinum** stosow. jak pepsinum.
- ***Jodoformium** wewn. 0·02—0·20! *p. d.* — 1·0! *p. die* w proszk., pig., kapsułk., w roztworze w eterze, także perełki jodoform. (0·25 rozp. w eterze); zew. czysty, jako zasypka na rany (5·0!), do wdmuchiwań czysty (lub z cukrem), roztworze w oliwie, alkoh., eterze, gliceryn., do nacierañ, zakraplań, pedzłow., tampon. (1:20 Glycer.) jako spray (z eterem), do lewat. (1:50 białka), maści (1—5:30), do czopków (0·50—1·0), świeczek, gaza jodoform., wata jodoform. 1·0 = 6 kr. — Do odwonienia jodof. używamy Bals. Peruv., faba tonca, acid. carbol., acid. tannic. itd.
- Jodolum** (Tetrajodpyrol) żółtawy proszek, trudno w wodzie rozpuszcz. zawiera 80%₀ jodu, wewn. jako antiluet. 1·0 *p. d.*, zewn. jak jodoform. 1·0 = 16 kr.

* **Jodum** wewn. 0·005—0·03! *p. d.* 2—4 r. dz. — 0·10! *p. die* w proszk., pig. lub rozpuszcz. w alkocho., eterze, glicer., w wodnym roztworze Kalijodat.: zewn. do wzięcia (0·02—0·05:500 Aqu., K. Jod. 1·0) rozpylony lub jako para (z waty) — do papieros., płukanka do ust, gardła (1:100—500), woda do ocz (0·05:100), do okładów, zmywań (2·0—5·0:100), do kąpieli (5·0—15·0 na kąpiel + 10·0—20·0 K. Jod.), do przestrzyk. (0·05—0·50 Jodi, 2·0—2·50 K. Jod., 30·0—100·0 Aqu.), do maści (0·50—1·0:10—20) do liniment., plastr. (0·50—2·0:50); w roztworach zgęszcz., wodn., glicer., jako środek żrący. 1·0 = 6 kr. — **Solutio jodi Lugoli causticum** (składa się jodi 1, K. Jod. i Aqu. *āā* 2) i **Glycer. jodi caust.** (składa się z Glycer. 2·0, Jodi, KJ. *āā* 1·0) oba jako środki żrące. — * **Tinct. jodi** (Jodi 1, Alcoholi 16) wewn. 0·10—0·30! *p. d.* — 1·0! *p. die*; zewn. do penzłow. skóry, błon śluz., czysta (lub z coll. glicer.) do okładów (1·0—5·0:25 Aqu.) do zakrapl. (0·50—1·0:100—200 Aqu.), do lewat. (1·0:10—20 Aqu.), do płukań, wzięcia. 10·0 = 10 kr. — **Tinct. jodi aether.** (Jodi 1, Aether 12). 1·0 = 2 kr. — **Tinct. jodi fortior** (Jodi 1, Alcohol. 8).

Jodum trichloratum wewn. z roztworu 0·10:120—150 łyżeczk., w dyspeps.; zewn. do przestrzyk. w blenorrh (0·10:120) 1·0 = 18 kr.

* **Ipecacuanhae radix** 0·005—0·05 *p. d.* jako expect. styptic. diaphoret. cholag. itd.; 0·30—1·0 *p. d.* jako emetic. w proszk., pig., macer., infus. (0·10—1·0:100—200 col. jako expector.; 1·50:100—200 col. jako emetyk) do lewat. w infus. (1·0—2·0:100). 1·0 = 5 kr. — **Extr. ipecacuanh.** 0·05—0·20 w proszk., pig., rozpuszcz. — * **Pulvis ipec. opiatu (Pulv. Doveri)** zob. opium. — * **Syrupus ipecac.** corrig. i adjuvans., czysty łyżeczk. jako expector. lub łyżkami jako emetyk. — * **Tinct. ipecac.** 5—15 kropli. *p. d.* — 50 kropli, jako emetyk. — * **Trochisci ipecac.** (zaw. ipecacuanh. 0·005) 1—3 szt. jako expector. 10 szt. = 6 kr. — **Vinum ipecac.** kroplami (do 30) jako expect.; łyżeczk. jako emetyk. 10·0 = 16 kr.

* **Iridis florent. rad.** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. jako expector., często jako constit. do pig., corrig. itd. 10·0 = 7 kr. — **Iridis versicolor. rad.** 0·50—4·0 *p. d.* k. r. d. — **Extract. fluid. irid. vers.** 5—15 kropli *p. d.* — **Iridinum** 0·05—0·20 w pig. 0·01 = 5 kr.

Juglandis regia folia (antiscropholos.) wewn. w decoct. 5·0—15·0:150) także jako species, zewn. jako zasypka, do przestrzyk. w infus. — do kąpieli (300·0—500·0 na kąpiel. 100 = 9 kr. — **Extract. juglandis** 0·20—1·50 *p. d.* k. r. d. 1·0 = 3 kr. — **Juglandinum** 0·10—0·25 *p. d.* k. r. d.

Juniperus fructus (baccae juniperi) wewn. 1·0—2·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., powidełk.; w infus. (10·0—15·0:150 coll.) zewn. do wzięcia, nakadzań, kąpieli (w inf. 150·0—200·0:1500). 100 = 10 kr. — * **Ol. Juniperi** 2—6 kropli *p. d.* k. r. d. zewn. do nacierań, maść. 1·0 = 2 kr. — **Roob**

Juniperi lyżecz. czysty lub w mixt. 10·0 = 8 kr. — ***Spirit.**
Juniperi stosown. jak poprzed. 10·0 = 3 kr. — ***Unguent.**
Juniperi. 10·0 = 6 kr.

Kalium causticum fusum zob. Kalium hydrooxydat. fus.

— **aceticum siccum** 0·50—4·0 *p. d. k. r. d.* w rozpuszcz. pig., także do wachania. — ***K. aceticum solutum** (Liq. kali acet.) 2·0—12·0 *p. d. k. r. d.* — 30·0 *p. die*, czysty lub w mixt. 10·0 = 6 kr.

— **arsenicum** solut. (Liq. kali arsen.) zob. Acid. arsenicos.; **bicarbonicum** 0·20—1·50 *p. d.* w proszk., rozpuszcz., limoniad. burzących; zewn. jako woda do ust (2·0—10·0:100), do przestrzyk., lewatyw. 10·0 = 5 kr.

— **bichromicum** (K. chromic. rubrum) b. trujący, wewn. rzadko używ. (0·01! *p. die*) zewn. jako środek żrący przy owrzodzeniach nowotworów. 10·0 = 3 kr.

— ***bromatum** wewn. 0·30—2·0 *p. d. 2—4 r. d.* 5·0—10·0! *p. die* (także 1·0—2·0 *p. d.* co godz. w epilepsyi) w proszk. lub rozpuszcz.; zew. do maści (1·0—5·0:10), czopk., penslow., (1:5), wziewań (1·0—10·0:500), przestrzyk. w blennorrh. (K. bromat. 1, glycer. 2, Aqu. 20), do lewatyw (2·0—5·0:100) 10·0 = 7 kr.

— ***carbonicum** (purum e tartaro) wewn. 0·10—1·0 *p. d. 2—4 r. dz.* — 5·0—10·0 *p. die* rozpuszcz. lub w saturacyi (1·0:15 octu. lub succ. citri.); zewn. jako woda do ocz (0·05—1·0:100) do wziewań (1·0—5·0:500). 10·0 = 4 kr. — ***K. carbon. crudum** tylko zew. do kąpieli (100·0—500·0 na kap.). 100 = 11 kr. ***K. carbon. solutum** (Liq. k. carbonici) zewn. do okładów, miejscowych kąpieli (2·0—25·0:1000), do przestrzyk., lewatyw, maści (1·0—5·0—10). 10·0 = 2 kr.

— **chloratum** 0·20—5·0 *p. d. k. r. d.* w proszk. lub rozpuszcz. 10·0 = 3 kr.

— ***chloricum** wewn. 0·10—1·0! *p. d. k. r. d.* — 8·0! *p. die* (u dzieci z większemi dawkami b. ostrożnie, najwyżej 1·0—2·0 *p. die*) w rozpuszcz.; zewn. jako płukanka do ust, gardła, (2·0—5·0:100); do wziewań (1·0—10·0:500), penslow. (1·0:5—10 glycer. lub syropu), przestrzyk., okładów. 10·0 = 4 kr.

— **chromicum neutrale** wewn. 0·10—0·60 *p. d. k. r. d.* w rozpuszcz.; zewn. w roztworze zgęszcz. jako środek żrący. 10·0 = 3 kr.

— **cyanatum** wew. 0·01—0·03! *p. d.* w rozpuszcz., także zew. do maści, opatr. 1·0 = 6 kr.

— ***dichromicum** zob. K. chromicum.

— ***hydrooxydatum fusum** (Kal. caustic. fusum — lapis causticus chirurgorum) wew. 0·01—0·15 *p. d. 2—3 r. dz.*, rozpuszcz. w alkohol. (Tinct. kalina); zew. jako środek żrący in subst., woda do ocz (0·05—0·10:25), do zmywań, opatrunk. (2—4‰), kąpieli miejscowych i ogólnych (30·0—100·0 na kąpiel). 10·0 = 10 kr. — **Liquor kali caustici** wew. 1/2—4 kropli (0·02—0·40); zew. jak poprzedzający, tylko w dawce dwa razy większej.

— ***hydrotartaricum** (Tartarus depuratus, Cremor Tartari) wew. 0·50—2·50 *p. d. k. r. d.*, jako laxans 4·0—8·0 *p. d.*

- 1—2 r. dz., w proszk., powidłach, kęsach, mixt.; zewn. jako proszek do oczów, zębów; do kąpieli (60°0—100°0 na kąpiel). 10°0 = 6 kr. — **Serum lactis acidum** (K. hydrotart. 1°0:100 Serum lactis) łyżeczk.
- ***hypermanganicum** (permanganicum) **crystallisa-**
tum rzadko wew. po 0°05—0°15 *p. d.* 2—3 r. dz. rozpuszcz. w wodzie; zew. w ropuszcz. (0°50—1°0:200) jako desinficiens, jako płukanie do ust, gardła (łyżkę 1°/0 roztworu na szklanke wody), do wziewań, rozpyl. (1/2—1°/0), do penszów. (5—10°/0), zastrzyk. podskór. (1°/0), polecane przeciw ukąszeniu wę-
żów jadowitych. 1°0 = 1 kr.
- **hypochlorosum solutum** (Aqua Javelli) tylko zew. 100°0 = 12 kr.
- ***jodatum** wew. 0°10—0°50 *p. d. k. r. d.* — 5°0—15°0 *p. die*, rozpuszcz. l. w pig.; zew. do wziewań i rozpylań, do płu-
kania ust, gardła (0°50—5°0:100), do okładów (1°0—2°0:100), do kąpieli miejscow. i ogólnych, do nacierań (5°0—15°0:100 spirit.), do maści (1°0—5°0:20—25), do zastrzyk. podskór., miąższ. (0°50—2°50:500 1—2 strzykaw. 1—3 r. dz.). 10°0 = 33 kr. — **Ung. kali jodati** (składa się Kali jod. 20, Natr. thyosulf. 0°25, Aq. 15, Adeps suil. 165).
- ***natrio tartaricum** (Tartarus natronatus, sal Seignetti) wew. 0°50—2°0 *p. d. k. r. d.* w proszk. l. rozpuszcz.; jako lax. 15°0—50°0 w kilku dawkach, także w lewatyw. (15°0—30°0 *p. d.*). 10°0 = 3 kr.
- ***nitricum** (purum — saletra oczyszczona) wew. 0°20—1°0 *p. d.* — 10°0 *p. die* w rozpuszcz., proszk.; zew. jak K. chloricum. 10°0 = 3 kr. — **Nitrum tabulatum** (Sal Prunellae) kołaczyki zaw. 0°20 K. nitr.
- **osmium** 0°001 *p. d.* — 0°01 *p. die* w pig., podskórnie 1°/0 roztworz. 0°10 = 50 kr.
- ***permanganicum** zob. K. hypermanganicum.
- **silicium** (szkło wodne) wew. 0°50—1°0 *p. d.* 2 r. dz. w roz-
puszcz.; zew. w bólu zębów itd., do opatrunk. 100°0 = 15 kr.
- ***Kalium stibio tartaricum** (Tartarus stibiat-
us, T. emeticus) wewn. 0°005—0°02 *p. d. k. r. d.* (expect. diaphoret. itd.), 0°05—0°10—0°20! *p. d. co* 10—
15 minut (emetic.) w proszk., rozpuszcz., pastylk., mixt.; zewn. do opatr., okład. (0°05—1°0:100) jako woda do ocz. (0°10—1°0:100), do wcierań (10°/0), lewat. (0°10—0°30:50—150 Aqu.), do zastrzyk. przy blennor. (0°10—0°20:100) do czopk. (0°10—0°30:5—10 B. Cacao), maść (0°10—0°50:10) do maści drażniących (1°0—2°0:10). 1°0 = 2 kr. — **Ung. Autenriethi** (Tartar. stib. 2 Ung. paraff. 8). — ***Vinum stibiatum** (1:250 Malag.) 10—40 kropli *p. d. k. r. d.*; jako wymiotne 15°0—40°0 *p. d.* 10°0 = 10 kr.
- ***sulfuratum** (Hepar sulfur. kalinum) wewn. 0°05—0°40 *p. d.* 2—4 r. dz. w pig., rozpuszcz., mixt. zewn., do zmywań (5—15°/0), maści (1°0:5—10). 10°0 = 10 kr. — ***Kal. sulfur. pro balneo** zewn. jak poprzedni, do kąpieli (30°0—150°0 na kąpiel), 100 = 16 kr.

- Kalium sulfuricum** wewn. 0·50—2·50 *p. d.* k. r. d. — 8·0—15·0 *p. die* jako lax. w rozpuszcz. l. proszku.
- **tartaricum** (Tarturus tartarisatus) wewn. 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. (jako diuret.) — 20·0 *p. die* w proszk., rozpuszcz., mixt. 10·0 = 10 kr.
- **tartar. boraxatum** stos. jak poprzedni. 10·0 = 15 kr.
- ***Kamala** łupka z owocu mallotus philip. wewn. 8·0—12·0 *p. d.* roztażta z wodą lub w powidełk., mixt. 1·0 = 3 kr.
- Kawa-Kawa** (Rad. piperis methystici) inf. i decoct. 4—6‰.
- Kephir** 300·0—1000·0 na raz przed l. po jedzeniu.
- Keratinum** używ. do obciążania piguł., które mają przejść żołądek niestrawione. 1·0 = 30 kr.
- Kola nuces** (zawiera Coffeinum) inf. (50·0—100·0:100—300 coll.).
- ***Kosso** (Kusso) flor. wewn. 20·0 w 2 dawk. co $\frac{1}{2}$ godz. w mixt. lub tabletk. 10·0 = 12 kr. — **Kossinum crystal.** wewn. 0·50—1·0 *p. d.* (2—3 r. dz. co $\frac{1}{2}$ —1 godz.) w proszk., pig., 0·10 = 25 kr.
- Kreolinum.** 10·0 = 4 kr.
- Kreosotal** (Kreosot. carbonicum Heydeni) płyn gęsty do miodu podobny, zaw. 92‰ kreosotu, bez zapachu, nie szczypiący, nie drażni żołądka. 2·0—5·0 *p. d.* 1·0 = 10 kr.
- ***Kreosotum** wewn. 0·01—0·10! *p. d.* — 0·50! *p. die* w pig., kapsułk., mixt., zewn. w substancji podobnie stosow. jak acid. carbolie, do okład. (Aqu. kreosoti) do maści (1·0:10). 1·0 = 2 kr.
- Kumys** napój przyrządzany z mleka klaczy kirgizkich, lub z innego mleka.
- Lactuae virosae hb.** 10·0 = 3 kr. jako **Extr.** 0·03—0·60! *p. d.* — 2·50 *p. die* w pig.
- Lactophenin** chemicznie powinowaty z phenacetinem — antineuralg. (ischias), także hypnot., proszek kryst. mało w wodzie rozpuszcz. 0·50—0·80—1·0 *p. d.* — polecany w durze brzusznych u dzieci.
- ***Lactucarium** 0·03—0·30! *p. d.* — 1·0 *p. die*, (jako hypnot. 0·50 *p. d.* — 2·0 *p. die*) w proszk., pig., emuls.; zewn. do collyr. (0·10—0·30:25). 1·0 = 6 kr.
- Laminaria** (digitata) używ. do rozszerzania ujścia macicy itd. 1 pręcik = 30 kr.
- ***Lanolinum** (tłuszcz obojętny) do maści, jako constit. 10·0 = 8 kr. — **Lanolinum anhydricum** (bezwodn.) żółtawą masą, przezroczystą, stosow. tak samo. 10·0 = 10 kr.
- Lapides cancerornm** zob. calcium. carbon.
- Lauri folia** stos. jak folia aurantior 100 = 10 kr. — ***Lauri fructus baccae** 0·20—1·50 *p. d.* w proszk., w infus. (5·0—20·0:100 coll.). 100 = 15 kr. — ***Ol. Lauri** do maści, liniment. 10·0 = 4 kr.
- ***Lavandulae flores** do rozmaitych specjś, kapieli i t. d. 10·0 = 7 kr. — ***Ol. Lavandulae** do maści, liniment. itd. 1·0 = 3 kr. — ***Spirit. Lavandulae simplex** 10·0 = 4 kr.
- Spir. Lavandulae compos.** do wachania, nacierañ, zmywań itd.

Leptandrae virginicae radix i więcej używane **Extract.** 0·50—4·0 *p. d.* czyste l. w mixt. (laxans l. drastic.).

Levistici radix wewn. 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. infus., (10·0—15·0:150) jako diuret. 10·0 = 4 kr.

***Lichen islandicus** wewn. 15·0—30·0 *p. die*, jako species, decoct. (5·0—10·0:100) l. galareta (1·0:3—6). 100 = 10 kr. —

Lichen pulmonarius i **L. island.** ab amaritiae liberat. stosow. jak poprzed. — ***Gelatina lich. island.** 100 = 60 kr. i ***pulverata.** 10·0 = 10 kr.

Lignum campechianum decoct. (5·0—15·0:100), **Extract.**

I. C. 0·50—1·0 *p. d.* k. r. d. 1·0 = 2 kr.

— ***Quassiae** wewn. 1·0—2·0 w proszk., infus., l. maceracyi (3·0—15·0:100 wina). 10·0 = 5 kr. — **Cort. Quass.** 10·0 = 2 kr. stos. tak samo. — ***Extr. Quass.** 0·2—0·6 *p. d.* k. r.

d. w pig., mixt. 1·0 = 13 kr. — **Tinct. Quass.** 20—50 kropli *p. d.* i **Quassinum** 0·02—0·10 *p. d.* 2—3 r. d. 0·10 = 15 kr.

— ***Santali rubri** zew. do nakadzań, proszk. do zębów itd. 10·0 = 1 kr. — ***Ol. Santali ostindicum** 0·03 *p. d.* — 2·0 *p. die* w kapsi. (jak bals. Copaivae). 1·0 = 6 kr.

— **Sassafras** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. zwykle w decoct. (10·0—30·0:100—300 coll.) tak samo **Cort. I. S.** — **Ol. I. S.** 1—5 kropli k. r. d. 1·0 = 2 kr.

***Lini semen** wewn. w decoct. (5·0—30·0:100—300 col.), zew. w decoct. do lewaty, przepłuk., przestrzyk.; do kataplaszm. 100·0 = 18 kr. — ***Placenta sem. lini.** 100·0 = 6 kr. —

Farina sem. lini. ***Ol. lini** do lewat., nacierañ, maści. 100·0 = 12 kr.

***Linimentum ammoniatum, L. ammoniato camphor.** zob. Ammonia.

— ***saponato camphor.** (Opodeldoe) zewn. do nacierañ. 10·0 = 3 kr.

Lipanium stos. jak Ol. jecor. aselli.

***Liquiritiae radix** wewn. w proszk., do spec., infus., jako consp., corrig. i t. d. 10·0 = 5 kr. — ***Extr. liquir.** jako corrig., constit., expect. 10·0 = 20 kr. — ***Succus liquir.**

depuratus. 10·0 = 8 kr. — ***Gelatina Liquir. pellucida.** 10·0 = 6 kr. — ***Pasta liquir. flava.** 10·0 = 6 kr. —

***Puly. liquir. compositus** (Fr. foenicul., Sulf. depurat. āā 1, Rad. liquir., fol. Sennae āā 2, Sacchari 6). 10·0 = 8 kr. — **Syrup. liquir.**

***Liquor acidus Halleri** 3—20 kropl. (0·30—1·0) *p. d.* k. r. d. czysty l. w mixt. (1·0—5·0:100), jako napój (5·0—10·0: litr),

do penzlowań (1·0:10·0). 10·0 = 4 kr.

Lithargyrum zob. Plumb. oxyd. fusum.

Lithium benzoicum 0·05—0·20 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., rozpuszcz., do wziewań (0·50—2·0:100). 1·0 = 6 kr.

— **bromatum** 0·20—5·0 *p. d.* k. r. d. w rozpuszcz. 1·0 = 6 kr.

— ***carbonicum** wewn. 0·05—0·30 *p. d.* k. r. d. — 2·0 *p. die* w proszk., pastyl., rozpuszcz. (Aqua lith. carbon. 0·15:100 Aq.), w sztucz. wod. mineral. (z Kal. l. natr. bicarb.); zewn. do płukań, wziewań (1—3⁰/₀). 1·0 = 5 kr.

— **citricum** tak samo.

Lithium salicylicum biały kryst. proszek bez zapachu, smaku słodkaw., łatwo rozpuszcz. w wodzie, winie; wew. 0'50—1'0 *p. d.* 3—4 r. d. w proszk. l. rozpuszcz 1'0 = 6 kr.

— **sulfo-ichtyolicum** zob. Icthyol.

***Lobeliae inflat. hb.** wew. 0'20—0'50 *p. d.* (jako emet. 1'0—5'0 *p. d.*), częściej w decoct. (2'0—6'0:100). 10'0 = 4 kr. — **Extract. fluid. lobel.** 5—20 kropl. *p. d.* 1'0 = 10 kr. —

***Tinct. lob. infl.** 0'50—1'0! *p. d.*—5'0! *p. die* czysta l. w mixt. 10'0 = 5 kr. — **Lobelinum** płyn żółty oleisty i częściej używ. **Lobelinum sulphur.** 0'05—0'10 *p. d.*—0'20 *p. die* w asthmie.

Loretin proszek żółty, krystal., nietrujący, bez zapachu, polecany zam. jodoformu. 1'0 = 15 kr.

Losophan (Trijodkresol) zaw. 80% jodu, białe krystal. igielki, rozpuszcz. w chlorof., eterze, stosow. w chorob. skóry w maści (3'0—5'0:100), w zasympce. 0'10 = 5 kr.

***Lupulinum** 0'10—1'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., rozpuszcz., w maści (1'0:2—5). 1'0 = 3 kr.

***Lycopodium** wew. 0'50—3'0 *p. d.* w mixt. (5'0—10'0:100), w powidl.; zew. jako consperg. 10'0 = 8 kr.

Lysol płyn przeźroczysty, oleisty, zapachu kreosotu, własności kwas karbolowy, mniej trujący, do opatr. ($\frac{1}{2}$ —1%) 10'0 = 4 kr.

***Macis** 0'20—0'50 *p. d.* w proszk., pig.; jako corrig 10'0 = 11 kr. — ***Ol. macid.** 1—2 kropl. *p. d.* w rozpuszcz., w eterze. 1'0 = 5 kr. — **Tinct. m.** 10—20 kropl. *p. d.* k. r. d. 10'0 = 6 kr.

Magnesia usta zob. Magn. oxydata.

***Magnesium carbonicum** hydrooxydat. (Magn. carbonica alba) 0'20—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., tablet., mixt., w wodzie (Aq. magn. carbon.); zew. jako proszek do zębów, zasyпка. 10'0 = 5 kr. — **Pulvis Magnes. c. Rheo** stosow. tak samo.

— ***citricum** łyżeczk. we wodzie l. limoniadzie. 10'0 = 20 kr. —

***Potio magn. citr. effervesc** (20'0) 1 doza = 56 kr. —

***Magn. citr. effervesc.** (składa się Magn. citr., Natr. bicarb., acid. citric. i sacchar.). 10'0 = 10 kr. — **Magn. boro citricum** 10'0—25'0 *p. d.* in dosi refracta w proszk. l. rozpuszcz. 1'0 = 2 kr.

— ***hydrooxydatum** (Magn. usta) wchodzi w skład Antidot. arsenici albi; wew. 0'30—1'50 *p. d.* jako antacidum (2'0—5'0—10'0 *p. d.* jako purg.) w proszk., pastyl., mixt.

— **lacticum** 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. (jako laxans 10'0—12'0 *p. d.*) w proszk., rozpuszcz. 1'0 = 4 kr.

— ***oxydatum** (Magn. usta) 0'2—2'0 *p. d.* k. r. d.; (5'0—6'0 *p. d.* jako laxans) w past., tablet., mixt., proszk.; zewn. do proszku do zębów. 10'0 = 15 kr. — **Magn. saccharata** (Magn. oxydat, 10, Syr. simpl. Aqu. āā 80) łyżeczkami, jako środek rozwałn.

— **salicylicum** 3'0—6'0 *p. die* stosow. w durze; (6'0—8'0 *p. d.* jako laxans). 1'0 = 6 kr.

***Magnesium sulfuricum** (Sal. Seidlitzensis) 1'0—3'0 *p. d.* k. r. d. w proszk. lub rozpuszcz. jako digestiv., w większych dawkach 10'0—50'0 w proszk., rozpuszcz. w wodzie zawierającej Co_2 jako laxans; do lewatyw (15'0—30'0 na lewatywę) 100 = 10 kr. — ***Magn. sulfur. siccum**, w dawkach nieco mniejszych. 10'0 = 3 kr.

— **sulfurosum** 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d.

— **tartaricum** 0'50—1'0 *p. d.* w proszk. 2—4 r. dz.

Malakin jasno-żółte drobne igielki w wodzie nierozpuszcz. stosowane jako antipyret., antirheumat., ma działać dopiero w kilka godzin po zastosowaniu. 1'0 = 20 kr.

***Maltum Hordei** w proszk. 0'50—1'0, w decoct. (10'0—20'0:100) do płukań, lewat., kąpieli (1—2 klg. na kąpiel). 100 = 12 kr. — **Extract. Malti** łyżeczk. z mlekiem, winem; jako excip. dla różnych środków np. Extr. M. ferrat., jodat. itd. 10'0 = 5 kr.

***Malvae folia** 100 = 14 kr. i ***flores M.** 10'0 = 3 kr. wchodzi w skład species, decoct. (5—15'0:100).

Manganum chloratum 0'10—0'75 *p. d.* w rozpuszcz.; płukanki do ust, gardła (1—4 $\frac{0}{10}$). 10'0 = 10 kr.

— **hyperoxydatum nativum** 0'10—1'0 *p. d.* w proszk., pig., do maści (1'0—3'0:10).

— **sulfuricum** 0'10—0'60 *p. d.* 2—4 r. dz. w dawce 2'0—4'0 *p. d.* zażyć w 2—4 dawkach w ciągu kilku godzin jako laxans; do maści (5—10 $\frac{0}{10}$). 10'0 = 10 kr.

***Manna** wewn. 4'0—10'0 *p. d.* k. r. d., w dawce 50'0—100'0 (u dzieci 30'0—50'0) jako laxans, w rozpuszcz., w powidełk. 10'0 = 12 kr. — ***Syrup. mannatus** łyżeczkami, jako corrig.

***Mastix** (Resina Mastich) w dentystyce, także do plastrów. 10'0 = 13 kr.

Matico folia 0'50—2'0 *p. d.* w proszk., pig., w infus. (10'0—30:100). 10'0 = 5 kr. — **Ol. M.** $\frac{1}{2}$ —1 kropli *p. d.* 0'10 = 6 kr.

Tinct. M. 20—40 kropli *p. d.* 2—4 r. dz. 10'0 = 8 kr.

Maidis stigma decoct. (5'0—15'0:100 col.) jako diuret. —

Extr. fluid. M. st. 0'50—1'0 *p. d.* 2—4 r. dz. 1'0 = 3 kr. —

Extr. M. ustilaginis fluid. stosown. zam. Secale cornut. 10—20 kropli *p. d.* — 4'0 *p. die.* 1'0 = 3 kr.

Mel crudum i ***M. depuratum** wewn. 50'0—100'0 *p. d.* czysty lub w rozpuszcz. jako laxans, mniejsze dawki jako expector.; zewn. do płukanki ust, gardła, penzlow., katapl., lewatyw itd. 100 = 24 kr. — ***M. rosatum** zewn. do penzl., płukanki. 10'0 = 4 kr.

***Meliloti herb.** do species, plastr. 10'0 = 12 kr. — ***Empl. Meliloti.** 10'0 = 4 kr.

***Melissae folia** infus. (5'0—25'0:160'0); do species, kąpieli. 10'0 = 4 kr. — ***Spirit. M. compos.** 20—40 kropli *p. d.* k. r. d.; do wachania, nacierañ. 10'0 = 4 kr.

***Menthae crispae** 10'0 = 4 kr. i ***M. piperitae folia** 10'0 = 5 kr., stos jak folia Melissae; — ***Ol. M. pip.** wewn. $\frac{1}{2}$ —3 kropli k. r. d. 1'0 = 16 kr. — ***Rotulae M. pip.** 10'0 = 5 kr., — ***Spiritus M. pip.** 20—30 kropli *p. d.* k.

r. d. w mixt. (5'0—10'0:100); zewn. do wachania, nacierań. 10'0 = 4 kr. — **Syrup M. pip.** corrig. 10'0 = 3 kr.

***Mentholum** wewn. w migrenie po 0'30—1'0 p. d. także jako antineuralg., anaesthetic. w proszk., pig.; zewn. w bólu zębów (nacierania 1'0:5'0—10'0 alkoh.), w formie laseczki (Migrainestift), także do wzięwań, penzl. 1'0 = 7 kr.

Methylacetanilid zob. Exalgin.

Methylalum (Methylen, Dimethylaether) rozpuszcz. w wodzie, alkohol., działa w maśc. liniment. (1'0:6—10) kojąco, podskórnie (1'0:4 Aq.) jako nasenny, antidot. dla strychniny. 1'0 = 6 kr.

Methylenum bichloratum anaesthetic., do wcierań (12'0—25'0) czasem z eterem.

Migraenin mieszanina antipyryny, coffeiny, kw. cytrynow. 1'10 p. d. co 2 godz. zwykle 1—2 proszk. przynoszą skutek 1'0 = 20 kr.

Millefolii heb. infus. (5'0—15'0:100) species, zewn. do kąpieli, lewatyw. 10'0 = 1 kr. — **Extr. Mill.** 1'0 = 3 kr. — **Ol. Mill.** 1'0 = 20 kr.

Minium zob. Plumb. oxyd. rubrum.

***Mixtura oleoso balsamica** zob. Balsam vitae Hofmanni.

***Mixtura sulfurica acidula** zob. Liquor acidus Halleri.

Mollinum (składa się z tłuszczu 100, ługu potas. 40, glicy-30% constit. do maści, mydeł. 10'0 = 8 kr.

Morphinum purum 0'02! p. d. — 0'10! p. die.

***Morphinum hydrochloricum** (muriaticum) 0'005—0'03! p. d. — 0'12! p. die, 2—4 r. dz. w proszk., pig., rozpuszcz.; zewn. do pedzłow. (0'50—1'0:20—100) do lewatyw, (0'01—0'03 p. d.) do wzięwań, rozpylań (0'02—0'10:100) jako proszek do wdmuchi- (0'50—1'0:2—10 sacch., gummi arab. etc.), do czopków (0'005—0'002) do maści (1'0—5'0:50), do zastrz. podskórnych i mięsowych (0'005—0'02!). 0'10 = 4 kr. — **Morph. oleūicum** jest to morph. hydrochl. rozpuszczone w Acid. oleūicum 0'05—0'10:3'0 używ. do wcierań.

— **phtalicum** do podsk. zastrz. 0'10 = 7 kr.

— **sulfuricum** stos, jak mor. hydrochloricum. 0'10 = 4 kr.

— **valerianicum.** 0'10 = 10 kr.

Morrholum produkt tranu, zawierający w znacznej ilości jod, 0'20 p. d. w kapsułk. 4—6 kaps. dziennie dla dorosłych, 2—4 kaps. dla dzieci. 1'0 = 7 kr.

Moschus tonquinensis 0'10—0'30—0'60 p. d. co 2—3 godziny (dzieciom 0'01—0'15 p. d.) w proszk., pig., powidełk., emulsyi, do lewatyw (0'50—1'0 na lewat.) podskórnie (0'30—0'60). 0'10 = 60 kr. — **Tinct. Mosch.** 20—50 kropli k. r. d. 1 kropla = 3 kr.

Muscarinum 0'0005—0'002 p. die w pig. l. podskórnie. 0'01 = 24 kr.

***Myristicae semen.** zob. Nux moschata.

***Myrrha** (Gumi resina) 0'20—0'50—1'0 p. d. k. r. d. w proszk., pig., mixt., zawiesinie; do proszków do zębów, do płukanek

ust, gardła, do maści, liniment. 10·0 = 8 kr. — **Extr. m.** tak samo stosowany. 1·0 = 3 kr. — ***Tinct. myrrhae** 10 — 40 kropli *p. d.* k. r. d.; zewn. do płukank ust, gardła (5·0 — 15·0:100), do penzlow. (1·0 — 3·0:10·0 mel.), do przestrzykiwań (1·0 — 10·0:100), do maści (1·0:3·0 — 10·0). 10·0 = 4 kr.

Myrtholum ciecz jasna, dość przyjemnej woni, antysept. stosow. wew. w zgorzeli płuc, bronch. putrida (0·30 *p. d.*) w kapsułk. co 2 godziny. 1·0 = 20 kr.

Napellinum (sedativum) 0·01 — 0·07 *p. d.* k. r. d. w pig., rozpuszcz., także podskórn. 0·01 = 10 kr.

***Naphthalinum** puriss. (alcoh. depurat.) 0·02 — 1·0! *p. d.* — 4·0! *p. die* w proszk., pig., kapsuł., stosow. jako antidiarrhoie. także w durze brzusz. w niezżytach pecherza; zewn. w maściach l. rozpuszcz. w oliwie (1·0:10 — 15), do lewatyw. (1·0 — 5·0:100). 10·0 = 6 kr.

Naphtalolum zob. Betol.

***Naphtolum** (Izo-Beta naphtol) część składowa dziegciu, polecana w chor. skórnych, zew. w rozpuszcz. w alkohol. (2·0 — 10·0:100), w maści (1·0 — 3·0:30·0), w mydlach (2·0 — 15·0:100). 10·0 = 12 kr.

Narceinum 0·01 — 0·10 *p. d.* 2 — 3 r. dz. w proszk., pig., rozpuszcz., do lewat., do czopk. (0·01 — 0·05), także podskórn. 0·01 = 4 kr.

Natrium aceticum 0·50 — 4·0 *p. d.* w proszk., rozpuszcz., w mixtur. 10·0 = 4 kr.

— **aethylicum** pro cauterisatione, środek żrący, stosow. w rozpuszcz. (1·0:3·0). 1·0 = 8 kr.

— **arsenicicum** 0·001 — 0·002 *p. d.* 1 — 2 r. dz. w rozpusz. l. pig., do kąpieli (2·0 — 10·0 na kąpiel), do wzięwań. 0·01 = 1 kr.

— **benzoicum** 0·20 — 1·0 *p. d.* — 15·0 *p. die* w proszk., rozpuszcz., pig., mixt.; zew. do wdmuchiwań, wzięwań (5⁰/₁₀) rozpylań, penzlow.; jako płukanka, woda do ócz. 1·0 = 3 kr.

— ***bicarbonicum** (Natr. carb. acidum, N. hydrocarbonic., Bicarbonas sodae) wew. 0·30 — 1·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., płacusk., mixt., saturacyi, w rozpuszczeniu (Aq. sodae); zew. do płuk., wzięwań (0·20 — 2·0:100), do kąpieli (150 — 400 na kąpiel). 10·0 = 2 kr. — ***Pastillae e natr. hydrocarb.**

(Past. Bilinenses s. de Vichy à 0·10. 10 pastyl. = 14 kr. —

***Pulvis aërophorus simplex** (anglicanus) (składa się Natri bicarb. 2·0 i osobno acid. tartarici 1·50). 10 doz = 30 kr. — ***Pulvis aërophorus laxans Seidlitzensis**

(Natr. bicarb. 3·0, Sal Seignetti 10·0 i do tego Acid. tartaric. 3·0). 10 doz = 80 kr..

— **boracicum** zob. Borax veneta.

— ***bromatum** stos. jak Kali bromat. 10·0 = 8 kr.

— ***carbonicum purum** s. crystallisatum stosow. jak Natr. bicarbon. 10·0 = 4 kr. — **Natr. carbon. crudum** zewn. do kąpieli (¹/₄ kilo — 1 kilo na kąpiel). 100·0 = 3 kr. — ***Natr. carbon. siccum** 0·20 — 1·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig.; — do proszk. do zębów, do maści (1·0 — 2·0:20). 10·0 = 4 kr.

causticum solutum (Liquor natr. caustici) stos. tak samo jak Liquor Kali caustici.

- Natrium chloratum** (sól kuchenna) wewn. 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. łyżeczk. rozpuszcz. przy krwiotłociu, w neurozach — także jako antidot.; zewn. do lewatyw (1—2 łyżki na lewat.), do okładów suchych, oziębiających (1 soli, 2 śniegu lub lodu), do kąpieli (1—5 klg. na kąpiel), do wziewań (1·0—10·0:500). 100·0 = 8 kr.
- **chloricum** 0·50—1·0 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., rozpuszcz. (3·0—5·0:100), do płukań, wziewań jak Kalichloric. 10 = 6 kr.
- **hypochlorosum solutum** (Liquor natrii chlorati Javell'a) 0·20—1·0 (5—15 kropli) *p. d.* k. r. d.; zew. do płukań ust, gardła (3—10‰), do przestrzykiwań (1—5‰), do lewatyw (30—40 kropli), do kąpieli ($\frac{1}{2}$ —1 klg. na kąpiel). 100 = 12 kr.
- **hypermanganicum** jak Kali hypermanganic.
- **hypophosphorosum** (subphosphorosum) 0·50—2·0 *p. die* w rozpuszcz. 10·0 = 20 kr.
- **jodatum** jak Kali jodatum. 100·0 = 43 kr.
- **lacticum**. 1·0 = 3 kr.
- **nitricum** jak Kali nitricum. 10·0 = 3 kr.
- **nitrosus** 0·05—0·15! *p. d.* (w asthmie, epileps.). 1·0 = 12 kr.
- **paracreosotinicum** działanie podobne do acid. salicyl. 1·0—1·50 *p. d.* — 4·0 *p. die*, u dzieci 0·10 *p. d.*, 1·0 *p. die* najlepsze skutki osiągnięto w gastroenteritis acuta u dzieci.
- **phosphoricum** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d.; 20·0—50·0 jako laxans w proszk. l. rozpuszcz. 10·0 = 12 kr.
- **salicylicum** wewn. 0·50—1·0 *p. d.* k. r. (w ostr. gościeu stawow. 1·0—2·0 *p. d.* co godzinę) u dzieci 3·0! *p. die*, w proszk., pig., rozpuszcz., mixt.; zewn. do przestrzykiwań, lewatyw. 1·0 = 2 kr. — **Nar. borosalicylicum** 0·50—2·0 *p. d.* k. r. d. rozpuszcz. w wodzie l. alkoholu. 10·0 = 30 kr.
- **silicicum** (Liquor natrii silicii) wewn. 0·10—0·25 *p. d.* k. r. d. w pig., rozpuszcz. (w wodach alkalicz.); zewn. do przestrzykiwań (1—20‰), do zmywań, opatrunk., lewat. 100·0 = 16 kr.
- **subsulfurosus** 0·50—1·50 *p. d.* — 5·0 *p. die* w rozpuszcz. do kąpieli siarczanej. (50·0—150·0 na kąpiel z dodatkiem 30·0—60·0 octu). 10·0 = 1 kr.
- **sulfoichthyolicum** zob. Ichthyol.
- **sulfuricum** crystall. (Sal mirabile Glauberi) 1·0—2·50 *p. d.* k. r. d. (jako laxans 10·0—50·0 *p. d.*) w proszku, emuls., w wodach mineral. (sztucznych), do lewatyw (10·0—50·0). 100·0 = 11 kr. — **Natr. sulfur. siccum** w dawce o $\frac{1}{2}$ mniejszej. 10·0 = 4 kr. — **Sal thermar. Carolin. artific.** łyżeczk. aż do 15·0 w rozpuszcz. 10·0 = 6 kr.
- Nerium oleander** i **Tinct. ner. oleandr.** ma działać podobnie jak Folia digitalis 10—15 kropli *p. d.* 10·0 = 1 kr.
- Neurodinum** antineuralg., antipyretic. 1·0 *p. d.* 1·0 = 20 kr.
- Nicotianae folia** (tytoń) wewn. 0·03—0·15 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., infus. (0·20—1·0:150), do lewatyw (0·50—2·0:100—150 coll.), do kąpieli (15·0—60·0 na kąpiel), do zmywań (5·0—10·0:100); jako woda do ocz (inf. 0·50—1·0:25). 10·0 = 8 kr. — **Nicotinum** 0·001—0·003! *p. d.* w rozpuszcz. w alkoholu l. w klejkach pokarmach. 0·01 = 2 kr.

Nitroglycerinum (Glonoinum) z 1% rozczynu alkohol. od 1 do 10 kropli. (0·0001—0·0005) powoli dawkę powiększając, 3 r. dz. przeciw stanom astmatycznym, w połowicz. bólu głowy, także podskórnie (20—30 kropli, 1% alkohol. rozczynu : 10 Aquae). 1·0 = 10 kr.

Nucleinum wyciąg ze śledzion cieląt, proszek bezbarwny, rozpuszczalny w alkaliach, ma posiadać własność pomnażania ciałek białych krwi (leukocytosis); podskórnie (2·0—3·0). 0·10 = 60 kr.

***Nux moschata** (semen Myristicae) stosow. jak Macis w dawkach 2 razy większych. 10·0 = 14 kr. — ***Ol. N. m. expressum** do maści, liniment, plastr. 1·0 = 2 kr.

Oleum amygdalarum zob. Amygdalae.

— **animale aether.** (Dippelii) 5—20 kropl. postępując z dawką w górę, w pig., kapsułk. 1·0 = 3 kr.

— ***Bergamottae** 1—4 kropl. p. d. k. r. d. 1·0 = 4 kr.

— ***Cadinum** zob. Ol. Juniperi empyreumat. 10·0 = 2 kr.

— ***Crotonis** wewn. 0·006—0·025! ($\frac{1}{2}$ —2 kropli) p. d., w pig., proszk., kapsułk., rozpuszcz., w emulsyi; zew. do nacierañ (w równych częściach z olejami), do lewatyw (1—2 kropl. : 100—150 emulsyi). 1·0 = 3 kr.

Sapo croton.

— **hydrargyri** (cinereum) gęsty olej złożony z 3 części rtęci utartej z lanoliną i 4 części Ol. olivarium — używany do podskórnych wstrzykiw. przy leczeniu kiły. 0·10—0·15 p. d. 1·0 = 5 kr.

— ***Jecoris aselli** 1—8 łyżek (dzieci 1—4 łyżeczek.) p. d. 2—3 r. dz. czysty, w kapsułk., emulsyi, żelatynie, albo z żółtkiem z dodatkiem 10 kropl. Ol. menth. pip.; zewn. do nacierañ, lewat. jako excip. do rozmaitych środków. n. p. Ol. jecor. as. ferratum, jodoferratum itd. 100·0 = 13 kr.

— ***Juniperi empyreumat.** (Ol. Cadinum). 1·0 = 2 kr. zob. Juniperus.

— ***Olivarium.** ***provinciale** wewn. łyżeczek.; do liniment., emulsyi, ***commune** do nacierañ, maści, plastrów, lewat. 10·0 = 3 kr.

— **Petrae italicum** zob. Petrol. 100·0 = 30 kr.

— ***Pini pumilion.** zew. do nacierañ, wziewañ, rozpylań. 1·0 = 3 kr.

— **Rapae** jak Ol. olivar. 100·0 = 10 kr.

— ***Ricini** wewn. $\frac{1}{2}$ —3 łyżeczek. (8·0—30·0) p. d. k. r. d. w mleku, herbacie, kawie, kapsułk., emulsyi, mixt., do lewatyw 1—4 łyżki. 100·0 = 20 kr.

— ***Santali** zob. Lignum Santali. 1·0 = 6 kr.

— ***Terebinthinae** wewn. 5—20 kropl. (0·25—1·0) p. d. czysty w kaps. pig., emulsyi, mixt. (z eterem) jako antidot. w zatruciu fosforem; zew. do wziewañ, płukań, lewatyw (3·0—15·0 : 150—200 emuls.), do opatr., nacierañ, penzl. skóry, maści (1:3—5), do plastr. (1:5—8 żywicy), do mydeł. 100·0 = 13 kr. —

***Ol. Tereb. rectificatum** stos. jak poprz. 10·0 = 2 kr. —

Ol. Tereb. ozonisatum 5—20 kropl. p. d. co 2—4 godz. z miodem l. żółtkiem; zew. jak poprzedni, działa silniej.

***Olibanum** (gummi resina) 0·20—1·0 *p. d.* k. r. d. w pig.; zew. do nakadzań, plastr. maści. 10·0 = 5 kr.

***Ononidis spin. rad.** wew. 1·0—3·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., decoct. (10·0—25·0:150), do species. 100·0 = 11 kr.

***Opium** wewn. 0·008—0·15! *p. d.* k. r. d. — 0·50! *p. die* w proszk., pig., mixt., emulsyi; zew. w bólach zębów, do kataplast., papierosów, maści (1·0—5·0:10—25), do czopków (0·10—0·20), do gałek pochw. (0·10—0·20), do lewatyw (0·03—0·10 najlepiej w emulsyi). 1·0 = 5 kr. —

***Electuarium Theriaca** (Elect. aromaticum c. opio) $\frac{1}{2}$ —1 łyżeczki *p. d.* 3—4 r. dz. 10·0 = 5 kr. —

Emplastrum opiatum (odontalgicum, składa się opii 1:20). — ***Extr. opii** 0·005—0·10! *p. d.* — 0·40! *p. die* w proszk., pig., pastyl., rozpuszcz.; do płukanek ust, gardła (0·20—1·0:150), do wziewań, rozpylań ((0·05—0·20:100), do przestrzykiwań (0·10—0·50:50), do lewatyw (0·05—0·10), czopków. (0·05—0·10), do maści (0·50—1·50:10), do podskórnych zastrzyk. (1·0:2—10). 1·0 = 14 kr. —

***Tinct. opii simplex** (thebaica). 1·0 = 1 kr.,

***Tinct. opii crocata** 1·0 = 2 kr. (zawieraja w 1 gramie 0·01 morfiny) wew. 0·10—1·50! *p. d.*

(3—25 kropli) — 5·0! *p. die*; zew. do płukanek ust, gardła (0·50—2·0:100), do wziewań, rozpylań (0·20—2·0:100) jako krople do zębów, do penszów. (czysta l. 1·0:1—2 aquae), do ocz. (czysta l. 1·0:1—2 aquae),

do przestrzykiwań (1·0—12·0:100), do opatrunków (2·0—6·0:100), do lewatyw (3—20 kropli na lewat.). do maści (1·0—5·0:25). —

Tinct. opii benzoica (składa się: Opium, Acid. benz., camphor., Ol. anisi, spirit. dilut.) 20—60 kropli *p. d.* (1·0—3·0) 2—4 r. dz., dzieciom 5—20 kropli, w mixt., syrup. l. czysta. 10·0 = 20 kr. —

***Pulvis Doveri** (Pulvis Ipecacuanh. opiatu, składa się Opii, radix ipecacuanh. $\bar{a}\bar{a}$ 1, Sacch. 8) 0·10—1·50! *p. d.* — 5·0! *p. die*. 1·0 = 2 kr. —

Unguentum opii (zaw. Extr. opii 0·10:20).

Orexinum hydrochloricum bezbarwne igielki, rozpuszcz. we wodzie, smaku gorzkiego, stosow. jako stomachicum przy braku apetytu, 0·20—0·50 *p. d.* w oplatk., pig. 1·0 = 35 kr.

***Origanii hb.** do spec., kataplastm. 100·0 = 13 kr.

Oryzae amyllum i farina jako środek odżywczy i do celów kosmet. 100·0 = 24 kr.

Ossa seipae do proszk. do zębów. 10·0 = 4 kr.

Ovum gallinaceum albumen et vitellum ovi jajo kurze.

***Oxymel simplex** dodatek do mixt. (15·0—30·0:100) jako napój (50·0—100·0:1000); zew. do płukanek, lewatyw (60·0—100·0 na lewatywę). 10·0 = 4 kr.

— **Scillae** zob. Bulbus Scillae.

***Paleae haemostaticae** (Pengawar Djambi). 1·0 = 2 kr.

Pankreatinum (różne preparaty), zwykle od 0·50—15·0 *p. d.* w pig., z pokarm. mięsnymi, w lewatywie. 1·0 = 6 kr.

Papainum biały proszek z owoców Carica papaya, poprawia trawienie zwłaszcza trawienie istot. białkow. 1·0 = 40 kr.

- ***Papaveris fructus** (capsul.) **immaturi** wewn. w decoct. (5'0—15'0:100—200); zew. do okładów, kataplasz. (w decoct. 10'0—20'0:100), do płukań, lewatyw. 10'0 = 3 kr. — ***Flores papav. rhoeados** do species. 10'0 = 7 kr. — **Ol. papaver.** jak Ol. amygdal. 10'0 = 2 kr. — **Semen papaver.** w emulsyi (5'0—15'0:100). 100'0 = 16 kr. — ***Syrupus Dia-codii** (Syrup. papav. albi, składa się: Tinct. papav. 50, rad. liquir. 25, Aq. font. 350 ad col. 250 + Sacchar. 400) łyżeczk. corrig. 10'0 = 3 kr.
- Papayotinum** 0'05—0'50—1'0 *p. d.* w rozpuszcz., proszk., pig., do wdmuchiwań w proszku, do penzlow. (5—10⁰/₀). 0'01 = 2 kr.
- Paraffinum liquidum** — lynn oleisty używ. jako constit. dla maści liniment. 10'0 = 4 kr. — **Paraff. solidum** biała masa, topniejąca przy 78°, do maści, plastr. opatrunk. itd. — **Charta paraff.** — **Unguent. paraff. s. Vaselinum** (składa się Paraff. solidi 1, Paraff. liquid. 4) stosow. jak poprzedni. 10'0 = 4 kr.
- Paraldehydum** jako sedativ. 1'0—2'0 *p. d.*; jako hypnotic. 3'0—10'! *p. d.* w 3—4⁰/₀ rozpuszcz. wodnem z dodatkiem sacchar. na 2—3 razy wyżyć, także w kapsuł., emulsyi; antidot. przy zatruciu strychniną; zewn. do czopków, lewatyw (4'0 na lewatywe). 1'0 = 3 kr.
- Pasta dentifricia dura** (Pulv. sapon. venet. 20, Calc. carbon. 8, Carmin 0'20, Ol. menth. pip. 0'50, Spirit. vini 5). — **Pasta dentifr. mollis.**
- Pelletierinum sulfuricum** 0'01 = 8 kr. i **P. tannicum** alkaloid z cortex punice granat. 0'20—0'50! *p. d.* — 5'0! *p. d.* w rozpuszcz., najlepiej w infus. sennae. 0'10 = 18 kr.
- Pengawar Djambi** środek hemostatyczny.
- Pental** (Trójmetyletylen) płyn bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie, tylko w chloroformie, eterze, wyskoku, używ. do narkozy podobnie jak chloroform. 1'0 = 10 kr.
- ***Pepsinum** (solubile) 0'15—0'50 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., rozpuszcz., kaps. (z dodatkiem kw. cytrynowego, winnego, mlecznego) należy zażywać wśród jedzenia. 1'0 = 4 kr. — **Vinum pepsini** łyżeczk. 10'0 = 8 kr. — **Syrup pepsini** łyżeczkę *p. d.*
- Peptonum** bardzo wiele przetworów (fabr. Merck, Sanders itd.) łyżeczk. do rosół; do lewatyw. 1'0 = 4 kr.
- Petroleum** (rectificatum) 5—15 kropl. *p. d.* w kaps., rozpuszcz., eterze, do nacier., penzl., okład. — **Aether petrol.** stosow. jak poprzedni, także do znieczulań miejscowych. 10'0 = 3 kr.
- Pheliandri fructus** 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., spec., infus. (5'0—15'0:100—200). 10'0 = 3 kr.
- Phenacetinum** (Paraacetphenetidin) antipyr. 0'30—0'70 *p. d.*; 1'0 i wyżej *p. d.* jako antineuralg. w proszk., pig., kapsuł., także rozpuszcz. w alkohol. 1'0 = 6 kr.
- ***Phenolum** zob. Acid. carbolicum.
- Phenocollum hydrochloricum** (Paramidoacetphenitidin) wewn. 0'50—1'0 *p. d.* rozpuszcz. w wodzie jako antipyr., antirheumat. 1'0 = 20 kr.

Phosphorus 0·0001—0·001 *p. d.* — 0·005! *p. die* rozpuszcz. w eterze, alkohol., oliwach, rzadko w pig., zew. (także poprzednio rozpuszcz.) do maści (0·05—0·30:25), do liniment. 1·0 = 2 kr. — **Aqua phosphor.** łyżeczk. — **Ol. phosphor.** (1:80—100 oleum) 2—5 kropli *p. d.* w mixt., emuls., kapsułk., także zew. do nacierań. 10·0 = 10 kr. — **Ol. jecoris aselli phosphor.** (0·01:100 oliwy) łyżeczk. *p. d.* — **Aether phosphor.** (1·0:150) kropl. 10·0 = 15 kr.

Physostigmatis Semen (Faba Calabar.) 0·01 = 1 kr. jako **Extr. F. C.** po 0·0015—0·02! *p. d.* — 0·06! *p. die*, w pig., rozpuszcz., (z 1% roztworu wodnego lub glicerynowego 5—10 kropli *p. d.* 2—4 r. dnia), do ocz (kropl. z roztworu 1: glicerin, Aquae *āā* 10). — ***Physostigminum salicylicum** (Eserinum salicyl.) 0·001! *p. d.* — 0·003! *p. die* w pig. lub rozpuszczeniu; podskórnice w dawce 0·0005—0·001 *p. d.* (z roztworu 1%), do ocz kropl. (0·02—0·05:10 Aq.). 0·01 = 4 kr. — **Ph. sulfuricum** w dawkach, jak poprzedni.

Picrotoxinum 0·0005—0·0006! *p. d.* — 0·02! *p. die* w pig., pastylk., rozpuszcz., zewn. w maściach 0·10 = 15 kr.

Pichy - Pichy Extr. fluid., ciecz ciemnobrunatna, przyjemnego zapachu, mocno gorzka, zastosow. i wskazanie jak dla Balsamu Copaiv., Ol Santali itd. 1·0 = 3 kr.

***Pilocarpinum hydrochloricum** alcaloid z Folia Jaborandi 0·01—0·03! *p. d.* 0·06! *p. die* w pig. roztworach (0·02—0·04:80 co godz. łyżeczkę polecały w błonie u dzieci); podskórnice (2% roztworu) w dawce 0·015—0·03! *p. d.* (dzieciom 0·001—0·01 *p. d.*); do ocz (0·10—0·20:10 Aq.). 0·01 = 13 kr.

Pimpinellae radix stosow. jak Radix Imperat. 10·0 = 2 kr. Tinct. Pimp. 10—30 kropli *p. d.* k. r. d. do płukan. 10·0 = 3 kr.

Piper album 10·0 = 5 kr. — **Piper nigrum** 10·0 = 5 kr. 0·20—1·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., w maceracyi (5·0—10·0:100 spirit. l. vini) także zewn. do maści.

Piperazinum (Diaethylendiamin) purum l. hydrochloricum, krystaliczne białe igielki łatwo w wodzie rozpuszcz., używa się w dnie, kamieniach pęcherza, w dawce 1·0—2·0 *p. die* w rozpuszcz. w wodzie; także do przepłukiwań pęcherza (1—2%). 1·0 = 50 kr.

Piscidiae Erythrynae radice cort. 0·50—1·0 *p. d.* 2—4 r. d. w proszku (sedativ i hypnotic.) — **Extract. P. siccum** 0·25—0·50 *p. d.* — **Extract. P. fluidum** 2·0—6·0 *p. d.* — 12·0 *p. die.* — **Tinct. P.** 40—50 kropli *p. die.*

***Pix liquida** (Resina empyrheumat. liquida) wewn. 0·30—1·50 *p. d.* 2—3 r. d. w pig., kapsułk.; zewn. do wzięwań, wcierań, (czysty lub z alkohol., tłuszczami, mydłem w stosunku 1:2—10). do maści (1:4—6), do plastrów (1:2 cera). 100 = 10 kr. — **Aq. Picis** (picea) łyżeczk. — łyżk. 2—4 r. dz.; do wzięwań, przestryk. opatrunków. 100 = 10 kr. — **Sapo picis.** 10·0 = 4 kr. — **Unguent. picis sulf.** — **Pix litanthracis** smoła z węgla kamienn. tylko zewn. jako środek dezynfekcyjny.

Plantaginis herb. decoct. (15:0—50:100—200 col.). 10:0 = 2 kr.

Platinum natriochloratum stosow. jak aurum natr. chlorat. 10:0 = 2 kr.

***Plumbum aceticum** wew. 0:008—0:10! *p. d.* — 0:50!

p. die w proszk., pig., rozpuszcz., mixt., emulsiy, w krwiopluciu od razu większe dawki (0:06—0:10 co 2 godziny); zewn. jako zasypka do wdmuchiwań gardła, krtani (1:5—10 Sacchari), jako płukanka do ust i gardła (0:10—0:50:100), do lewatyw (0:10—0:50), do przestrzyk. (0:30—1:0:100) do pędzlow. (1:0—2:0:10), do wzięwań (0:10—1:0:100), do ócz (0:20—2:0:100), do okładów, zmywań (0:50—1:0:100), do maści (1:0:5—10). 10:0 = 5 kr. — **Plumb. acet. solutum**

(1:0:6 Aqu.). — ***Plumb. acet. basicum solutum** (Liquor plumb. subacetici) zewn. do płuk. ust i gardła (0:50—1:50:100:0). do pędzlow., okładów, zmywań, opatr. (w dawce 3—5 razy w większej, jak plumb. acetic.); do ócz (0:50—1:0:100), do przestrzyk. (2:0—6:0:100), do lewatyw (0:50—6:0 na lewat.), do maści (1:0:5—10). 10:0 = 2 kr. — ***Aqua plumbi** (Plb. acet. basic. solut. 1, Aquae 49) i ***Aq. plumbi spirituosa** czyli **Aqua Goulardi** (Plb. acet. basic. solut. 2, Spirit. vini 5, Aquae 100) do okładów, zmywań, przestrz., lewatyw (100:0—200:0 na lewatywę). — ***Ung. plumbi acetici.** 10:0 = 5 kr.

— ***carbonicum** (Cerussa) zasypka, także do maści, plastr. 10:0 = 4 kr. — ***Emplastr. Cerussae** (Empl. Diachyl. simpl., Cerussae $\bar{a}\bar{a}$ 1, Ung. simplic. 70). 10:0 = 5 kr. — ***Unguent. Cerussae** (Emplastr. Diachyl 1, Cerussae 3, Axungiae 5). 10:0 = 5 kr.

— **jodatum** 0:05—0:50 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., do maści (1:5—10). 1:0 = 5 kr.

— **nitricum** stosow. jak Pl. aceticum.

— ***oxydatum fusum** (Lithargyrum). 10:0 = 3 kr. do ***Emplastr. Diachyl. simpl.** 10:0 = 3 kr. i ***Empl. Diachyl. compos.** (Adhaesivum, Empl., Plumbi, Gum. resina). — **Emplastr. diachyl. linteo extens.** — **Ung. Diachyl. Hebrae.**

— ***oxydatum** (hyperoxydatum) **rubrum** (Minium) 10:0 = 3 kr. do ***Empl. Minii adust.** (Empl. fuscum camphor.). 10:0 = 5 kr.

— **tannicum.** 1:0 = 2 kr., do Unguent. Plumb. tannici.

Podophylli peltati rad. 0:50—1:0 *p. d.* jako purg. 1:50—2:0 *p. d.* jako drastic. w proszk. — **Podophyllum** (resina P.) 0:03—0:06 *p. d.* w pig., jako purg., przy zaparciu stolca nawykowem do stałego użytku 0:005—0:02 *p. d.* (dzieciom po 0:005—0:02 jako purg.) w pig., mixt., proszk., rozpuszcz., w alkoholu. 1:0 = 6 kr. — **Podophyllotoxinum** 0:015—0:02! *p. d.* — 0:06! *p. die* rozpuszcz. w alkoholu lub w pig. 0:10 = 16 kr.

Propylaminum (Trimethylamin) 0:10—3:0! *p. d.* — 10:0 *p. die* w kaps., kropl., mixt. 1:0 = 3 kr.

Pruni virginianae cort. z niego Extract. fluid. P. v. 2'0 — 4'0 p. d. jako tonicum.

Pulmonariae folia. stosow. jak folia Altheae. 10'0 = 2 kr.

***Pulpa prunorum** zob. Senna. 10'0 = 4 kr.

Pulsatillae herb. 10'0 = 2 kr. — **Extr. P.** 0'05—0'20 p. d. — 1'0 p. die w mixt., pig. 1'0 = 6 kr. — **Tinct. P.** 10—40 kropl. — 3'0 p. d. — 10'0 p. die. 10 = 20 kr.

***Pulvis aërophorus** zob. Natrium hydrocarbonic.

***Pulvis ipecac. opiat. Doveri** zob. Opium.

Pyoctaninum (Coeruleum; aureum) barwiki anilinowe, używane jako antisept. zewn. czysty jako zasypka, w roztworze 1'0:1000), w maści (2'0/0). 1'0 = 18 kr.

***Pyretri Romani rad.** do płukania do ust, gardła, w decoct. lub infus. (3'0—10'0:100—200 col.). 10'0 = 6 kr.

Pyridinum purissimum (antiasthmatic) 3'0—5'0 wylane na talerz ulatniają się (w ciepłocie pokoju 20—25°), chory pozostaje w pokoju 20—30 minut; zastosować można 2—3 razy w ciągu dnia. 1'0 = 3 kr.

***Pyrogallol** zob. acid. pyrogallicum.

***Quebracho cortex.** 10'0 = 4 kr. i **lignum Q.** 10'0 = 2 kr. — 0'30—0'50 p. d. w proszk., maceracyi lub decoct. (5'0—15'0:100—300 col.). — ***Extract. fluid. Q.** 1—2 łyżeczek p. d. — 8'0 p. die. — **Tinct. Q.** łyżeczk. czysta lub z pokarmami klejkiemi. 10'0 = 5 kr.

***Quercus cortex** wew. 0'50—1'50 w proszk., l. decoct. (15'0—25'0:120—200); zewn. do zasypek l. (w decoct.) do płukań gardła, ust, przestrzykiwań, kąpieli ($\frac{1}{2}$ —1 klg. z 2 litrami wody zagotowane wlać do kąpieli). 10'0 = 4 kr. — ***Semen (glandulae) Quercus tostum** (1—3 łyżeczk. na filiżankę wody). 100'0 = 16 kr.

Quillajae saponariae cort. decoct. (3'0—5'0:200 łyżeczkami). 10'0 = 2 kr.

***Ratanhae rad.** wew. 0'50—1'0 p. d. k. r. d. w proszk., pig., decoct. (5'0—15'0:100); zew. do proszków do zębów, w decoct. do płukania ust i gardła, przestrzykiwań i lewatyw. 10'0 = 9 kr. — ***Extr. R.** 0'20—1'0 p. d. k. r. d. w pig., płacusk., mixt.; płukanie do ust, gardła (5—10'0/0), do penzlowań (1'0—5'0:25), do okładów, zmywań, maści. 1'0 = 7 kr. — ***Tinct. R.** wew. 20—40 kropl. p. d. do płukań, penzlowań. 10'0 = 4 kr.

Resorcinum (Metadioxybenzol) wew. jako antiferment., antisept., antipyret. po 0'20—0'50—3'0! p. d. k. r. d. — 10'0! p. die w proszk. w opłatkach, mixt., kapsułk., w rozpuszcz.; zew. jako środek żrący w substancyi l. w rozpuszcz.; jako woda do ócz (2'0:100), do przestrzykiwań pęcherza (2'0—5'0—10'0:100), do cewki moczow. (2'0:100), do lewatyw (1'0:200), do wziewań (0'50—1'0:100), do maści (5'0:30). 1'0 = 3 kr.

Rhammi Catharticae fruct. 10'0 = 2 kr. — **Syrup. Rh. C.** jako laxans łyżeczk. (1—4) do mixtur.

— **Frangulae cortex** w inf. (10'0—30'0:100—200 col.).

— ***Purshiani cort.** zob. Cascara Sagrada.

- *Rhei chinensis rad.** (Rhabarbarum) jako stomachic. 0·10—0·50 *p. d.* k. r. d.; jako purg. 0·50—5·0 *p. d.* w proszk., pig., kapsulk., infus. (2·0—5·0:100), do lewatyw (10·0—20·0:100). 10·0 = 15 kr. — ***Extr. rhei ch.** 0·05—0·30 *p. d.* jako tonicum; 0·50—1·0 *p. d.* jako laxans w pig., rozpuszcz. 1·0 = 7 kr.
- Extr. rh. ch. compos.** (Extr. rh. ch. 3, Aloë, Sapo med., Jalapa $\bar{a}\bar{a}$ 1) 0·10—0·30 *p. d.* jako stomachic., 0·30—0·50 *p. d.* jako laxans w pig. 1·0 = 6 kr. — ***Syrup. rh. ch.** łyżeczk., łyżkami, do mixtur. 10·0 = 3 kr. — ***Tinct. rh. ch. aquosa** $\frac{1}{2}$ —4 łyżeczk. *p. d.* k. r. d. 10·0 = 4 kr. — ***Tr. rh. ch. vinosa** (Vinum rh. Darrhelli) dawka jak poprzedni. 10·0 = 11 kr.
- Rhododendri folia** 0·50—1·0 *p. d.* w proszk., infus. (5·0—15·0:100 col.).
- *Rosae flores** 10·0 = 5 kr. — ***Aqua rosae** 100·0 = 10 kr. — ***Ol. rosae** 0·10 = 17 kr.
- *Rosmarini folia** do spec., zew. w infus. do zmywań, okładów. 10·0 = 1 kr. — ***Ol. rosmarini** do maści, liniment. 1·0 = 1 kr.
- Rubi Idaei fruct.** 100·0 = 20 kr. — ***Syrup. rubi idaei** 10·0 = 4 kr.
- Rutae folia** 0·50—1·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., infus. (10·0—15·0:100—200 col.); do płukań ust i gardła, lewatyw. 10·0 = 3 kr. — **Aqua rutae** 100·0 = 12 kr. — **Ol. rutae** 1—3 kropl. *p. d.*
- *Sabadillae fruct.** (semen) 0·10—0·25! *p. d.* — 1·0! *p. die* w proszk., pig., infus. (0·50—1·0:100 col.); zew. jako zasyпка; do zmywań, lewatyw, maści (1·0:4—10). 10·0 = 7 kr. — ***Ung. sabad.** (1·0:4·0). 10·0 = 6 kr. — **Tinct. sabad.** wewn. 0·15—0·50! *p. d.* k. r. d.; zewn. do nacierañ.
- *Sabinae summitates** (frond.) 0·20—1·0! *p. d.* — 2·0 *p. die* w proszk., pig., infus. (2·0—8·0:100 col.); zewn. do zasypek, maści, do płukań, przestrzykiwań (5·0:100). 10·0 = 5 kr. — **Extr. Sab.** 0·03—0·20! *p. d.* — 1·0! *p. die.* 1·0 = 10 kr. — **Ol. Sab.** $\frac{1}{2}$ —3 kropl. *p. d.* 2—3 r. d. w oleosach.; w pig. 1·0 = 3 kr. — **Tinct. Sabinae** 20—60 kropl. *p. d.* 10·0 = 20 kr.
- Saccharinum** łatwo w wodzie rozpuszcz., 280 r. słodszy od cukru, stosow. tam, gdzie cukier przeciwwskazany (diabetes), do osłodzenia bardzo gorzkich leków, jak strychniny, chininy. Sprzedawany w tabletkach. 1·0 = 28 kr.
- *Saccharum albidissimum** 10·0 = 2 kr. — ***Sacch. lactis** jako łagodny laxans 10·0—20·0 *p. d.* z mlekiem. 10·0 = 5 kr. — ***Syrup. simplex** 10·0 = 2 kr.
- Sal Carolinum fact.** zob. natr. sulfuric.
- **Seidlitzensis** zob. Magn. sulfuric.
- **Seignetti** zob. Kal. Natr. tartaric.
- Salacetol** połączenie kw. salicylowego z acetolem, proszek białawy, krystal., w wodzie nierozp., antiseptic. stosowany wewn. w biegunkach, czerwonce 2·0—3·0 *p. d.* (dzieciom 0·50 *p. d.*) (w Ol. ricini) ma działać lepiej od salolu.
- *Salep tubera** 0·50—1·0 *p. d.* — 10·0 *p. die* w proszk., decoct. (0·25—1·50:200—300 col.), w żelatynie (1·0:50); zewn. do le-

- watyw (w decoct. 2:0:100). 10:0 = 12 kr. — **Mucilago Salep** (1:0:100 Aq.) łyżeczk., łyżkami.
- ***Salicis cortex** infus., decoct. (10:0—25:0:100—200 col.) stosow. jak cortex Quercus. 100:0 = 11 kr. — **Salicinum** 0:50—2:0 p. d. — 10:0 p. die w proszk., pig., mixt. 1:0 = 4 kr. — **Extr. fluid. salic. nigr.** (antiaphrodisiac). 3:0—5:0 p. die. 1:0 = 3 kr.
- Salicilamidum** krystal. żółte blaszki, rozpuszcz. w eterze, wysoku, wodzie mało; stosow. jak kw. salicylowy 0:15 p. d. co godzinę — 1:0 p. die. 1:0 = 12 kr.
- Salipirinum**, Antipyrinum salicylic. (fabric. Riedel), biały proszek, krystal., trudno w wodzie rozpuszcz. 1:0 p. d. — 6:0 p. die w proszk., mixt., działa podobnie jak natr. salicylic.; także w przypadłościach miesiączk. 1:0 = 12 kr.
- Salolum** (Phenolsalicylat) biały proszek, krystal., bez smaku, zapachu, w wodzie nierozpuszcz., tylko w wysoku, eterze, 1:0—2:0 p. d. — 10:0 p. die, w proszk., tabletk., mixt.; zewn. jako zasypka (czysty, l. āā z amylum), rozpuszcz. w alkohol. l. eterze do płukań, okładów do maści. 1:0 = 5 kr.
- Salophenum** (Acetylparamidosalol) zawiera 50% kw. salicyl., blaszki krystaliczne, bez smaku, zapachu, rozpuszcz. w eterze, alkoholu, mało w wodzie gorącej, w dawce po 4:0—6:0 p. die stosow. jako antineuralg., antirheumat. 1:0 = 18 kr.
- ***Salviae folia** 0:50—2:0 p. d. w proszk. l. infus. (5:0—15:0:100—200 col.), jako płukanka do ust, gardła (infus.), do przestrzykiwań, zmywań i t. d. 10:0 = 6 kr. — ***Aqua S.** 100:0 = 12 kr. — **Extr. S.** 0:50—1:50 p. d. k. r. d. — **Ol. aether. S.** 1—3 kropli k. r. d.; do płukań, kropli do zębów itd. 1:0 = 6 kr.
- Sambuci flores** podobnie jak flor. chamomil. w inf. (5:0—15:0:100—200). 10:0 = 3 kr. — **Aqua S.** 100:0 = 12 kr. — **Roob. S.** (succus s. insipisatum) łyżeczk., do mixt. (10:0—30:0:100). 10:0 = 4 kr.
- Sanguinariae canadens. rad.** 0:20—0:60 p. d. w proszk., pig., decoct. (2:0—5:0:100—200 col.). — **Sanguinarium** 0:005—0:008 p. d. jako expector; 0:01—0:02 p. d. — 0:05 p. die jako emetocathartic.
- Sanguis draconis** (resina draconis) do plastr., zasypek. 10:0 = 14 kr.
- ***Santoninum** 0:03—0:10 p. d. — 0:30! p. die w proszk., pig., do lewatyw (0:05—0:10:50), do czopków (0:05—0:10). 0:10 = 1 kr. — ***Trochisci S.** (0:025—0:05). 10 szt. = 8 kr. — **Natrium santon.** 0:10—0:20 p. d. 2—3 r. d. w proszk., pig. 1:0 = 10 kr. — **Calcium santon.** 1:0 = 10 kr.
- ***Sapo kalinus, virid.** 100:0 = 10 kr. — ***S. medicinal.** (amygdal.). 10:0 = 7 kr. — ***S. venetus** (oleac). 10:0 = 4 kr. — **S. jalapinus** wew. 0:10—0:30 k. r. d. w pig. 1:0 = 10 kr. — **S. picis** 10:0 = 4 kr. — **S. sulfuricus.**
- ***Spiritus saponatus** 10:0 = 2 kr. — ***Spir. saponis kalini** do nacierań, zmywań, kąpieli ($\frac{1}{4}$ —1 klg. na kąpiel). 1:0 = 4 kr. — **Spir. saponato camphorat.** zewn. do nacierań.

- Saponariae herb.** infus. (10·0—30·0:100—200 col.). 10·0 = 1 kr. — **Rad. sapon.** w decoct. i infus. 10·0 = 3 kr. — **Extr. sapon.** 0·50—2·0 p. d. k. r. d. w pig., mixt. 1·0 = 3 kr.
- ***Sarsaparillae rad.** wewn. 1·0—2·0 p. d. w pig., w decoct. (15·0—60·0:250—300 col.), w macerac. alkohol. lub wodnej. 10·0 = 6 kr. — ***Decoet. Sars. composit. fortius** (Zittman). 100·0 = 48 kr. — ***Decoet. Sars. Zittmani mitius** 100·0 = 30 kr. — **Extr. Sars.** 0·50—1·0 p. d. k. r. d. 1·0 = 15 kr. — **Syrup. Sars. compos.** (Roob Laffeteur) 1—2 łyżeczk. 2—4 r. dz.; wskazania jak decoet. Sarsap.
- ***Sassafras rad.** wchodzi w skład species lignor. 10·0 = 2 kr.
- Scamonium halepense** (resina) 0·05—0·15 p. d. k. r. d.; w dawkach 0·30—0·60 p. d. co godz. jako drastic. w pig., proszk., emuls. 1·0 = 6 kr.
- ***Scillae bulbus** (rad.) wewn. 0·03—0·20—0·50! p. d. 3—4 r. d. w proszk., pig., decoet, infus. (1·0—3·0:100); zew. do maści (1·0:4·0), do okładów (w infus. 5·0—10·0:200). 1·0 = 2 kr. — ***Acetum Sc.** 2·0—5·0 p. d. k. r. d. w mixt.; zew. do zmywań, lewat., płukań. 10·0 = 3 kr. — ***Extr. Sc.** 0·05—0·20! p. d. — 1·0! p. die w proszk., pig., mixt. 1·0 = 5 kr. — ***Oxymel. Sc.** łyżeczk., do mixt. (10·0—20·0:100). 10·0 = 5 kr. — **Tinct. Sc.** 10—20 kropli (0·50—1·50) p. d. k. r. d. 10·0 = 4 kr.
- Scoparinum** 0·50—1·0 p. d. w proszk., pig., podskórn. 0·03—0·06 p. d. 0·10 = 30 kr.
- Scopoliae lucid. folia** jako Tinct. Scop. (1·0:8·0 alk.); 20 kropli p. d., do ocz jako midriatic. — **Scopolaminum hydrochloric.** stosow. podobnie jak atropin., w roztworze (1—2%) nie podnosi parcia śródocznego, działa silniej niż atropin.
- Sebum ovile** constit. do maści, mydeł, czopk. i t. d. 100·0 = 15 kr.
- ***Secale cornutum** wewn. 0·03—0·06—1·0! co 2—4 godz. (w celu wzmocnienia bólów co $\frac{1}{4}$ godz. po 1·0—5·0! p. die) w pig., proszk., infus., decoet. (2·0—5·0:100); zew. w proszk., w infus., do lewat., przestrzyk. 1·0 = 1 kr. — ***Extr. secal. cornuti** zob. Ergotin. 1·0 = 6 kr. — **Tinct. sec. cornuti** 0·50—2·0 p. d. — 8·0 p. die w mixt. 10·0 = 20 kr.
- ***Senegae rad.** 0·50—2·0 p. d. w proszk., pig., infus. lub decoet. (5·0—15·0:100—200 col.). 10·0 = 7 kr. — ***Syrup. S.** łyżeczk., do mixt. 10·0 = 5 kr.
- ***Sennae (alexandrinae) folia** 0·30—0·50 p. d. k. r. d.; jako laxans 0·50—2·0 p. d. (1—2 razy), jako silny purgans 2·0—5·0 p. d. w pig., proszk., infus. (5·0—20·0:100). 10·0 = 5 kr. — ***Fol. Sennae sine resina** (F. S. Spirit. extract.). 10·0 = 8 kr. — ***Electuarium lenitivum S.** łyżeczk. lub do mixt. 10·0 = 6 kr. — ***Infus. Senn. composit.** (Aqua laxativ. Viennensis) łyżeczk. — łyżkami 50·0 p. d. 10·0 = 4 kr. — ***Spec. laxant. St. Germain** łyżeczkę na filiżankę infus. 10·0 = 8 kr. — ***Syrup Sennae c. Manna** (mannatus) łyżeczk. lub w mixt. 10·0 = 3 kr. — **Acidum cathar-**

- tinicum** 0·30—0·50 *p. d.* 2—4 r. dz. w proszk., pig., mixt., podskórn. 0·20—0·30 *p. d.* (z rozczyynu alkohol.). 0·10 = 2 kr.
- *Serpylli herb.** do spec.; zewn. do okładów, kąpieli i t. d. 10·0 = 1 kr. — **Ol. Serp.** 2 kropl. *p. d.* k. r. d.; do maści. 1·0 = 4 kr. — **Spirit. Serp.** zewn. 100·0 = 20 kr.
- Sesami oleum** jak Ol. amygdal. 10·0 = 2 kr.
- *Semen Sinapis** wew. 1·0—4·0 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszk., infus. (2·0—10·0:100), macer. (5·0—15·0:100), z mlekiem (25·0—50·0:500); zewn. w infus. do płukan. ust, gardła, zmywań, okładów, kąpieli (100·0—250·0 na kąpiel), do pryszczydek, kataplasm. 100·0 = 18 kr. — ***Farina Sinap.** — ***Ol. Sinap.** 0·004—0·01 *p. d.* k. r. d. w emuls.; zewn. rozpuszcz. w alkohol. lub olejach (0·20—1·0:25). 1·0 = 12 kr. — ***Spirit. Sinap.** wew. 2—10 kropl. *p. d.* k. r. d.; zew. jako rubefac. 10·0 = 4 kr. — **Charta Sinap.** Kartka = 8 kr.
- Solaninum hydrochloricum** 0·05—0·10! *p. d.* — 0·50 *p. die* w pig., w proszk., podskór. 0·05 *p. d.* (z 1⁰/₆ rozczyynu). 0·01 = 8 kr.
- Solutol** przeważnie do dezynfekcyi. 10·0 = 3 kr.
- Solveol** jako desinfic. i antiseptic. przewyższa w działaniu kreolinę, kw. Karbol., nie jest trujący, (0·5⁰/₆ solveolu daje te same usługi co 2⁰/₆ kw. karbol.).
- Somnal** 2·0—4·0 *p. d.* jako hypnoticum.
- Sozodolum; Kalium sozodolicum** 1·0 = 14 kr. — **Natrium sozodolic.** proszek bez zapachu, podobnie stosow. jak jodoform w chorob. skórnych i kile, w proszk., maść, rozpuszcz. w wodzie i alkoh. 1·0 = 15 kr.
- Spartii scoparii herb. i flores** w infus., decoct. (5·0—20·0:100—300), jako diuretic. — **Sparteinum sulfuric.** 0·01—0·03 *p. d.* 2—4 r. dz. — 0·10—0·25 *p. die* w pig., rozpuszcz. w wodzie. 0·10 = 5 kr.
- *Species amaricantes** (Hb. Absynth., Centauri min., Flav. aurant. *āā* 20, Fol. trifol. fibr., rad. Calam., rad. Gent. *āā* 10, cort. cinam. 2·50) stosow. jak infus. (5·0—15·0:100 col.). 100·0 = 26 kr. — ***Spec. aromaticae** (Hb. Salv., Menth., pip., flor. Lavand. *āā*) wew. jak poprzed.; zew. do okładów (w infus.) kąpieli (1¹/₂—1 klg.). 100·0 = 36 kr. — ***Spec. aromat. pro cataplasma.** 100·0 = 47 kr. — **Sp. diureticae** 2 łyżeczki na 6 filiż. wody a 4 filiż. col. wypić w ciągu dnia. — ***Spec. emollientes** do kataplasm. 100·0 = 18 kr. — ***Spec. laxant.** St. Germain zob. Senna. — ***Spec. lignorum** zob. Guajaci lign. — ***Spec. pectorales** zob. Altheae.
- *Spilanthis oleraceae hb.** 10·0 = 5 kr. do ***Tinet. Spilanth. compos.** stosow. w bólu zębów, do płukan. ust. 10·0 = 6 kr.
- *Spiritus aetheris** (Liquor mineralis Hoffmanni) 10—30 kropl. czysty lub w mixt. 10·0 = 3 kr. — **Spirit. aether. nitrosi** (Spir. nitr. dulce.) wewn. kropl.; zewn. do płukan. penzlowań. 10·0 = 5 kr. — ***Spir. vini rectificatus** (concentratus). 100·0 = 10 kr. — ***Spir. vini dilutus** 100·0 = 8 kr. — ***Spir. vini Cognac.** 10·0 = 9 kr. — **Spir. frumenti.** 10·0 = 2 kr. — **Spir. solani tuberosi.**

Spongia compressa (gąbka); **Sp. carbolisata**; **Sp. tosta** (Carb. Spong.). 10·0 = 10 kr.

Staphisagriae semen tylko zewn. w proszk., maść, decoct (10·0—15·0:100) jako antiparasitic. 10·0 = 4 kr.

Stibium chloratum (Liquor stibii chlorat.; Butyrum Antymonii) środek żrący. 1·0 = 2 kr.

— ***sulfuratum aurant.** wewn. 0·015—0·10 p. d. k. r. d. w proszk., pig., trochisci (po 0·03). 1·0 = 5 kr.

— **sulfuratum nigrum** (laevigatum) 0·20—1·0 p. d. 2—4 r. dz. w pig., proszk., trochisci (po 0·18). 10·0 = 3 kr.

***Stramonii folia** wewn. 0·03—0·15—0·30! p. d. 3—4 r. dz. — 1·0! p. die, w proszk., pig., infus. (0·20—1·0:100); zewn. do palenia (Cigarettes antispasmodiques), do maści (1·0:10). 10·0 = 2 kr. — **Extr. Str.** 0·01—0·10! p. d. — 0·40! p. die, zewn. do wcierań, wody do ocz. (0·50—2·0:100), do maści (1·0:25). 1·0 = 7 kr. — **Sem. Str.** 0·01—0·10 p. d. **Tinct. Str.** 5—10 kropli. (0·50!) p. d. — 2·0! p. die.

Strontium bromatum krystal. igielki łatwo rozuszcz. w wodzie 1·0 p. d. — 4·0 p. die, w dyspeps., gastralg., hysteryi. 10·0 = 2 kr. — **Str. lacticum** proszek biały, ziarnisty, 1·0 p. d. 2—3 r. d. w chorobach nerek, białkomoczu u ciężarnych, także przeciw tasiemcowi. 1·0 = 4 kr.

Strophanti hispidi (semen) w infus. lub decoct. zamiast digitalis; do ***Tinct. Stroph. h.** (1·0:20) 5—15 kropli (1·0) p. d. 2—4 r. d. — 40! kropli (3·0!) p. die. 1·0 = 2 kr. — **Strophantinum** bardzo silnie trujący, mało wypróbowany 0·0001—0·0005 p. d. rozpuszcz. w alkaliczn. wodach lub stos. pigułkach. 0·01 = 4 kr.

***Strychnos nux vomica** (semen strychni) 0·03—0·12! p. d. — 0·50! p. die w proszk., pig., do lewatyw (w decoct 0·25—0·50:100). 1·0 = 1 kr. — ***Extr. Str.** (nuc. vomie. spirit.) 0·01—0·05! p. d. — 0·15! p. die w proszk., pig. 1·0 = 12 kr. — ***Tinct. Str.** (Tinct. nuc. vomie.) 0·10—1·0! p. d. — 3·0! p. die; zew. do nacierań. 10·0 = 5 kr.

Tinct. nuc. vomie. aetherea; **Strychninum purum** i ***Str. nitricum** 0·003—0·007! p. d. — 0·02! p. die w proszk., pig.; zewn. w rozpuszcz. w olejach lub maści (0·05—0·30:10), podskórn. (1% rozczyzn.) 0·001—0·01 p. d. 1—2 r. dz. 0·01 = 1 kr. — **Str. arsenicosum** podskórn. 0·001—0·004 p. d. — **Str. aceticum** i **Str. sulfuricum** stosow. jak Str. nitricum. 0·01 = 1 kr.

***Styrax liquidus** (Balsam Styr., Ambra liquid.) wewn. 0·50—2·0 k. r. dz. w pig. lub rozpuszcz. w alkoh.; zewn. do maści, liniment. āā Ol. Olivar. 10·0 = 7 kr. — **Linimentum Styrax.** (Styrax 3, Ol. Oliv. 6, Spir. vini 1); — **Ungu. Styrac. sulfuratum** antiscabiotic. 10·0 = 8 kr.

Succinum jako proszek do kładzieł. 10·0 = 5 kr. — **Ol. Suc.** 5—15 kropli. p. d. k. r. d. w pig., kapsułk., jako krople do uszów, zębów itd. 10·0 = 6 kr.

Sulfonalum kryształki bez smaku, zapachu, 1·0—3·0 p. d. jako hypnotic, aż 4·0! p. d. — 8·0! p. die, w pig., pastylk., z gorącą herbatą, rosółem itd. 1·0 = 6 kr.

***Sulfur sublimatum** i ***Sulfur sublimat. depuratum** (flores Sulfuris) wewn. 0·30—1·0 *p. d.* k. r. d.; jako laxans 2·0—8·0 *p. d.* w proszk., trochisci (po 0·18); wewn. do wdmuchiwań gardła, krtani, do płukań w emulsyi (1·0—2·0 : 100), do nakadzań, maści (1·0 : 2—5). 10·0 = 3 kr. — ***Ung. sulfurat.** antiscabiotic. 10·0 = 5 kr. — ***Sulfur praecipitatum** (mleko siarczane) 0·10—0·50 *p. d.* k. r. d. jako laxans 1·0—2·0. 10·0 = 8 kr. — **Sulf. chloratum** do pedzłow. — **Sulf. jodatum** wewn. 0·05—0·10 *p. d.* 2—4 r. d w pig., glicerynie; zewn. do maści, mydeł. 1·0 = 10 kr.

Syrupus Diacodii. zob. zob. Papaver.

— ***Menthae.** 10·0 = 4 kr.

— ***Mororum.** 10·0 = 3 kr.

— ***Ribium.** 10·0 = 3 kr.

— ***Rubi ideae.** 10·0 = 3 kr.

Talcum praeparatum zob. Alumen plumosum.

Tamarindi Pulpa Tamarindorum cruda, zewn. w decoct. (25·0—60·0 : 1000) jako napój; (8·0—50·0 : 100—300 Aqu.), jako laxans.

***Pulp. Tamar. depurata** 25·0—60·0 *p. d.* k. r. d. czysta lub mixt., powidełk.; do lewatyw. 10·0 = 6 kr.

Tanacetii herb. 1·0—2·0 *p. d.* k. r. d. w proszk., infus. (10·0—20 : 100). 10·0 = 2 kr. — **Flores T., Oleum Ta.** 1—2 kropli k. r. d. w alkoh. lub z olejami; zewn. do nacierañ. 1·0 = 15 kr.

***Taraxaci folia** do specjes, decoct. (10·0—15·0 : 100). 100 = 10 kr. — ***Rad. Tarax.** tak samo stosow. 10·0 = 1 kr. —

***Extract. Tarax.** 10·0—30·0 *p. d.* 10·0 = 16 kr.

Tartarus boraxatus (kalium tartaric. boraxat.) 0·50—2·0 *p. d.* w rozpuszcz. (jako diureticum), 5·0—7·0 *p. d.* jako laxans. 10·0 = 15 kr.

— **depuratus** zob. kalium hydrotartaricum.

— **natronatus** zob. Kalium natrotartaric.

— **stibiatus** zob. Kalium stibiotartaric.

Taxi baccatae folia 0·10—0·50 *p. d.* k. r. d. w proszk., inf. (0·50—2·0 : 100). Extr. T. b. 0·05—0·30 *p. d.*

***Terebinthina** (communis) zewn. do maści, plastr. (1·0 : 3) 100 = 8 kr. — ***Tereb. veneta** wewn. 0·30—1·0 *p. d.* k. r. dz. w pig., emulsyi; zewn. do przestrzykiw. (1·0—4·0 : 100), wziewań, maści, liniment., lewatyw (4·0—8·0). 10·0 = 3 kr. — **Tereb. cocta** stosow. tak samo. — ***Ol. Tereb.** 100 = 13 kr. — ***Ol. T. rectificatum** 10·0 = 2 kr. — **Sapo Tereb., Ungu. Tereb.** stosow. szczególnie w odmrożeniach. 10·0 = 4 kr.

Terpinolum plyn bezbarwny, lotny, w wodzie nierozpuszcz., stosow. w nieżytych dróg oddech. 0·10—0·50 *p. d.* w kaps. 1·0 = 5 kr.

Terpinum hydratum 0·20—0·40 *p. d.* — 1·0 *p. die*, w proszkach, pig., mixt. 1·0 = 3 kr.

Tetronalum kryształki rombiczne, bezbarwne, w wodzie słabo rozpuszcz., 1·0 *p. d.* jako hypnotic. 1·0 = 60 kr.

- Teucrium** (*Teucrium Scordium*) płyn ostrego smaku, zapachu czosnku, stosow. w miejscowej gruźlicy (gruczołowej lub skórnej) celem wywołania reakcyi, 3:0 na jedno zastrzyknięcie; wewn. 0:50 *p. d.* jako stomec. 1:0 = 3 zlr.
- Thallinum sulfuricum** wewn. 0:10—0:20 *p. d.* jako antipyretic. rozpuszcz. w wodzie lub winie, z dodatkiem Syrup. cortic. aurantior.; zewn. do przestrzyk. (1—2%) do świeczek. 1:0 = 40 kr. — Tak samo stosuje się **Thall. tannicum** 1:0 = 25 kr. i **Thall. tartaricum**. 1:0 = 35 kr.
- ***Theae folia**. 10:0 = 16 kr. — **Theinum** zob. Coffeinum.
- Thermodinum** (oxyphenylurethan) kryształki słabo w wodzie rozpuszcz., antipyretic. w dawce 0:50—0:70 *p. d.* (dla dzieci 0:20—0:30). 1:0 = 20 kr.
- Thilandin** constit. do maści, zawiera 3% siarki. 1:0 = 5 kr.
- Thiol** (fabric. Riedel) jako **Th. siccum** 10:0 = 90 kr. brunatny proszek i **Th. liquidum** 10:0 = 30 kr. ciecz ciemnobrunatna syropowata, oba łatwo w wodzie rozpuszcz. stosow. zewn. w rozpuszcz. (10%) w ostrych zapalnych chorobach skóry.
- Thiophendijodid** tabletki kryształ., nierozpuszcz. w wodzie, stosow. w proszku zam. jodoformu lub w postaci gazy (10%). 1:0 = 60 kr.
- Thiosinaminum** polecony do wstrzykiwań podskórnych w liszaju żrącym (lupus). 1:0 = 18 kr.
- Thujae frond.** tylko zewn. jako zasypka. 10:0 = 3 kr.
- Thymi herb. i Ol.** stosow. jak Herb i Ol. Serpylli. 1:0 = 3 kr.
- ***T. hymolum** 0:05—0:10 *p. d.* k. r. d. jako antifermentativ. 1:0—2:0! *p. d.* jakb antifebril., antirheumatic, w proszku lub rozpuszcz. w alkohol., alkaliach; zewn. jak acid. carbolie. 1:0 = 8 kr.
- ***Tiliae flores** 10:0 = 3 kr. stosow. jak Flor. Sambucci.
- ***Tinct. amara** (Hb. centaury, Fruct. aurant. immat., Rad. Gent., Rhiz. Zedoar) 20—60 kropli *p. d.* k. r. d. 10:0 = 5 kr.
- Tinct. aromatica** (Cort. Cinam. Cas. 5, Rh. Zing. 2, Fruct. Cardam, Caryoph. āā 1:50 Spirit. diluti). 10:0 = 4 kr. — **Tinct. aromat. acida**. 10:0 = 4 kr.
- Tolypirinum** (fabric. Riedel) kryształki bezbarwne, smaku gorzkiego, w wodzie rozpuszcz., działa podobnie jak antipyrina (antineuralg., antirheum.) 1:0 *p. d.* co godz. (4 proszki). 1:0 = 20 kr.
- Tolysalum** (Tolypir. salicylicum) kryształy w wodzie rozpuszcz. działa podobnie jak poprzedni 1:0—2:0 *p. d.* co godz. (6:0! *p. die*).
- Tormentillae rhiz.** 0:50—2:0 *p. d.* k. r. d. w proszku, decoct. (5:0—20:0:100), zewn. do płukań, przestrzyk., okładów. 10:0 = 4 kr.
- Tragacantha** (gummi) wewn. 1:0—4:0 *p. d.*; zewn. jako emulg., constit. 10:0 = 16 kr.
- Tribromphenol** zob. Bromol.
- ***Trifolii fibrini fol.** 10:0 = 4 kr. — ***Extr. Trif. f.** 10 = 18 kr., stosow. jak Fol. i Extr. Centaury.
- Trimethylaminum** zob. Ppropilaminum.

Trionalum delikatne kryształki, rozpuszcz. w letniej wodzie 1'0—1'50 *p. d.* ma działać pewnie w bezsenn. 1'0 = 18 kr.

Tritici farina 100 = 8 kr.

Tripsinum 0'10 = 10 kr., stosow. jak pancreatin.

Tumenolum constit. dla maści, także rozpuszcz. w alkoh. jako tinct., pasta, stosow. w chorob. skóry. 1'0 = 7 kr.

Tussol (Antipyrin. phenolo-glycolicum) proszek w wodzie rozpuszcz. stosow. w krztuścu, w dawce do 1 roku 0'01; do 3 lat 0'10; do 5 lat 0'25 *p. d.* 1'0 = 18 kr.

Unguent. Antenriethi zob. Kal. stibiotarie.

— **basilicum** (z Terebin.). 10'0 = 4 kr.

— **cereum** (cerae flav. 3, Ol. Oliv. 7).

— ***emolliens** zob. Cetaceum. 10'0 = 10 kr.

— ***simplex** zob. Axungia. 10'0 = 4 kr.

— ***aromaticum** 10'0 = 5 kr.

Urethanum jako hypnotic. 1'0—3'0 *p. d.* także jako odtrutka w zatruciu strychniną (4'0—5'0) w proszk., (charta cerata), w kapsulk., w rozpuszcz. w wodzie; podskórn. 0'25 *p. d.* 1'0 = 20 kr.

***Uvae ursi folia** 0'50—3'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., decoct. (20'0—60:100 coll.) do species. 100 = 13 kr.

Valerianae radix 0'50—2'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., mace-racyi lub infus. (5'0—15'0:100); do lewatyw (w decoct). 10'0 = 4 kr. — **Aqua Valer.** 100 = 12 kr. — **Extr. Valer.** 0'50—1'0 *p. d.* w pig., mixt., do lewatyw. 1'0 = 3 kr. — ***Ol. Valer.** 1—4 kropli *p. d.* k. r. d. 1'0 = 10 kr. — ***Tinct. Valer.** 20—50 kropli *p. d.* 10'0 = 3 kr. — **Tinct. Valer. aetherea** 10'0 = 5 kr. — **Tinct. Valer. ammoniata** 10'0—20 kropli *p. d.* k. r. d.

***Vanillae fruct.** 0'05—0'60 *p. d.* k. r. d. w proszk., pig., infus. (3'0—5'0:100); zew. jak corrig. consperg. 1'0 = 10 kr. — ***Tinct. V.** 30—60 kropli *p. d.* k. r. d. 1'0 = 3 kr. — **V. saccharata** (Elaeosacchar. V.). — **Vanillinum** 0'01—0'02 *p. d.* 2—3 r. dz. w proszk., pig., mixt. 0'10 = 30 kr.

***Vaselinum** zob. Paraffinum.

Veratri albi radix (rhiz.) 0'05—0'15—0'30! *p. d.* — 1'0! *p. d.* w proszk., pig., w infus. l. decoct. (0'30—1'0:100); zewn. jako proszek do wdmuchiwań do nosa, w decoct. do okładów, także do maści (1'0:5'0). 10'0 = 6 kr. — **Tinct. Ver.** 3—10 kropli (0'50!) *p. d.* — 2'0! *p. d.* z istotami klejkami; zew. do penzlow. 10'0 = 6 kr. — ***Veratrinum** we w. 0'0015—0'003—0'005! *p. d.* — 0'02! *p. d.* w pig., proszk., rozpuszcz. w alkoholu; zewn. do nacierań (0'10—0'50:10 alcohol.), do maści, podskórn. (0'001). 0'01 = 4 kr.

***Verbasci flores** 10'0 = 7 kr. — **V. folia** stosow. jak flor. i fol. Malvae.

Viburni pruni folii cort. jako Extr. 2'0—5'0 *p. d.* 1—4 r. dz. 1'0 = 2 kr.

***Violae tricoloris herb.** 1'0—5'0 *p. d.* k. r. d. w proszk., inf., decoct. (10'0—15'0:100), succus recens; zewn. do okładów, kąpieli (infus.). 100'0 = 14 kr.

Xylolum wew. 15—30 kropli w kapsułk. 1·0 = 1 kr.

***Zedoariae rad.** (rhiz) stosow. jak Rad. Zingiberis. 10·0 = 4 kr.

Zincum acetieum wewn. 0·03—0·10! *p. d. k. r. d.* — 0·30!

p. die (jako środek wymiotny 0·50 aż do skutku); zewn. do płukań (1·0:100), do opatrunków, przemywań, przestrzykiwań (1·0—5·0:100), do cewki moczowej (0·25—1·0:100), do ucha (2·0—4·0:100), w maści (1·0—10·0). 1·0 = 4 kr.

— ***chloratum** wewn. 0·003—0·01—0·015! *p. d.* — 0·10 *p. die* rozpuszcz. w wodzie, eterze lub pigułk.; zew. w substancyi przeciw bólu zębów, do opatrunków (1·0:100—500), do przestrzykiwań (0·25—0·50:100), do penzłow. (0·10—1·0:25), do maści (1·0:10·0), jako pasta żrąca (1·0:4·0 pulv. rad. alth.). 10·0 = 10 kr. — **Liquor Landolii s.** Aurum chloratum (Zinc., aur., stib., Brom. chlorat. āā 1, Farina tritic.).

— **cyanatum** 0·005! *p. d.* postępując w górę aż do 0·03 *p. d.* 1—4 r. dz. w proszk., pig., do maści do ocz (0·10:10). 0·10 = 1 kr. — **Z. ferrocyanat.** 0·03—0·15 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig. 1·0 = 3 kr.

— ***oxydatum** 0·05—0·20—0·40 *p. d. k. d.* — 2·0 *p. die* w pig., proszk., mixt.; zewn. jako zasypka, proszek do ocz (1·0:1—5 sacch.), do wdmuchiwań do krtani, wody do ocz (0·20—1·0:25), do maści (1·0—5·0:20), do czopk. (1·0:5·0). 10·0 = 20 kr. —

***Unguent. Zinci oxydat.** 10·0 = 12 kr.

— **phosphoratum** 0·001—0·005 *p. d.* 2—3 r. d. w pig., proszk., 0·10 = 2 kr.

— **sulfocarbolicum** tylko zewn. do okładów, opatrunk. (1·0:100—200), do przestrzykiwań do cewki (0·05—1·0:100), do pochwy (0·10—1·0:100). 1·0 = 2 kr.

— ***sulfuricum** 0·005—0·01—0·05! *p. d.* — 0·30! *p. die*; jako alter. i nauseos; jako emetic. 0·30—0·50—0·80! *p. d.* aż do skutku; zew. do wdmuchiwań do nosa, krtani, ocz (1·0:5·0 sacch.), do płukań gardła (0·10—0·50:100), do penzłow. (1—2⁰/₁₀), do kąpieli, maści (0·10—1·0:100), jako środek żrący w przeciekach l. w zgęszczonym rozpuszcz. (1·0:2·0). 10·0 = 3 kr. — ***Collyrium adstring. luteum** (Zinc. sulf. 1, Aqu. 100, Spirit. ammon. chlor., Camphor., Crocus). 10·0 = 3 kr.

— **valerianicum** 0·03—0·06! *p. d.* — 0·30! *p. die* w proszk. lub pig.

***Zingiberis rad.** (rhiz) 0·30—1·50 *p. d. k. r. d.* w proszk., pig., powidełk., infus. (5·0—20·0:100); zew. do płukań (w infus. 10·0—15·0:100). 10·0 = 5 kr. — **Tinet. Z.** 10—30 kropli *p. d.* 10·0 = 4 kr.





WIADOMOŚCI ZAWODOWE

według kalend. lekarsk. Dr. St. Sawickiego z r. 1890

przejrzał i dopełnił

Dr. W. Momidłowski

c. k. lekarz powiatowy.



Akuszerka.

Po otrzymanym dyplomie akuszerki powinny zgłosić się do Starostwa lub Magistratu i oznajmić, gdzie chcą zajmować się praktyką. Mieszkanie ich ma być tablicą odpowiednią oznaczone. Akuszerki podlegają miejscowemu lekarzowi urzędowemu. Każda akuszerka powinna mieć: serengę średniej wielkości z kanką kościaną stolcową, jakoteż z cynową kanką pochwową, kateter metalowy i kateter elastyczny dla kobiet, nożyczki i tasiemkę do pępka, szarpie, kilka gąbek, krople cynamonowe i krople Hofmanna, oliwę karbolową (2 na 50 oliwy), mocny ocet, szczoteczke do paznokci, a nareszcie rozczyzn krystalicznego kwasu karbolowego (10 na 500). Tym rozczyznem ma sobie po zwykłym oczyszczeniu obmyć ręce przed każdym badaniem części płciowych lub rękoczynem u brzemiennych, rodzących albo położnych. Również narzędzia swe i gąbkę po każdym użyciu ma dokładnie oczyścić i opłukać tym rozczyznem. Akuszerki powinny żyć przyzwoicie i wezwane w każdej chwili nieść pomoc; dochować powierzonej tajemnicy a podczas porodu nie oddalać się od rodzących, szczególnie w przypadkach grożących niebezpieczeństwem. Jeżeli poród wymaga użycia narzędzi chirurgicznych, powinny wcześniej wezwać lekarza. Jeżeli dziecko jest pozornie zmarłe, akuszerka powinna starać się zn.nymi środkami przywołać je do życia. Akuszerka obsługująca położnicę, ma donieść do 24 godzin o urodzeniu dziecka temu, kto utrzymuje rejestr nowonarodzonych, wymieniając nazwisko matki, tudzież czy ta jest wolną, zamężną lub wdową. W tym też celu ma być akuszerka obecną w czasie chrztu. Obowiązkiem jej jest donosić także o dzieciach urodzonych nieżywo, dla poddania ich oględzinom. Jeżeli akuszerka ma podejrzenie, że dopuszczono się dzieciobójstwa lub spędzenia płodu, powinna natychmiast uwiadomić o tem miejscową władzę policyjną. Akuszerka, która sama się stała tego sprawczynią, podpada surowości ustawy karnej. Jeżeli władza administracyjna lub sądowa poleci akuszerce zrobienie oględzin, powinna tego dokonać i o tem co zajdzie donieść. Akuszerka

prowadzi wykaz porodów, przy których była. (Dziennik ust. kr. z 1881 r. Nr. 49).

Akuszerki gminnych lub okręgowych płaca wynosi najmniej 100 złr. rocznie albo 2 złr. od każdego porodu u ubogich, albo 50 złr. rocznie i 1 złr. od porodu. (Rozp. Namiest. z 30 sierpnia 1892 r. L. 67596 Dz. u. i r. kr. Nr. 65).

Alkaloidy.

Nikotyna: eteryczny roztwór nikotyny zaprawiony eterem. roztworem jodu wydziela kryształki igiełkowate w świetle odbitem niebieskie, w przepuszczonym czerwone.

Apomorfina z roztworem jodku potasu daje zabarwienie krwisto-czerwone, z chlorkiem złoto-purpurowo-czerwone, z kw. garonikowym zielonawo-żółte.

Atropina rozpuszczona w kilku kroplach zgęszcz. kwasu azotowego daje po odparowaniu pozostałość bezbarwną, która po oziębieniu zabarwia się po dodaniu wyskok. roztworu ługu potas. na fioletowo a później wiśniowo-czerwono.

Cocaina w zgęszczonym roztworze daje z nadmanganizmem potas. osad fioletowy.

Codeina rozpuszczona w zgęszczonym kw. siarkowym po dodaniu kilku kropli kw. azotowego daje zabarwienie krwisto-czerwone. Sole codeiny nie barwią się z chlorkiem żelaza na niebiesko (różnica od morfiny).

Morfina w roztworze obojętnym daje z roztw. chlorku żelaza (bez wolnego kw. solnego) zabarwienie ciemno-niebieskie. Zgęszczony kw. solny rozpuszcza morfinę barwą krwisto-czerwoną wolno w żółtą przechodzącą. Roztwór ten za dodaniem chlorku cynowego lub siarkanu amonu nie przechodzi w barwę fioletową tak jak brucyna.

Physostygmina za dodaniem chlorku wapna barwi się czerwono.

Strychnina w roztworze zgęszczonym kw. siarkowego daje z chromanem potasowym, nadżelasinkiem potasu lub innemi solami utleniającemi zabarwienie niebieskie, które szybko przechodzi w fioletowe i wiśniowo-czerwone a następnie znika.

Veratrina dodana w stanie stałym do zgęszcz. kw. siarkowego tworzy żółtą bryłkę, która następnie rozpuszcza się barwą żółtą przechodzącą po pewnym czasie w pomarańczową, krwisto-czerwoną a wreszcie wiśniowo-czerwoną.

Apteki i aptekarze.

Tylko według recept przez upoważnionych do tego lekarzy i chirurgów podpisanych lekarstwa w aptece robione być mogą. Nie wolno aptekarzowi robić uwag nad receptą lub nad lekarzem przed osobą, która przyszła po lekarstwo. Ostro zakazano aptekarzowi mieć tajne porozumienie z lekarzami na szkodę chorego lub kupującego. Gdyby recepta była nieczytelna lub niezrozumiała, nie może być pierwaj zrobioną dopóki od lekarza wyjaśnienie nie zostanie zaciągnięte. Aptekarz jest obowiązany przekonać każdego lekarza aptekę odwiedzającego o dobroci i gatunku każdego swego lekarstwa i ma mu takowe na żądanie okazać.

(Dekr. kanc. nadw. z dnia 1 stycznia 1825 roku L. 982 dz. u. kr. Nr. 29).

Dyplom magistra farmacyi nie uprawnia do samoistnego wykonywania zawodu aptekarskiego. Do uzyskania tego prawa potrzebny jest jeszcze dowód 5-letniej zawodowej służby odbytej po uzyskaniu stopnia magistra farmacyi o ile nie wchodzi w zastosowanie ulgi w rozp. Minist. z 9 maja 1890 r. dz. u. p. Nr. 81 wymienione. (Rozp. Min. spr. w. z 13 marca 1892 r. L. 27295 ex. 1891).

Sprzedaż leków bez zachowania istniejących przepisów i ostrożności, jest przekroczeniem pociągającym karę na właściciela i prowizora apteki, jakoteż i na pomocnika aptekarskiego. Jeżeli o sprzedaży takowej właściciel nie wiedział, to za brak dozoru podlega karze od 25—50 złr., po raz drugi od 50—100 złr., a za trzecim razem zarząd apteki będzie mu odebrany i prowizor ustnowiony. Zakazano sprzedawać arkana, t. j. lekarstwa nieznanne z istoty i składu chemicznego. Nie wolno także sprzedawać bez ordynacyi lekarza lekarstw oznaczonych w «farmacopea austriaca», ani też sprzedawać wyżej oznaczonych tam taks. Jeżeli właściciel o sprzedaży zakazanej wiedział, to za pierwszym razem karany będzie od 50—100 złr., za drugim od 100—200 złr., a gdyby z tego kto szkodę poniósł, to i ścisłym aresztem od 1—6 miesięcy (§. 345 ust. karn.). Jeżeli lekarstwo fałszywe lub źle przyrządzonem było tak, że skuteczność lekarską straciło, ślają się winni przekroczenia pomocnik i właściciel lub prowizor apteki za brak dozoru. Każdy lekarz, który coś podobnego dostrzeże, obowiązany jest donieść zwierzchności pod własną odpowiedzialnością (§. 349 ust. karn.). Jeżeli w aptece lekarstwa zostaną przemienione, albo nienależycie wydane, wydający karany będzie aresztem tygodniowym, w razie zachodzącej większej i częstszej nieuwagi aresztem do 3 miesięcy (§. 353 ust. karn.). Za nieprawą sprzedaż leków przez osoby do tego nieupoważnione, areszt od 1—3 mies., jeżeli się okazały szkodliwe skutki, to areszt od 1—6 mies., a oprócz tego wszystek zapas ma być przestępcy odebrany (§. 354 ust. karn.).

Lekarzom i chirurgom dozwolono jest utrzymywać aptekę domową, jeżeli w miejscu ich zamieszkania i w okręgu jednej mili, żadna apteka się nie znajduje (dekr. kancel. nadwor. 3 listopada 1808 r.).

Apteki domowe

lekarzy i chirurgów są wolne od podatków zarobkowego i dochodowego. (Rozp. Min. skarbu 25 list. 1859 r. L. 30314).

Budynek

murowany podczas wiosny pod dach doprowadzony a w jesieni narzucony może być dopiero w następnej wiosnie zamieszkanym. Budynek zaś w jesieni pod dach doprowadzony a w następnej wiosnie narzucony może dopiero w jesieni do zamieszkania być oddany. Gdyby w powyższym okresie czasu tylko niektóre części domu zostały wykończonemi, może Zwierzch. gminna dać pozwolenie na częściowe zamieszkanie budynku, jeżeli odpowiada

warunkom bezpieczeństwa publicznego i wymogom sanitarnym. W każdym domu mieszkalnym mają być urządzone wychodki. W domach piętrowych wychodki urządzone być muszą w bezpośrednim połączeniu z budynkiem. W parterowych można je umieścić osobno jednak tak, aby były od ulicy niewidoczne. Na każde dwa mieszkania przypadać powinna przynajmniej jedna komórka. Rada gminna wydaje przepisy co do systemu odpływu nieczystości (system dołowy, kanałowy, beczkowy). Oddalenie zbiorników ma wynosić przynajmniej 2 mtr. od granicy sąsiedniej a uajmniej 8 mtr. od najbliższej studni. Przy systemie kanałowym obowiązany jest budujący urządzić kanały poboczne murowane i kityte, których wymiary wynosić mają najmniej 60 ctm. szerokości a 80 ctm. wysokości. (Ust. budowl. z 4 kwietnia 1889 r. dz. u. i r. kr. Nr. 31).

Budynki nowo wystawione nie mogą być ani zamieszkane ani na inny cel użyte przed uzyskaniem pozwolenia Zwierzchności gminnej. Kto bez podobnego pozwolenia świeży dom zamieszka jak zarówno i właściciel, który na to pozwoli, będzie karany arestem od 3 dni do 1 miesiąca lub utratą półrocznego czynszu najmu §. 386 u. k.

Cennika

leków i normy ordynacyjnej nie przytaczamy, ponieważ zmieniają się co roku. Każdy lekarz powinien się w niego zaopatrzyć. (Rozp. Min. spr. w. z 14 grudnia 1894 r. L. 32601 dz. u. i r. kr. Nr. 6).

Cholera.

O podejrzanym wypadkach zasztabnięcia należy natychmiast c. k. Starostwu donosić. Telegramy z doniesieniami tego rodzaju są wolne od opłaty w myśl rozp. Minist. handlu z 17 paździer. 1869 r. L. 17900 (dz. u. p. Nr. 159) i rozp. Minist. spr. w. z 13 listop. 1892 r. L. 27267. Po sprawdzeniu cholery należy bezwzględnie chorych izolować pod strażą w ich własnym mieszkaniu a domowników umieścić w domu izolacyjnym i w razie potrzeby żywić na koszt Skarbu państwa, pozostawiając przy chorym tylko osoby do pielęgnowania koniecznie potrzebne, albo chorego przenieść do szpitala izolacyjnego, jeżeli izolacja w mieszkaniu jest niemożliwą. Należy zabezpieczyć odpowiednią opiekę lekarską oraz leczenie ewentualnie na koszt rządu. Należy przeprowadzić rewizję wszystkich domów, śledząc za wypadkami choroby zatajonemi. Po ukończeniu się choroby przeprowadzić dezynfekcję jak najściślej według obowiązujących przepisów (patrz dezynfekcja). Należy pouczyć osoby pielęgnujące chorego i zatrudnione zwłokami jak się mają zachować dla osobistej ochrony. Dla dopilnowania wykonania zarządzeń eksponować c. k. Żandarmerię a w miarę potrzeby urzędnika politycznego (Rozp. Namiest. z 29 sierpnia 1893 r. L. 70714). Obowiązkiem lekarza cholerycznego jest głównie udzielać chorym pomocy lekarskiej, przepisywać dla nich leki i dyetę, instruować służbę niższą jakoteż osoby pielęgnujące chorych, podawać komisarzowi wykaz na dzień następny potrzebnych wiktuałów i innych potrzeb dla izolowanych, śledzić za tajnymi przypadkami cholery, zarządzać dezynfekcję i osobiście

dozorować jej wykonania i wreszcie wykonywać osobiście oględziny zwłok w przydzielonym mu okręgu. (Rozp. c. k. Namiest. z 6 września 1894 r. L. 72455). Jeżeli urzędnik polityczny nie został delegowanym ma lekarz choleryczny przedkładać c. k. Starostwu codziennie telegraficzne lub pisemne sprawozdanie z wymienieniem świeżo na cholere zapadłych, wyzdrowiałych i zmarłych z podaniem imienia, nazwiska, wieku, Nr. domu i zatrudnienia. Lekarz delegowany do zbadania pierwszych wypadków cholery lub o nią podejrzanych winien przed wyjazdem zaopatrzyć się na koszt Skarbu Państwa w potrzebne utensilia do przesłania obiektów cholerycznych i przesyłać je bezzwłocznie c. k. Namiestnictwu (Reskr. Namiest. z 24 kwietnia 18:3 r. L. 31425). Obiekty te o ile w drodze urzędowej nie zostają wysyłane przez c. k. Starostwo, podlegają zwykłej opłacie pocztowej, którą ponosi wysyłający za zwrotem z funduszu Państwa po dołączeniu kwitu pocztowego. Każda przesyłka ma być oznaczona napisem: «Mikroskopijne preparaty».

Szczegółowe i bardzo instruktywne pouczenie o postępowaniu policyjno-sanitarnem podczas panującej cholery zestawił i wydał nakładem c. k. Starostwa w Krakowie Dr. Józef Barzycki c. k. lekarz inspekcyjny.

Nadmienić należy, że wobec niedokładnych środków, jakie przeciw zawleczeniu cholery posiadamy, stanowi główną i niemal jedyną broń przeciw rozszerzeniu się tej choroby jaknajszybsza i najdokładniejsza izolacja pierwszych wypadków chorobowych oraz z wszelką pedanterią i rozumnie przeprowadzona dezynfekcja (patrz dezynfekcja).

Choroby syfilityczne.

Podejrzane o nią osoby mają być rewidowane przez lekarza z polecenia Zwierzchn. gminnej i przed wydaleniem z miejsca w drodze przymusowej być winny wyleczone (Dek. k. z 29 maja 1827 r. L. 13068).

Choroby zaraźliwe zwierząt.

(Ust. 29 lutego 1880 r.). Tu się zaliczają: a) zaraza pyskowa i racicowa bydła rogatego, owiec, kóz i świń; b) zaraza śledzionowa czyli waglikowa zwierząt domowych; c) zaraza płucna bydła rogatego; d) nosaczina i tyłczak u koni, osłów i mułów; e) ospa u owiec; f) zaraza stadnicza i otręt na częściach płciowych u koni i rogacizny; g) parchy u koni i owiec; h) wścieklizna psów i innych zwierząt domowych; i) księgosusz.

W razie wybuchu jednej z tych chorób, władze admin. powiatowe mają zarządzić na razie pierwsze środki tymczasowe i uwiadomić natychmiast władze krajowe.

Cmentarze.

Wszelkie katakomby i cmentarze w obrębie zamieszkań znajdujące się, mają być zamknięte i założone w pewnej odległości od takowych. Na cmentarz ma być wybrane miejsce do ilości dusz odpowiednie, któreby nie cierpiało przez wylewy wód, ani też nie miało gleby wstrzymującej butwienie; miejsce to ma być

murem obwiedzione. Krewnym dozwolono obok murów stawiać pomniki. (Dekr. kanc. nadw. 20 sierpnia 1784).

Cmentarze powinny być dla zdrowia nieszkodliwe i dla bydła niedostępne, mają być obwiedzione parkanem (murem), albo żywym płotem, rowem głębokim i obsadzone drzewami i krzewami, tudzież aby się trzymano porządku przy wykopywaniu grobów. (Rozp. Nam. 20 stycznia 1860. L. 802).

Groby mają być 6 stóp głębokie, 6 st. długie i 2 st. szerokie; między grobami ma być miejsce na 2 st. zostawione. Przy tworzeniu nowych cmentarzy, ma być wzięta ogólna ilość zmarłych w ostatnich 10 latach za podstawę do obrachowania potrzebnej przestrzeni, rachując $\frac{3}{4}$ sążnia kwadratowego na każdy grób. Pomnożywszy więc te dwie liczby, potrzebna przestrzeń na cmentarz się okaże. (Gub. dek. 22 grudnia 1837).

Cmentarze powinny być zakładane poza obrębem miejscowości, w oddaleniu najmniej 5 sążni od każdego zamieszkałego budynku, nie w pobliżu plebanii, mianowicie zaś na placach pustych, pastwiskach, gdzie nie są narażone na zalanie wodą i gdzie ziemia nie przeszkadza gniciu. (Dekr. nadw. kanc. 24 waja 1825. L. 12404).

Dentystyczni technicy.

(Okólnik Minist. spr. wewn.). Tylko sporządzanie sztucznych zębów i szczęki jest wolnem prawem zarobkowania. Wykonawcom takich zębów, jeżeli nie są lekarzami, zabronioną jest każda operacya jakoteż montowanie i wstawianie zębów. Rozporządzeniem tem cały zakres dentystyki oddany został w ręce lekarzy.

Dezynfekcyja.

Choroby wymagające dezynfekcyi są: cholera, ospa, błonica, wszystkie formy tyfusu, czerwotka, płonica, odra i różyczka, róża i choroby przyranne, węglik i nosaczka, gorączka połogowa, wścieklizna, zakaźne zapalenie spojówek oka, suchoty płuci i koklusz.

Pospolicie używanymi środkami dezynfekcyjnymi są: gorąca para wodna i środki chemiczne. Do 100° C. ogrzana para wodna niszczy prątki węglikowe w przeciągu kilku minut. W przedmiotach suchych giną zarazki pod działaniem pary 100° C. w ciągu 60—90 minut, w wilgotnych w ciągu 2 godzin. W siennikach 17 ctm. grubych i w innych przedmiotach lekko zwiniętych umieszczone zarodniki węglikowe giną już po 20 minutach. Prątki tyfusowe i choleryczne giną już przy ciepłocie pary 98.5—95° C. po nieco dłuższym czasie. Dla przekonania się czy w zwiniętych przedmiotach w aparacie dezynfekcyjnym doszła ciepłota do 100° C. służą termometry sygnałowe. Przy działaniu gorącej pary niszczą się przedmioty skórzanne i futra, materye wełniane białe żółkną, nie tracąc wytrzymałości, materace i płótno nie doznają zmian. Działanie suchego, gorącego powietrza jest znacznie mniej skuteczne jak pary już dlatego, że znacznie trudniej wnika w głąb przedmiotów.

Środki chemiczne do dezynfekcyi rąk i przedmiotów prać się dających są: 1‰ sublimat, 5‰ kw. karbolowy, 2‰ lysol, 5‰ kreolina, 2‰ soda, 1 $\frac{1}{2}$ ‰ rozczyn mydła potasowego.

Do dezynfekcyi wychodków służą: mleko wapienne (świeżo sporządzone z 1 cz. wapna niegasz. na 20 cz. wody), siarkan miedziowy w roztoczynie nasyconym. Surowy kwas karbolowy służy tylko do odwonienia.

Dotkniętego zakaźną chorobą należy odosobnić, a w izbie jego zostawić tylko te sprzęty i przedmioty, które są konieczne, resztę zaś usunąć.

Suknie, które chory nosił i używaną bieliznę, należy odrzucić. Bieliznę wszelką, zdjętą z chorego lub z jego łóżka, należy przed praniem namoczyć na 12 godzin w naczyniu w izbie chorego stojącym i zawierającym 5% roztwór kw. karbolowego. Odzież odrzuca się parą wodną. Śmiecie, szmaty używane do wytarcia odchodów, zanieczyszczone opatrunki i słomę z pościeli najlepiej spalić. Narzędzia lekarskie i przyrządy obmyć wodą i mydłem, potem włożyć do 5% kw. karbolowego na godzinę. Wymiociny odchody stolcowe i mocz, płwocinę i t. d. należy zbierać w naczynia napełnione do czwartej części kwasem karbolowym, a potem wylać do wychodka. Jeżeli chory używał przenośnego waterklozetu, to przed użyciem takowego przez zdrowych, należy siedzenie zmyć i lejek odchodowy silnie zlać 5% karbolem.

W ospie, płonicy, odrze i różyczce, należy szczególnie zważać na odpadki skórne, jako na przenośniki choroby. W węgliku i w chorobach przyrannych zwracać szczególną bacność na opatrunki i instrumenta użyte, w zakaźnem zapaleniu oczu na ręczniki i chustki do nosa, które wydzielinami z oczu mogą być zanieczyszczone, na opatrunki, gąbki i miedniczki użyte przy obmywaniu powiek; w kokluszu i suchotach płuc na płwociny i rzeczy przez nie powalane.

Po ukończonej chorobie należy ozdrowieńców wymyć w kąpieli mydlanej, dać czystą bieliznę i odzież odrzuconą lub nieużywaną, wodę zaś z kąpieli wylać do wychodka, wannę lub miednicę wymyć roztworem karbolu i tymże roztworem zlać rurę spustową w wychodku. Zwłoki zmarłych na choroby zakaźne po stwierdzeniu śmierci, bez obmywania zawinąć w płótno napojone 5% roztw. karbolu włożyć do trumny i co najrychlej wynieść z mieszkania. Wystawiania takich zwłok na widok należy zabronić. Wszystkie przedmioty używane przez chorych, jakoto: łóżka, sprzęty, materace a także firanki, zasłony, dywany i t. d. należy poddać dezynfekcyi parą wodną. Do przenoszenia tych przedmiotów do aparatu dezynfekcyjnego używać skrzyń szczelnie zamykających się lub owinięcia w płótno napojone 5% karbolem. Skrzynie lub inne użyte środki przewozowe po wypróżnieniu oczyścić 5% karbolem a potem wodą. Sprzęty pokryte skórą wytrzeć gąbką umaczaną w roztwór karbolowy, potem płatem płótna znaczanym w wodzie, a w końcu suchą. Meble pokryte kosztownymi materjami wystawić na działanie mgły karbolowej, potem wytrzeć suchemi wełnianemi płatami i na wolnem powietrzu lub na strychu przewietrzyć przez dni kilka. Sprzęty drewniane i metalowe oczyszcza się roztworem kwasu karbolowego i mydłem szarem. Drzwi, okna, podłogi, futryny należy wytrzeć kwasem karbolowym, a potem obmyć wodą z ługiem. Ściany i sufity trzeba oskrobać i po nowem zatarciu pobielić wapnem karbolo-

wym (1:100 części mleka wapiennego), następnie przez czas dłuższy przewietrzyć. Osoby pielęgnujące chorych lub zatrudnione przy odrażaniu nie powinny w izbie chorego jeść, pić lub palić tytoniu, ubranie mają mieć ściśle przylegające do ciała, a wychodząc powinny zmyć dobrze ręce, głowę, twarz i zarost mydłem, a po każdym pielęgnowaniu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem zapomocą szczoteczki a potem 5% karbolem; osoby te, nim będą użyte do innych posług, powinny się wykapać, obmyć ciało mydłem a odzienie ich obowie i bielizna mają być dezynfekcyowane. Nie wolno używać publicznych dorożek do przewożenia dotkniętych zakaźną chorobą. Nie dozwalać zwierzętom domowym przebywać w izbie chorego; niszczyć muchy, które są częstym czynnikiem przy przewlekaniu zarazy. (Dz. u. k. 15 paźdź. 1887. Nr. 56).

Na pobojowiskach zagrzebać należy przedewszystkiem gnijące resztki, posypawszy chlorkiem wapna, wapnem lub ziemią i zasiał roślinami szybko rosnącymi.

Podczas epidemii cholery należy postępować jak powyżej z tą różnicą, że w braku aparatu dezynfekcyjnego należy według obowiązujących przepisów, wszystkie przedmioty nie dające się wymoczyć w kw. karbolowym jakoto kożuchy, futra, pościel z pierza, chustki wełniane, kołdry i tp. polecić oszacować i spalić na koszt Skarbu Państwa. Wszystkie zaś sprzęty bez żadnego wyjątku z domu na podwórze wynieść, świeżo gaszonem wapnem dokładnie wybielić a po 12 godzinach należy zmyć, podłogę dobrze takimże wapnem zlać a ściany izby obieleć. Również płoty, ścieżki, przełazki i wszelkie miejsca o zakażenie podejrzane, należy wapnem zlać i obieleć. Potem dopiero przeprowadza się dezynfekcyę odzieży, zajętych przy oczyszczeniu domu osób. Zapasy chleba przepieka się w piecu, zapasy zaś kaszy, zboża, mąki, soli itp. suszy się w piecu lub na blasze. Jeżeli ze studni czerpano wodę konewkami z zakażonego domu, należy do studni wsypać $\frac{1}{2}$ —1 korca niegaszonego wapna, wodę kilka razy żerdzią zakłócić i po 48 godz. wylać. Po przeprowadzonej dezynfekcyi pozostaje dom i jego mieszkańcy jeszcze przez 5 dni w izolacyi i obserwacyi.

Egzamin

w celu uzyskania posady w publ. służbie zdrowia.

Egzamina mają miejsce na wiosnę i w jesieni każdego roku. Chcąc być dopuszczonym do egzaminu należy się wykazać: 1) Dyplomem doktora wsz. nauk lekarskich, 2) Znajomością psychiatrii przez świadectwo uczęszczania na kursa psychiatrii i złożonego collegium lub 3 miesięcznego uczęszczania do kliniki psychiatrycznej po doktoracie, 3) Świadectwem ukończenia kursu szczepienia ospy i nauki o chorobach zwierzęcych, 4) Dowodem, że kandydat po otrzymaniu stopnia doktora przynajmniej przez dwa lata praktykował w publicznym szpitalu lub klinice lub przez 3 lata zajmował się praktyką prywatną.

Przedmiotami egzaminu są:

1) Hygiena i ustawy sanitarne. 2) Medycyna sądowa i psychiatria sądowa (praktycznie). 3) Farmakognozia i toksykologia

(praktycznie i teoretycznie). 4) Chemia lekarska (praktycznie). 5) Polityka weterynarska. Taksa za egzamin wynosi 24 złr. (Rozp. Min. spr. w. z 21 marca 1873 dz. p. p. 37).

Epidemie.

Jako choroby epidemiczne uważane są: 1) dżuma, 2) cholera, 3) tyfus, 4) szkarlatyna, 5) ospa, 6) błonica i dławiec, 7) ksztuś, 8) odra, 9) czerwotka, 10) gorączka połogowa, 11) kiła, 12) świerzb, 13) wścieklizna.

Obowiązek donoszenia o chorobie epidemicznej ciąży w pierwszym rzędzie na głowie rodziny, następnie na Zwierzchności gminnej, lekarzach, duszpasterzach, ogłądaczach zwłok.

Choroba przybiera charakter epidemiczny, jeżeli w tym samym czasie zachoruje więcej jak 5 osób w gminie, albo więcej jak dwie osoby w jednym domu (na ospę naturalną i cholere nawet 1 osoba).

W czasie epidemii należy w myśl §. 4 ustawy z d. 30 kwietnia 1870 r. starać się o izolowanie chorych z całą surowością w szpitalu izolacyjnym. W braku tego izolować w domu, zabraniać odwiedzać chorych, przenosić chorych z domu do domu lub przewozić z jednej gminy do drugiej. W okręgu epidemicznym wzbronić handlu szmatami i w ogóle domokrąstwa. Należy zwracać szczególną uwagę na stan zdrowia włóczęgów, osób wędrownych, szupaśników i więźniów. W razie szerzenia się epidemii wzbronić tłumnych zgromadzeń, targów, odpustów, gromadnego brania udziału w pogrzebach zmarłych na chorobę zakaźną, styp pogrzebowych i t. d. Gdy choroba pojawi się w karczmie lub innym lokalu publicznym zamknąć tenże. Podczas epidemii tyfusu brzuszego, cholery, czerwotki, zwracać szczególną uwagę na stan studzien i jakość wody do picia. Wzbronić używania wody z potoków przez zakażoną miejscowość przepływających. Wzbronić prania bielizny w takich potokach. Gdzie to możebnem urządzić przy studniach stałe przybory do czerpania wody. Starać się, aby na podwórzach i obejściach utrzymywano wzorową czystość. Po wygaśnięciu epidemii w domu należy przeprowadzić dokładną dezynfekcyę domu, odzieży i pościeli (patrz: dezynfekcyja). Dzieciom szkolnym, dotkniętym chorobami zakaźnymi nie wolno uczęszczać do szkoły, dopóki się nie wykażą świadectwem lekarskiem, że powrót ich do szkoły nie zaszkodzi innym dzieciom. Jeżeli świadectwo takie nie może być przedłożonem, to powrót do szkoły dozwolonym jest dzieciom, które przebyły ospę, szkarlatynę i dyfteryę po 6, zaś odrę po 4 tygodniach. Przy świerzbie orzeka Rada szkolna miejsce. Nauczycielom i dzieciom zdrowym wprowadzić, lecz zostającym w styczności z chorymi na tyfus, ospę, szkarlatynę lub dyfteryę nie wolno chodzić do szkoły, aż powyższy okres u chorej osoby przeminie. W razie szerzenia się epidemii szkołę zamknąć. Młodzieży szkolnej nie wolno gremialnie prowadzić na pogrzeb osoby zmarłej na chorobę zakaźną.

Lekarze delegowani do miejscowości zakażonych mają przedewszystkiem pouczyć ludność o rodzaju choroby i zaraźliwości tejże, polecić wykonanie środków policyjno-sanitarnych.

wykonania tychże przypilnować, pod własną kontrolą kazać przeprowadzić dezynfekcyę domu, bielizny i pościeli, dla ubogich chorych przepisać potrzebne leki. W razie niechęci wykonania środków policyjno-sanitarnych lub oporu, natychmiast o tem c. k. Starostwu donieść. Sprawozdania o przebiegu epidemii mają być c. k. Starostwu przedkładane na przepisanych formularzach w okresach tygodniowych, przyczem tydzień liczy się od niedzieli rano do soboty wieczór. Po ukończeniu epidemii należy przedłożyć sprawozdanie końcowe, w którym należy wyszczególnić źródła zawleczenia choroby, procent śmiertelności, zarządzone i wykonane środki policyjno-sanitarne; przebieg choroby i inne szczególne uwagi.

Eter.

Wszelkie mieszaniny eteru (krople Hoffmana) uważać należy jako leki złożone, których sprzedaż dozwolona jest jedynie aptekarzom. Aptekarze przy wydawaniu tych mieszanin muszą przestrzegać tych samych przepisów jak przy wydawaniu leków ostro działających. (Rozp. Min. sp. w. z 29 stycznia 1883. L. 19988).

Falszowanie pokarmów i napojów.

Mleko zaprawione skrobią daje z roztworem jodku potasu zabarwienie fioletowe.

Kreda i gips tworzą po dłuższem odstawieniu mleka w waskim cylindrze osad, który po zlanu mleka i wymyciu wodą badać należy analitycznie na te składniki.

Badając na kwas salicylowy zaprawia się mleko kilkoma kroplami rozcieńczonego kwasu siarkowego aż do stężenia mleka, następnie odsąca się, odsącz odparuje się, pozostałość zaprawia eterem i odparuje przy zwykłej ciepłocie. Pozostałość daje z roztworem półtorachloru żelazowego zabarwienie fioletowe od kw. salicylowego pochodzące. Węglały alkaliczne wykazać można dodawszy do 10 ctm³ tyleż alkoholu i kilka kropli 1% kwasu rosolowego (koraliny). Czyste mleko zabarwia się wtedy brunatnawo-żółto, zaprawione zaś węglanami alkalicznemi, czerwono.

Masło bada się w tym samym kierunku i w ten sam sposób jak mleko. Poprzednio jednak wygotowuje się je wodą i bada się odsącz.

Mąka. Składniki mineralne wykazać można kłócąc 5 gm. mąki z 30 cm³ chloroformu; po dodaniu 30 kropli wody i zamieszaniu wypływa mąka na wierzch, części zaś mineralne pozostają w warstwie chloroformu i służą do dalszej analizy.

2 gm. mąki kłócone przez dłuższy czas z 10 cm³ 70% alkoholu zawierającego 5% kwasu solnego odstawia się w spokoju. Jeżeli mąka jest czysto żytnia lub przennieczna, to pozostaje tak mąka jak i płyn w p. obówce bezbarwnym, tylko przy grubej mące barwi się nieco żółtawo. Mąka jęczmienna, owsiana, grochowa i kukurydzana barwią płyn żółtawo. Mąka zanieczyszczona kąkolem daje zabarwienie ciemno-pomarańczowe, wyką pięknie purpurowo-czerwone, sporyszem krwisto-czerwone.

Chleb. Na sole mineralne bada się po spaleniu pozostałość drogą analityczną.

Konserwy owoców i jarzyn bada się na miedź, ołów i cynę w ten sam sposób jak chleb.

Wino zabarwione być może barwikami anilinowymi i roślinnymi. Roślinne przeważnie dla zdrowia nieszkodliwe. Bada się więc głównie na anilinowe czyli smolne. Wino zabarwione barwikami anilinowymi po dodaniu rozc. octanu ołowiowego nie odbarwia się. Do wina daje się nitkę jedwabną i odparowuje, następnie oblewa się ją ługiem, gdy się odbarwia to była fuksyna.

Gotuje się 50 cm³ wina czerwonego z nitkami wełnianymi, wtedy zabarwią się na czerwono, odlawszy płyn, nitki po opłukaniu wodą się nie odbarwią, po dodaniu jednak ługu odbarwią się. Jeżeli do tego dodamy eteru i wyklócimy to do eteru przyjdzie anilina sama, którą bada się z destelatu podchlorynem sodu lub wapna przyczem daje zabarwienie niebieskie.

Piwo badając na kw. pikrynowy odparowuje się w ilości pół litra, pozostałość wyciąga się eterem, który po odparowaniu pozostawia blaszki lub igiełki kw. pikrynowego. Te rozpuszczone w wodzie barwi silnie na żółto nitki jedwabne i wełniane.

Oceć zawierający wolny kwas siarkowy pozostawia po odparowaniu z cukrem gronowym pozostałość ciemno-brunatną lub czarną. Czysty ocet zaś żółto lub ciemno-żółtą. Ołów i miedź wykrywa się kw. siarko-wodowym.

Wszelki dodatek, domieszanie lub fałszowanie, które już samo z siebie albo przez użyte przytem materiały nadać może przez sposób przyrządzania lub przez naczynia do przyrządzania lub przechowania użyte rzeczy jakiegokolwiek bądź rodzaju do pożywienia służącej szkodliwą dla zdrowia własność za przestępstwo ma być uważane i karane (§. 407 u. k.).

Handel truciznami

dozwolonym jest jedynie za zezwoleniem władzy politycznej I instancyi.

Kto bez wyraźnego zezwolenia Zwierzchności handluje trucizną, ten popełnia przekroczenie i karany być winien od 25—100 złr., a drugim razem 100—200, oprócz tego aresztem jednego miesiąca obok utraty towaru (§. 362 u. k.). Nieostrożność przy sprzedaży trucizny osób do tego upoważnionych podlega karze §. 365 u. k.

Honorarium lekarskie

powinno być odpowiedniem do naukowego stanowiska lekarza, oddalenia które ma przebyć, ilości odwiedzin, ciężkości choroby, trudności operacyi nareszcie położenia i zamożności leczonego.

Mamki.

Kobieta wiedząc, że jest dotknięta kiłą lub w ogóle chorobą zaraźliwą z zamięszeniem lub ukrywaniem jej przyjęła służbę za mamkę, ukaraną będzie 3 miesięcznym ścisłym aresztem §. 379 u. k.

Miejscy lekarze

jeżeli leczą chorych na choroby epidemiczne swych miast z wyjątkiem miast o własnym statucie na polecenie c. k. Starostwa

mają prawo do wynagrodzenia (Reskr. Min. z 17 paździer. 1882 L. 11825). C. k. Starostwo winno nie poruczać lekarzowi miejskiemu leczenia ale zawezwać Zwierzchność gminną do udzielenia pomocy lekarskiej chorym w myśl §. 3 ustawy z 30 kwietnia 1870 dz. p. p. L. 68 i przedkładania raportów tygodniowych. Podania lekarzy gminnych o udzielenie remuneracyi za leczenie chorych na choroby zakaźne w miejscu zamieszkania nie będą uwzględnione. (Reskr. Nam. z 30 marca 1885 L. 18732).

Nadzór nad szpitalami powszechnymi i publicznymi w Galicyi.

Dz. ust. kr. z 22 stycznia 1870 Nr. 8.

Art. I.: Nadzór sanit. polic. nad szpitalami pow. i publ., które teraz już istnieją i tymi, które za przyzwoleniem Sejmu otwarte zostaną o ile dotychczas c. k. władzy politycznej przysłuża, pozostaje nadal nieporuszony.

Art. II.: Ze względu na udział funduszu krajowego w opędzaniu kosztów pielęgnowania chorych: 1) Ogłoszenie innych zakładów dla chorych zakładami pow. i publ. nie nastąpi na przyszłość bez przyzwolenia repres. krajowej; 2) wysokość taksy za leczenie chorych ustanawia Wydział kraj. za porozumieniem się z c. k. Namiest.; 3) Pod względem administracyjnym i ekonomicznym zakłady te mają pozostać pod naczelnym kierunkiem i nadzorem Wydziału kraj. a mianowicie: a) Wydziałowi kraj. mają być przedstawione do zatwierdzenia corocznie budżety szpitalne i składane roczne rachunki; b) Wszelkie zmiany w urządzaniu organizacyi tudzież w etacie płac i osób służby szpitalnej tak lekarskiej jak i administracyjnej zawisły od zatwierdzenia Wydziału krajowego; c) bez zezwolenia Wydziału kraj. nie może nastąpić ani sprzedaż ani zamiana ani żadne stałe obciążenie zakładowego majątku szpitalnego tak ruchomego jak i nieruchomości. (Rozp. Min. spr. Wewn. z 12 grudnia 1869).

Nieprawne zajmowanie się leczeniem.

§. 343 u. k. Kto nie odbywszy nauk lekarskich i nie będąc według przepisów prawa jako lekarz upoważniony do leczenia chorych, leczenie w sposób zarobkowy wykonywa lub zajmuje się nim za pomocą magnetyzmu zwierzęcego albo narkotyzacyi popełnia przekroczenie, ukarany być ma aresztem.

Nieegzaminowana akuszerka tam gdzie upoważniona akuszerka jest pod ręką za wykonywanie akuszeryi karana będzie ale tylko w drodze administracyjnej, chyba że ztąd wynikła śmierć człowieka.

Nierząd.

Zwierzchności gminne obowiązane są pod odpowiedzialnością starać się o to, aby nierządnicę wysłędzone przytrzymane i ukarane zostały. Wałęsające się nierządnicę muszą być przez lekarzy rewidowane, a jeżeli są zarażone mają być do leczenia oddane, po wyzdrowieniu zaś do miejsca przynależności odstawione. (Najw. post. z 11 czerwca 1819). Ukazanie nierządnicę pozostawione policyi miejscowej §. 509 u. k.

Obdukcya.

Sądowe oględziny trupa i obdukcya, winny być uskutecznione w każdym wypadku śmierci nienaturalnej. (Rozp. Min. spr. wewn. 28 stycznia 1860. Dz. u. p. 26).

Oglądacz zwłok.

Dla każdej miejscowości ustanowionym być ma oglądacz zwłok i tegoż zastępca, których reprezentacya gminna w porozumieniu z obszarem dworskim mianuje a c. k. Starostwo po uznaniu ich na podstawie zbadania przez c. k. lekarza powiat. za uzdolnionych zatwierdza i zaprzysięga.

Gminom położonym w 4 kilometrowym promieniu wolno ustanowić wspólnego oglądacza i zastępcę.

W miejscowościach, gdzie osiedlonym jest lekarz dyplomowany jakoteż w miejscowościach nie więcej jak 4 kilometry od siedziby jego oddalonych ustanowionym być ma oglądaczem lekarz. Każde ciało zmarłego bez wyjątku ma być oglądane i może tylko na podstawie karty pośmiertelnej przez oglądacza wydanej w terminie na teże oznaczonym, być pogrzebanem. W tym celu obowiązani są pozostali krewni, domownicy a w braku tych zarządca lub właściciel domu przy rzetelnem podaniu czasu zgonu donieść o tem bezzwłocznie oglądaczowi, który najdalej w 24 godzinach a w wypadkach nagłej śmierci natychmiast do oglądania przystąpi. W ostatnim przypadku tudzież w razie znalezienia ciała nieżywego lub przyjęcia na świat dziecka nieżywego należy zarazem zrobić doniesienie przełożonemu miejscowemu. Ciała zmarłych w szpitalu publicznym ogląda lekarz szpitalny i wydaje kartki. Wynagrodzenie oglądacza zależy od umowy z dotyczącą gminą, która porozumie się w tym względzie z obszarem dworskim. Od stron nie wolno oglądaczowi pobierać żadnej opłaty. Gmina w porozumieniu z obszarem dworskim może za potwierdzeniem c. k. Starostwa ustanowić za oględziny mierne opłaty, od których jednak ubodzy są wolni. Opłaty uiszczane być winny wprost do kasy gminnej i stanowią fundusz na wynagrodzenie oglądacza. Przekroczenia tego rozporządzenia, o ile nie podpadają ustawie karnej, karane będą według cesarskiego rozporząd. z 20 kwietnia 1854 r. (Dz. u. p. Nr. 96). (Rozp. Nam. z 8 listop. 1879 r. L. 55225 dz. u. i r. kr. Nr. 86).

Kto przy oględzinach umarłego niedokładnie podaje czas śmierci i przyczyną się staje, iż zmarły wcześniej zostaje pochowanym lub do otwarcia zwłok oddanym jak tego przepisy do zapobieżenia pochowania i otwierania ciał pozornie tylko zmarłych pozwalają, karany będzie aresztem od 1—6 miesięcy. §. 375 u. k.

Oglądacz zwierząt

przeznaczonych do ładowania i wyładowywania na stacyach kolejowych pobiera jako takse po 10 ct. od sztuki t. j. ćwiartek, połówek lub całych, powyżej 50 sztuk po 5 ct. i zwrot kosztów za fiakra, jeżeli odległość wynosi do 2 kilometrów (Dz. u. kr. 1880 r. Nr. 31).

Ogrzewająca siła

różnego rodzaju paliwa. Gatunki drzewa według wartości ciepłotajnej ułożone są w następującym szeregu: buk, grab, wiaź, brzoza, dąb, modrzew, dąb młody, jodła, sosna, jesion, świerk, olcha, topola, osika, wierzba. Jeżeli 1 klgr. drzewa daje 3600 kaloryi, to 1 klgr. antracytu daje 8110 kal., węgla kam. 6000 do 7000 kal., koksu 7430 kal., torfu 3000 kal.

Ogrzewania prędkie.

Nasypać do wody niegaszonego wapna; przy równych częściach wody i wapna ogrzewa się woda do 300°.

Do oziębienia używa się: mieszaniny 5 cz. amoniaku i 5 cz. saletry i 19 cz. wody (obniża temp. do 12°), albo jedną część soli i 3 cz. lodu tłuczonego (do 26°). Azotan amon 1 cz. na 1 cz. wody dystylowanej w pęcherzu bardzo długo utrzymuje temperaturę 15° C., jest to więc dobry środek ochładzający zamiast lodu.

Podejrzenie o popełnionej zbrodni

Lekarze, chirurdzy, aptekarze, akuszerki i oglądacze zwłok zmarłych, gdy im się nadarzy przypadek, z którego wezmą podejrzenie o zbrodni lub wykroczeniu, obowiązani są o tem donieść władzy. Zaniechanie doniesienia takiego karaniem będzie jako przestępstwo karą pieniężną od 10—100 złr. (§. 359 u. k.).

Pojedynek.

Według ustawy karnej §. 158 i 195 tylko pojedynkujący i sekundanci są pociągani do odpowiedzialności, lekarz zaś wezwany do ewentualnej pomocy nie podlega żadnym przykrościom.

Pokostowanie ścian.

Ściana do żądanej wysokości pokrywa się najprzód karukiem rozgotowanym w wodzie, a potem zwykłą pokostową farbą. Z dwukrotnem pomalowaniem jeden metr kwadratowy kosztuje około 24 ct.

Policya zdrowia

na mocy ustaw gminnych przydzielona do własnego zakresu działania gmin, obejmuje: a) Przestrzeganie przepisów sanitarnopolicyjnych względem gościńców, dróg i placów, miejsc zgromadzeń publ., pomieszczeń, kanałów, wód płynących i stojących, wody do picia, żywności i naczyń oraz publ. zakładów do kąpania; b) piecza o łatwość znalezienia pomocy w chorobie i położu, tudzież o środki ratunku w nagłym niebezpieczeństwie życia; c) utrzymanie w naoczności podrzutków, głucho-niemych, obłąkanych i kretyńców; d) utrzymanie i zakładanie trupiarni i cmentarzy; e) czuwanie nad targowicami bydła i transportami bydła; f) urządzenie i utrzymanie składów padliny. W poruczonem zakresie działania: a) wykonanie środków policyjno-sanitarnych w celu zapobieżenia chorobom zaraźliwym i ich rozszerzaniu się; b) przestrzeganie rozporządzeń i przepisów sani-

tarno - policyjnych względem pogrzebów; c) oględziny zwłok; d) współudział przy wszystkich czynnościach komisyjnych i oględzinach w obrębie gminy; e) bezpośredni nadzór nad składami padlin i oprawcami; f) peryodyczne składanie władzy politycznej sprawozdań zdrowotnych. (Ust. z 30 kwietnia 1870 r. dz. u. p. Nr. 68).

Prawność porodu.

§. 156. u. c. W przypadku wcześniejszego porodzenia prawne domniemywanie, że dziecko jest nieprawego rodu, wtenczas dopiero ma miejsce, jeżeli mąż nie wiedząc przed ślubem o ciążności, najpóźniej we trzy miesiące po otrzymaniu wiadomości o urodzeniu dziecięcia sądownie zaprzeczy ojcostwu.

§. 157. Prawność wcześniejszego lub późniejszego urodzenia dziecka, sądownie w przeciągu trzech miesięcy przez męża zaprzeczona, może być dowiedziona jedynie przez biegłych w sztuce którzy zbadawszy dokładnie stan dziecięcia i matki, przyczynę tego niezwyčajnego wypadku jasno wskazać powinni.

Powietrza

Ilość w miejscach zamkniętych do oddechania potrzebna jest różną i tak wynosi w szpitalach na jednego chorego $36 \cdot 1 \text{ m}^3$, w kasarniach, więzieniach i warsztatach $15\text{--}20 \text{ m}^3$, w szkołach $4\text{--}5 \text{ m}^3$.

Wentylacya przytem powinna być tak urządzona, aby doprowadzała świeżego powietrza na głowę i godzinę w szpitalach $60\text{--}100 \text{ m}^3$, w szkołach dla dzieci $12\text{--}15 \text{ m}^3$, dla dorosłych $25\text{--}30 \text{ m}^3$, w kasarniach $40\text{--}50 \text{ m}^3$, w warsztatach $60\text{--}100 \text{ m}^3$.

Oświetlenie naturalne mieszkania urządzone ma być tak, aby 1 m^2 okna przypadał na 5 m^2 podłogi.

Pożywienie

ze względu na zawartość białka można zestawić w następującym szeregu: ser krowi 43% , mięso zająca $23 \cdot 3$, groch $22 \cdot 5$, mięso wołowe $21 \cdot 3$, krowie $20 \cdot 5$, chuda wieprzowina $19 \cdot 9$, kurczę $19 \cdot 7$, cielęce $18 \cdot 8$, jaja kurze $14 \cdot 1$, chleb pszeniczny $13 \cdot 6$, kukurydza 10 , ryż $7 \cdot 5$, mleko $4 \cdot 1$, szpinak $3 \cdot 1$, ziemniaki 2 , marchew $1 \cdot 5$, sałata $1 \cdot 4$, poziomki $1 \cdot 1$, jabłka $0 \cdot 4\%$.

Napoje wysokiego zawierają wysokości: cognac $69 \cdot 5\%$, shery 20 , madeira 18 , wino szampańskie 10 , bordeaux 9 , reńskie 8 , ale i porter 7 , owocowe 5 , piwa bawarskie $3 \cdot 7$, pilzneńskie $3 \cdot 4\%$.

Prostytucyjne lokale.

W tychże nie wolno wydawać żadnych napojów ani potraw z domieszką środków odurzających lub podniecających. (Rozp. Nam. z 3 lutego 1892 L. 14426).

Przewóz zwłok

i wydawanie im paszportów zależy od władz administracyjnych I instancyi t. j. od starostw i magistratów miast. Pozwolenia na rzeczony przewóz zwłok w ogólności, w szczególności zaś na wydobycie ich z grobu odmówić należy, gdy lekarz urzędowy w tej mierze zapytany oświadczy, że zachodzi obawa, aby to

nie wpłynęło szkodliwie na stan zdrowia publicznego, lub na zdrowie osób przy tem zatrudnionych. Jeżeli przewiezienie albo wydobywanie z grobu i przewiezienie zwłok może być dozwolone, będzie wydany w tej mierze na podstawie opinii lekarza urzędowego przepis policyjno-zdrowotny do wypadku zastosowany, a osoba z ramienia służby zdrowia wyznaczona dopilnuje osób, aby postąpiono według przepisu.

Pod względem trumien i zamknięcia w nich zwłok obowiązują następujące przepisy: a) jeżeli przewóz ma trwać dłużej jak tydzień, zwłoki mają być zabalsamowane; b) jeżeli przewóz ma trwać 24 godzin i dłużej, zwłoki należy umieścić w podwójnej trumnie i przymocować je pasami; trumny mogą być z drzewa twardego wylane smołą, albo też metalowe. Trumna wewnętrzna powinna być zalana smołą lub zalutowana. Nadto trumnę drewnianą wstawia się w skrzynkę drewnianą. Jeżeli zwłoki mają być przewiezione nie więcej jak na milę, zwyczajna trumna może być uznana za dostateczną. Jeżeli przewozi się dalej jak na milę, należy użyć trumny podwójnej jak pod b).

W czasie wydobywania zwłok z grobu, wykonawca służby zdrowia ma przestrzegać: aby czynność odbywała się w czasie chłodnym i nie było obcych osób, a y obecni odwracali się od wyziewów wychodzących z grobu, aby powietrze oczyszczono, a wydobyte z grobu zwłoki niezwłocznie włożono do trumny. Na wozie jadącym ze zwłokami oprócz woźnicy ma być przewodnik, obowiązani są oni trzymać się ściśle drogi w paszporcie oznaczonej i nie wolno nigdzie stanąć bez potrzeby. O przybyciu zwłok na cmentarz miejsca przeznaczenia, należy uprzedzić gminę, aby wysłała osobę dla odebrania paszportu zwłok, tudzież świadectwa lekarskiego i dla sprawdzenia, czy opakowanie i trumny odpowiadają przepisom. Trumien w taki sposób przewiezionych nie wolno otwierać. (Rozp. Min. spr. wewn. d. 3 maja 1874).

Przewiezienie zwłok zmarłych w przebiegu ospy, szkarlatyny, tyfusu plamistego, dyfteryi, cholery, żółtej febry i dżumy do innego im przynależnego miejsca grzebania może być dozwolone dopiero po upływie roku od dnia śmierci z zastrzeżeniem wszelkich innych ostrożności. Przewóz zwłok osób zmarłych na inne choroby może być dozwolonym o ile lekarz urzędowy nie dostrzeże jakiej przeszkody, pod warunkiem, że zwłoki zawinięte będą w prześcieradło zmazane w 5% kw. karbolowym a wszelkie inne wymogi co do transportu będą zachowane. (Rozp. c. k. Nam. z 3 lutego 1891. L. 82102).

Przyczyna niezdolności do robienia testamentu.

§. 666 u. c. Wola spadkodawcy jest nieważną, jeżeli dowiedzionem będzie, iż nastąpiła w stanie szaleństwa. Niewątpliwosc tego twierdzenia przez biegłych w sztuce lub przez urzędowe osoby, które o stanie umysłu spadkodawcy dokładnie się przekonały lub przez inne pewne dowody wykazaną być powinna.

Rachunki

za czynności komisyjne z polecenia c. k. Władzy politycznej sporządzane być mają na całym arkuszu przy dołączeniu allegatów

a mianowicie: polecenia do wykonania czynności i potwierdzenia Zwierzch. gminnej z wykonania czynności (lekarze wolnoprakt.) a wreszcie w razie eksponowania do miejsca zarazy także wezwania przeznaczającego na ekspozyturę jakoteż odwołującego z tejże. Jeżeli polecenie załączonem zostało do rachunku z poprzedniego miesiąca, należy to w uwadze uwidocznnić. Rachunek kosztów z całego miesiąca podróży ma być przedłożonym c. k. Starostwu najpóźniej do 19 dni po upływie miesiąca, w którym czynność komisyjna miała miejsce. Rachunek ma być podpisany pełnem imieniem, nazwiskiem i godnością rachunkodawcy. Rachunki mają być sporządzane z osobna według rodzaju czynności, przyczem na czynność tego samego rodzaju choćby w kilku miejscowościach przedsiębraną, sporządzić należy jeden rachunek. Rachunki za szczepienie ospy ochronnej mają być przedkładane na przepisanych formularzach. W rachunkach tych mają lekarze wymienić w rubryce pierwszej tylko te dni, w których w podanej miejscowości szczepienie w rzeczywistości wykonali; za szczepienie wolno im jednak zaliczyć większe dyety i to odpowiednio do odległości i ilości zaszczipionych. Rachunek za szczepienie wraz z wykazami szczepienia ma być najpóźniej do końca października przedłożonym. (Rozp. Nam. z 26 maja 1880 do L. 56778 ex 1879).

Rady szpitalne.

(Rozp. Min. spr. wewn. 12 grudnia 1869 Nr. 9). §. 1. Z wyjątkiem Lwowa i Krakowa w każdym mieście gdzie istnieje szpital publicz. i powszech. ma być ustanowiona rada szpitalna dla tegoż szpitala. §. 3. Do zakresu jej działania należy bezpośrednie czuwanie, opieka i kontrola nad całym zarządem powierzonych ich pieczy szpitali tak pod względem lekarskim jak i ekonomicznym a mianowicie: a) czuwać nad wykonaniem przepisów i rozporządzeń władz wyższych, nad przyjmowaniem i należytem pielęgowaniem chorych zapomocą rewizyj szpitala przez członków swoich; b) czuwać nad całością funduszków i inwentarzy, nad ściąganiem czynszów, procentów od kapitałów, legatów i t. d. i ażeby takowe były użyte na cel przeznaczony; c) Przestrzegać porządku domowego w zakładzie; d) przyjmować udział przy licytacyach o dostawę rozmaitych potrzeb; e) czynić wnioski co do taks pielęgowania chorych, rozpoznawać budżety i rachunki szpitalne przed odesłaniem do Wydziału kr.; f) czynić przedstawienia w sprawie obsady posad, mianowania, ukarania lub oddalenia lekarzy i urzędników szpitalnych, urlopowania i zastępstwo, udzielenia remuneracyi i zapomogi; g) przedstawiać o wprowadzenie potrzebnych reform i ulepszeń w administracyi i rządzeniu szpitali; h) składać roczne sprawozdania ze swych czynności Wydz. kr. §. 6. Rada szpitalna składa się z prezesa Rady pow. lub jego zastępcy jako delegata Wydz. kr., z 2 delegatów Rady pow. i z 2 obywateli miejskich wybranych przez Radę gminną. Przewodniczy prezes Rady pow. lub jego zastępca. Urzędowanie delegatów trwa rok jeden. Posiedzenia odbywają się raz na miesiąc. Do ważności uchwał potrzebną jest obecność przynajmniej trzech członków.

Rany.

Wezwany do dania opinii lekarz powinien dobrze się zastanowić nad tem, czy to jest lekkie czy ciężkie uszkodzenie ciała, bo w przypadku gdy rana jest przyczyną niezdolności pełnienia obowiązku, przynajmniej przez dni 20, sprawca podlega karze od 6 mies. do 5 lat, wtedy gdy przy lekkich uszkodzeniach ciała, areszt nie wynosi dłużej nad 1—6 mies.

Różne fizyologiczne dane.

Średni wzrost człowieka 160—170 cm., a waga 78 kil. Ilość krwi = $\frac{1}{14}$ — $\frac{1}{15}$ wagi ciała = $5\frac{1}{2}$ kil. Każda komora serca może pomieścić 180 grm. krwi.

Robota serca przy każdym skurczu = 0·6 k. m. Przy 72 uderzeniach tętna cała krew przechodzi 3 razy przez płuca.

Ciepło krwi = 38—39° C.; w rectum i pod pachą 37° C.

Ciepła traci człowiek dziennie 2,500.000 kaloryi (t. j. takich jednostek na 1° C.), a zatem tyle ciepła, że możnaby nim 2500 litr. wody ogrzać na 1° C. Skórą wydziela 800—1200 grm., oddechem 3·30 grm., a 60 grm. wydzielinami.

Dzienna utrata azotu = 18·7 grm., węgla 250 grm. Stratę tę może wynagrodzić $\frac{1}{2}$ kil. mięsa z $\frac{1}{4}$ k. tłuszczu i $\frac{1}{2}$ k. cukru, albo 375 grm. mięsa i 1 kl. chleba. Dziennie człowiek przyjmuje i wydziela pokarmów i napojów 3 litry, spalanie tego daje 2464 kaloryj.

Człowiek dorosły za każdym oddechem wciąga 0·5 litr. powietrza, a więc w godzinę przy 15 oddechach na minutę 450 litr. = 700 grm., a w tem 40 l. = 60 grm. tlenu. W ciągu doby przez płuca przechodzi 9 tys. litr. pow. = 11—12 kil. Zawartość płuc = 3700 kub. cent.

Ucisk atmosfery na ciało ludzkie = 15000 kil. Wątroba waży 2·25 kil., śledziona 0·25 kil., nerka 0·16 kil., serce 0·35 kil., płuca 2·0 kil.

Samobójstwo.

Lekarz wezwany zbadać powinien, czy wedle rodzaju śmierci, ilości, położenia lub ważności ran, można przypuścić, że zmarły sam sobie śmierć zadał.

Spędzenie płodu.

Kobieta przedsiębiorca jakkolwiekbyż czynność, sprawującą spędzenie jej płodu, lub sprowadzającą poródzenie w ten sposób, iż dziecko nieżywe na świat przychodzi, staje się winną zbrodni. Akuszerka, która jest sprawczynią spędzenia płodu, lub uczestniczką tego czynu, tudzież ta, która zaniedba zawiadomić władzę o powziętem podejrzeniu, że zbrodnię popełniono, podpada karze. Jeżeli spędzenie płodu usiłowanem było, lecz skutecznionem nie zostało, wówczas ma być orzeczoną kara więzienia od $\frac{1}{2}$ —1 roku; skutecznione zaś spędzenie ulega karze ciężkiego więzienia od 1—5 lat. Zbrodni tej staje się winnym i ten, kto w jakimkolwiekbyż zamiarze wbrew wiedzy i woli matki spędzenie płodu jej sprawia lub sprawić usiłuje. Zbrodniarz

takowy ulegnie karze ciężkiego więzienia od 1—5 lat; a jeżeli przez tę zbrodnię i matka narażoną została na niebezpieczeństwo śmierci lub uszczerbek w zdrowiu poniosła od 5—10 lat (ust. k. §. 144—148).

Poród przedwczesny sztuczny, w celu ratowania życia matki i dziecka, nie naraża lekarza na odpowiedzialność, lecz nie należy operacyi tej przedsiębrać inaczej, jak po odbytej naradzie lekarskiej.

Świadeństwo.

W celu zapobieżenia nadużyciom, jakich się dopuszczają strony prywatne ze świadectwami lekarskimi, w świadectwach tych dokładnie ma być podany cel, w jakim takowe są wydane (Okólnik Nam. 14 marca 1877).

Fałszywe świadectwo. §. 199 u. k. Jeżeli zeznanie złożone w postępowaniu drobnostkowym przez stronę jest fałszywe, uważać się ma jako fałszywe świadectwo przed sądem złożone. Nie stosuje się to jednak do oznajmień lub zeznań strony, które poprzedziły zeznanie jej jako świadka.

§. 307 u. k. Kto staje się winnym dania pomocy pod względem występku lub przekroczenia, ten przekroczenie popełnia i ukaranym ma być aresztem od 8—30 dni.

§. 198 u. k. Oszustwo staje się zbrodnią, albo z istoty czynu, albo z ilości wyrządzonej szkody.

Według §. 3 ustawy o włóczęgostwie nie wolno pod karą 10—100 złr. wydawać świadectw o nieszczęściu lub ubóstwie, któreby mogły być użyte do żebrania.

Świadectwa lekarskie potwierdzające szczepienie ospy i niezdolność uczęszczania czasowego do szkoły wskutek choroby są wolne od stempla. Inne mają być stemplowane marką na 50 cnt.

Szczepienie ospy.

Począwszy od 1890 roku odbywa się szczepienie co roku krowianką rodzimą. Lekarze, którym poruczone ma być szczepienie w pojedynczych gminach wyznacza c. k. Nam. w porozumieniu z Wydz. kr. na wniosek c. k. Starostwa względnie lekarza pow. Lekarze miejscy winni w miejscach zamieszkania wykonać szczepienie co roku bezpłatnie. Wykazy dzieci do szczepienia i rewakynacyi przeznaczone udzieli c. k. Starostwo lekarzowi szczepiacemu w kwietniu. Szczepienie winien każdy lekarz w swym okręgu rozpocząć najpóźniej w maju. Najdalej na 14 dni przed rozpoczęciem szczepienia winien lekarz szczepiący przedłożyć c. k. Starostwu plan szczepienia w swoim okręgu w dwóch egzemplarzach. Lekarz szczp. może dokonać szczepienia w dowolnym porządku, winien atoli w terminie szczepienia na czas zawiadomić Zwierzch. gminną przesyłając jej wykazy szczepić i rewakynować się mających dzieci. Wykazy te zwróci mu naczelnik gminy przy szczepieniu. Podczas szczepienia obecnym być winien naczelnik gminy a względnie jego zastępca lub przełożony obszaru dworskiego a w miarę możliwości duszpasterz. Szczepienie odbywać należy w szkole lub w kancelaryi gminnej a w braku tychże w innem miejscu stosownem (nie w karczmie). Celem dokonania

szczeplenia udać się winien lekarz do każdej miejscowości, wyznaczając w miejscowościach rozległych po kilka miejsc zbórnych. Do przysiółków nie więcej jak 1 klm. odległych nie wolno lekarzowi dojeżdżać, dzieci tamże szczepić się mające, mają być dostawione do gminy, do której przysiółk należy. W 8 dni po szczepieniu przedsięwziąć należy rewizję i przy tej sposobności zaszcześcić powtórnie te dzieci, u których szczepienie się nie przyjęło. Przy sposobności szczepienia przeprowadza się rewakcynację 10 letnich dzieci. Jeżeli rodzice z dziećmi do szczepienia przeznaczonemi nie stawiają się na wezwanie lekarza lub okazują niechęć do szczepienia, należy zrobić o tem doniesienie do c. k. Starostwa, które zarządzi na koszt winnych lub gminy dalsze szczepienie. Lekarz przyjmujący na siebie czynności szczepienia, winien ją uskutecznić we wszystkich miejscowościach najdalej do końca października, inaczej traci prawo do wynagrodzenia. Po skończonem szczepieniu najpóźniej do końca paździer. przedłoży lekarz przepisane wykazy (Nr. I. II. III. i V.) c. k. Starostwu wraz z wykazami parafialnemi. Rachunek ma być pod zagrożeniem nieuwzględnienia najpóźniej do 15 listopada c. k. Starostwu przłożonym. Za szczepienie, rewizję i rewakcynację pobierać będzie lekarz prócz kilometrowego także przynależne mu dyety. Należytość dyety jednodniowej przyznaną będzie lekarzowi, jeżeli:

nie podejmując żadnej podróży zaszczepli, zrewakcynuje lub zrewiduje 60 osób,				
podejmując podróż w odległości	1— 4 klm.	40 osób		
»	»	»	4·1— 8	» 30 »
»	»	»	8·1—12	» 25 »
»	»	»	12·1—15	» 20 »
»	»	»	15·1—19	» 15 »
»	»	»	19·1—25	» 10 »
»	»	»	25·1—35	» 5 »

lub wreszcie odbędzie podróż 35·1—40 kilometrów.

W miarę większej ilości szczepionych i zrewidowanych w jednym dniu przysługują lekarzowi prawo zarachowania należytości za 2, 3 lub więcej dni, jednak zawsze tylko w stosunku do odдалenia i ilości szczepionych lub zrewidowanych dzieci. Szczepiającemu lekarzowi wolno tylko dwukrotną bytność w każdej miejscowości zarachować a nadto czterokrotny powrót do miejsca zamieszkania. W razie oznaczenia kilku miejsc zbórnych w jednej miejscowości, dostarcza gmina podwód bezpłatnie. Zdający rachunek ma w rachunku zarachować podróże od miejscowości do miejscowości w tym porządku w jakim są w poleceniu c. k. Starostwa podane. W odpowiedniej rubryce podać należy dzień rzeczywiście dokonanego szczepienia bez względu na to, czy dni te następują po sobie w chronologicznym porządku. Do rachunku należy załączyć: a) polecenie c. k. Starostwa; b) potwierdzenie Zwierzch. gminnej z dokonanej czynności. Partykularze, które tych wymogów nie posiadają, będą zwrócone do przerobienia lub do podania powodów, dla których tymże zadość nie uczyniono. Jeżeli rachunko-zdawca wzbrania się rachunku przerobić, przerobi go c. k. lekarz pow. według obowiązującej normy. (Rozp. c. k. Nam. z 12 kwietnia 1890. F. 18936 w poroz. z Wydz. kr.).

Szczepienie z konieczności

wykonać należy w razie pojawienia się epidemii ospy w jakiej miejscowości bez względu na porę roku. Szczepić należy od domu do domu. Z powodu rocznego szczepienia ospy odpada potrzeba szczepienia z konieczności w miejscowościach przyległych do nawiedzonej ospą a szczepić jedynie w nawiedzonej. W rachunku za szczepienie z konieczności, liczyć należy jedynie dyety stosownie do ilości szczepionych, rewakcyonowanych lub rewidowanych osób, a to wedle normy w rozp. Nam. z 12 kwiet. 1890. L. 18936 przyjętej, za 60 osób jeden dzień dyety, bez uwzględnienia odległości, bo szczepienie wykonuje się przy sposobności. Milowe należy liczyć za dojazd w rachunku, za leczenie chorych na ospę za powrót zaś w rachunku, za szczepienie ze stosowną uwagą w obu rachunkach. Rachunek w inny sposób sporządzony ma być zwrócony do przerobienia (Rozp. Nam. z 30 marca 1892. L. 17529). Szczepienie z konieczności wykonuje się krowianką z państw. zakładu krowiankowego w Wiedniu (VIII. Laudengasse 12) Rozp. Min. spr. wewn. z 4 sierpnia 1893 L. 19213.

Szkolnej higieny zasady.

Izba szkolna nie powinna być głębszą jak 7 m., wysokość 4—4·5 m., oświetloną od strony lewej. Na każdego ucznia przypadać ma najmniej jeden metr² powierzchni, dla starszych 1·5², a przestrzeni 4—5 m³, dla starszych zaś 6—7 m³. Do odświeżania powietrza należy urządzić odpowiedni wentylator. Ciepłota w izbie szkolnej nie powinna przekraczać 20° C. ale też nie o wiele być niższą. Wychodki od budynku nie powinny być zbyt oddalone, deska stołcowa od 0·3—0·45 m. wysoka, najmniej 0·8 m. szeroka. Ławki w izbie szkolnej winny być rozmaitej wysokości. Wysokość siedzenia = $\frac{2}{7}$ części wysokości ciała, szerokość siedzenia = $\frac{1}{3}$ wysokości ciała. Ławki mają być opatrzone w oparcia. Brzegi płyty górnej i siedzenia powinny w kierunku poziomym schodzić się ze sobą i raczej nakrywać się jak być od siebie oddalone. Czas nauki dziennej nie powinien przekraczać 4 po sobie następujących godzin. Po każdych 2 godzinach nauki powinna być pół godziny pauza, podczas której salę przewietrzyć należy.

Szpitalne powszechne.

Lekarze ordynujący w tych zakładach pod osobistą odpowiedzialnością nie powinni przyjmować chorych dotkniętych chorobami nieuleczalnemi, czy też przewłocznymi niewymagającymi koniecznie opieki szpitalnej, z wyjątkiem jeżeli choroba ich przedstawia przemijające szczególnego starania lekarskiego wymagające pogorszenie lub objawy bezpośrednio życiu zagrażające. (Rozp. Min. 1869. L. 1713 i okólnik Wydz. kr. z paźdz. 1882. L. 49261).

Sztuczne wody mineralne.

Wyrób ich jest pozwolony pod zarządem egzaminowanego chemika lub farmaceuty (Dz. kr. W. k. 11 listop. 1847. L. 37279).

Tajemnica lekarska.

Lekarz, chirurg lub akuszerka, którzy tajemnicę osoby ich pieczę powierzającej się, komu innemu oprócz władzy właściwej urzędownie o tem pytającej się wyjawiają, za pierwszym razem przestępstwa tego zabronieniem praktykowania na 3 miesiące, za drugim razem na rok, a za trzecim razem na zawsze ukaranymi będą §. 398 u. k.

Jeżeli aptekarz poznane z przyniesionych doń recept tajemnicę chorego innym osobom wydaje, podlega karze 5—50 złr. a jeżeli jest to subjekt to aresztowi od 1—14 dni. §. 499 u. k.

Termometry

przyjmuje c. k. Urząd cłowy w Wiedniu do ścisłego urzędowego badania, na mocy którego wydane zostanie świadectwo stwierdzające ścisłość przyrządu. (Reskr. Min. handlu z grudnia 1891. dz. u. p. Nr. 169).

Ubezpieczenie robotników od wypadków.

Wszyscy robotnicy i urzędnicy przemysłowi zatrudnieni: 1) przy fabrykach i hutach; 2) przy przedsiębiorstwach kolejowych; 3) trudniący się przemysłowym przewozem ludzi na wodach śródziemnych i rzekach; 4) wybieraniem namulisk; 5) czyszczeniem ulic i budynków; 6) robotnicy składów towarów i drzewa; 7) zajęci przy przedsiębiorstwach teatralnych; 8) przy strażach pożarnych; 9) czyszczeniem kanałów; 10) kominiarze; 11) kamieniarze, studniarze i konstruktorowie żelaza; 12) robotnicy przy przedsiębiorstwach rolnych, używających motorów, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Przedsiębiorca przemysłowy ma donieść o rozpoczęciu przemysłu wprost zakładowi ubezpieczenia. (Ust. z 28 grudnia 1887 dz. u. p. Nr. 1 ex 1838 i ust. z 20 lipca 1894 dz. u. p. Nr. 169).

Umowa.

§. 879. U. C. Umowa jest nieważną, jeżeli jest zawarta pomiędzy lekarzem a chorym za podjęcie się leczenia.

Wody ilość

potrzebna dla jednego człowieka dziennie obliczona najskromniej wynosi 55 litrów, a mianowicie $3\frac{1}{2}$ l. do gotowania, $1\frac{1}{2}$ l. do picia, $22\frac{1}{2}$ l. do mycia ciała, 14 do mycia sprzętów, $13\frac{1}{2}$ do prania. W większych miastach obliczając zużycie wody do celów przemysłowych, gaszenia pożarów, skrapiania ulic, mycia stajen i powozów i t. p. oblicza się na dzień i głowę 150—200 litrów.

Żeby się przekonać, czy woda nie zawiera organicznych pierwiastków, należy wziąć czystą butelkę (do 2 szklanek), nalać $\frac{3}{4}$ wodą badaną, w której rozpuścić łyżeczkę cukru czystego i postawić w ciepłym miejscu na dwa dni. Jeżeli okażą się w wodzie płatki, lub stanie się biaława, wody takiej używać nie należy, w przeciwnym razie jest dobrą do picia.

Wścieklizna.

Przez psy wściekłe pokąsane osoby, udając się do szpitala św. Łazarza w Krakowie celem poddania się szczepieniu ochronnemu Pasteura, zaopatrzone być winny urzędowym poświadczeniem stwierdzającym wściekliznę u psa inaczej do szpitala nie będą przyjęte. Również mają osoby te wykazać się certyfikatem urzędowym, w którym wyszczególnione być mają bliższe dane co do zwierzęcia, rany i czasu uszkodzenia. Do zakładu istniejącego przy szpitalu Rudolfa w Wiedniu, przyjęte będą także osoby z poza Wiednia, lecz osoby te, których rany leczenia szpitalnego nie wymagają, postarać się muszą o mieszkanie i żywienie poza obrębem zakładu. Osoby do tego zakładu się udające mają być zaopatrzone w certyfikat w języku niemieckim. (Rozp. Min. z 16 listop. 1894. L. 68196).

Wybory.

Prawo wybierania mają doktorowie fakultetu, którzy otrzymali stopień akademicki na jednym z uniwersytetów austriackich, magistrowie chirurgii i farmacyi. Dz. ust. kr. 1866. Nr. 19.

Lekarze ordynujący w szpitalach powszechnych są obieralni do Rady gminnej, chociaż mają powierzone sobie pełnienie służby zdrowia w gminie. Nam. 9 grudnia 1881. L. 1980.

Wywabianie plam.

Plamy farb olejnych wywabiają się najlepiej chloroformem, którym się napaja szmatka. Plamy z oliwy, pokostu, laku, żywicy, tłuszczu, mazi i smoły — benzyną. Parafinowe i stearynowe — mocnym spirytusem. Cukru, kłajstru, krochmalu — czystą wodą z mydłem weneckiem. Owocowe, wina czerw. na płótnie — roztworem kw. siarkowego, lub ciepłą wodą chlorową. Takie same plamy z materyj wełnianych i bawełnianych — wodą z mydlinami lub salmiakiem. Alizarynowe — wodą chlorową, Znaki rdzy lub atramentu galasowego — sokiem cytrynowym z solą kuchenną lub rozcieńczonym kw. solnym.

Zakładów humanitarno-leczniczych (szpitali prywatnych) zdrojowych i kąpielowych

urządzenie może nastąpić tylko na podstawie uzyskanej koncesyi. Koncesyę udzielić można tylko takim zakładom, w których leczenie odbywa się według uznanych zasad nauki. W koncesyi należy położyć nacisk na to, że właściciel nie może w ogłoszeniach powoływać się na żadne metody lecznicze zostające w sprzeczności z naukowemi sposobami leczenia (metoda Kueippa) jak niemniej, że zaniechać ma wszelkich szalbierznych zachwalań. (Rozp. Min. z 2 marca 1892 do L. 14498. Rozp. Nam. z 18 marca 1892. L. 19794).

Zaniedbanie chorego.

§. 358. U. K. Gdy lekarz przyjąwszy na kurację chorego przekonany zostanie, iż go z uszczerbkiem zdrowia zaniedbał,

skazanym będzie na karę pieniężną od 50—200 złr. Jeżeli ztąd powstało ciężkie nadwreżenie, albo nawet śmierć chorego, będzie karany od 1 miesiąca do 1 roku.

Przeciw lekarzom, którzy wyjąwszy udowodnionego niepodobieństwa wzbraniają się udzielić pomocy choremu, władze administracyjne mają zarządzić śledztwo. Dekr. kanc. Nadw. 24 stycznia 1882. L. 5981.

Zasady dla układania taks leczenia

w szpitalach powsz. (Rozp. Min. spr. wewn. 10 kwietnia 1857).
1. Taksa leczenia ma pokrywać wydatki dla chorych i być równą dla wszystkich, według jednej klasy pielęgowanych, z wyjątkiem jeżeli istnieje szczególny układ. 2. Taksy wyrachowane przez zakłady mają moc obowiązującą tylko po zatwierdzeniu ich przez Nzmieśtnictwo. 3. Dla obrachowania taksy przyjmują się na uwagę wydatki na żywność, leki, bieliznę, odzież, pościel, oświetlenie, opał, pranie, sprzęty, utrzymanie obsługi, urządzenie sal, utrzymanie czystości, koszta zarządu, potrzeby kancelaryjne, utrzymanie budynków szpitalnych i połączone z tychże utrzymaniem lub najmem ciężary. 4. Wymierzanie taksy winno się opierać na zamknięciach rachunkowych z trzech lat przedostatnich, wyłączając lata szczególnej drożyzny lub niekorzystnych stosunków. Sumę wydatków z trzech lat ostatnich należy rozdzielić na sumę dni leczenia w tychże latach, a otrzymany iloraz daje normalną taksę. 5. Dla szpitali nowozakładających się taksa leczenia wymierza się według porównania z innymi szpitalami na podobnych warunkach istniejącymi. 6. Na nieprzewidziane wydatki ma być utworzony fundusz rezerwowy z wszelkich nadwyżek i oszczędności, a także z małego dodatku do taksy leczenia. Fundusz ten jednak nie powinien przekraczać wysokości odpowiedniej rozmiarowi szpitala.

Przy wyrachowaniu wydatków na bieliznę należy uwzględnić następującą normę: W szpitalu na średnią ilość chorych być powinno: a) 4 zmiany koszul, czepków, ręczników, prześcieradeł na sienniki, nawleczek i chustek do nosa; koszule mają służyć 9 mies. każda, chustki do nosa $1\frac{1}{2}$ roku a reszta po roku; b) 3 zmiany prześcieradeł do podszywania koców (na $1\frac{1}{4}$ roku), kalessonów i spodnie (na rok), wsypek i sienników (na 2 lata); c) 2 zmiany koców (na pięć lat), pantofli ($\frac{3}{4}$ roku) drelichowe szlafroki i flanelowe kaftaniki (po trzy lata). Rozp. Wydz. kr. L. 5888. 1883.

Zawinienie lekarza przez nieumiejętność.

§. 356. U. K. Lekarz, który przy leczeniu chorego takie popełnił błędy, z których nieumiejętność jego stała się widoczną, winnym jest przekroczenia, jeżeli z tego powodu nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a jeżeli śmierć nastąpiła staje się winnym występku i dlatego wykonywania sztuki lekarskiej dopóty sobie wzbronionem mieć będzie, dopóki w nowym egzaminie nie dowie, iż nabył brakujących mu wiadomości.

Poszukiwanie prątków:

a) gruźliczych w plwocinach.

Z plwociny podejrzanej o obecność prątków gruźliczych należy wziąć części najwięcej zbite, żółtawe, jakby grudki sera i grudkę taką dokładnie rozetrzyć na szkiełku nakrywkowym; następnie przykryć drugim szkiełkiem tak, ażeby część do badania użyta cienko na obu szkiełkach była rozłożona. Skoro po kilku minutach roztarta część plwociny zaschnie, przeciąga się szkiełko (zwrócone stroną, na której jest plwocina roztarta, do góry) kilkakrotnie szybko przez płomień lampki.

Po oziębieniu nalewa się na szkiełko zapomocą zakraplacza kilka kropli barwika, składającego się:

Fuchsin. 1'0
Spiritus 10'0
Acid. carbol. 5'0
Aq. destillat. 100'0.

Barwik ten zostawia się na szkiełku około 10 minut, następnie opłukawszy je dokładnie wodą, wysusza się bibułą. W ten sposób zabarwiła się roztarta masa plwociny na czerwono. Teraz rozchodzi się o odbarwienie wszystkich zabarwionych części prócz prątków, które mając wielkie powinowactwo do barwika, pozostaną zabarwione i w tym celu dajemy na preparat kilka kropli następującego roztworu (Gabbeta):

Methylenblau 2'0
Acid. sulfuric. 25'0
Aq. destillat. 100'0.

Po 5 minutach spłukujemy ten barwik i wysuszamy bibułą preparat. Jeżeli barwienie się udało, preparat wygląda blade niebiesko; jeżeli zaś utrzymują się miejsca czerwone należy jeszcze raz ostatnie postępowanie (t. j. odbarwianie) powtórzyć, dopóki preparat nie przyjmie barwy niebieskawej. Wysuszony preparat umieszcza się na szkiełku poddawszy kroplę balsamu i ogląda się imersją.

Prątki powinny się zabarwić czerwono, komórki i inne bakterye niebiesko.

Postępowanie to jest stosunkowo bardzo proste, a daje wyniki pewne.

Czasami należy dla dokładności badanie kilkakrotnie powtórzyć. Jeśli zaś nawet kilkakrotne badanie daje wynik ujemny, a chcemy postępować z wszelką dokładnością, w takim razie


należy płwocinę przed badaniem przygotować; w tym celu mieszamy w szklanym naczyniu łyżkę płwociny z 3 łyżkami wody i 15 kroplami ługu potasowego i na słabym ogniu ogrzewamy przez dwie godziny. Skutkiem tego części śluzowe sputum rozpuszczają się, na dnie zaś zostaje osad, z którego części możemy wziąć do badania; w ten sposób wykazać możemy nieraż prątki w przypadkach, których badaniem zwykłym nie wykazaliśmy.

b) błoniczych (Löfflera).

Wykazanie prątków błoniczych z całą dokładnością i pewnością może nastąpić tylko przez hodowlę t. j. zaszczerpienie z błon lub wydzieliny miejsc chorych na odpowiednio przygotowanej pożywce, w odpowiedniej ciepłocie (termostacie).

W braku jednak tychże posłużyć się można badaniem mikroskopowym preparatów uskuteczniionych wprost błon, które po zdjęciu szczypcykami, roztarciu na szkiełku i zabarwieniu fuchsyną lub nasyconym wodnym roztworem metylenblau, oglądamy. Dodatni wynik tego badania, to jest stwierdzenie w preparacie prątków błoniczych, uprawnia nas do rozpoznania błonicy na pewne, wynik zaś ujemny nie wyklucza błonicy. Dlatego też jeśli w preparacie w ten sposób sporządzonym prątków błoniczych nie stwierdzono, a rozchodzi się o dokładne rozpoznanie kliniczno-bakteryologiczne, należy błonę z gardła wyjętą przesłać do badania bakteriologicznego. W tym celu należy zdjąć wyznaczonemi szczypcykami część błony i przesłać ją w próbówce sterylizowanej, w braku tejże w 1% roztwornie kw. borowego do zakładu bakteriologicznego.

Prątki błonice (Löfflera) są to pałeczki długości tej samej co prątki gruźlicze, jednak znacznie grubsze, odznaczają się wielką obfitością form, zwykle łaseczki są na obu końcach zaokrąglone, czasem zgrubiałe na obu końcach (jak ciążki), lub na jednym (jak maczuga).



O stosowaniu surowicy (serum) przeciwbłoniczej.

Surowica przeciwbłonicza (Diphtherie Heilserum) jest to surowica krwi zwierząt (koni), które przez kilkakrotne szczepienie jadem, otrzymanym z hodowli prątków błoniczych (Löfflera) bulionowej, w wysokim stopniu przeciw tej chorobie uodpornione zostały. Obok surowicy, uzyskanej przez Behringa (Höchst a. M. Meister Lucius et Brünnig), która pierwsza pojawiła się w handlu, mamy jeszcze surowicę francuską Roux'a, wyrabianą w Paryżu, surowicę, wyrabianą w Krakowie w zakładzie hyg. prof. Bujwida, surowicę Aronsohna (»Schering« Berlin), Paltauf'a w Wiedniu wiele innych. Surowice te różnią się od siebie nie tyle sposobem przygotowania, ile zewnętrzną stroną (sposobem opakowania itd.), wreszcie dodatkiem płynu konserwacyjnego (Behring dodaje kw. karb., Roux kamfory, prof. Bujwid chloformu itd.). Pierwotnie przygotowywał Behring trzy numery surowicy o różnej sile immunizacyjnej, obecnie przeważnie wytwarza Nr. II, równający się w przybliżeniu ilością jednostek antitoxycznych surowicom innym tak, że obecnie sposób zastosowania surowicy jest dla wszystkich mniej więcej przetworów, w handlu się znajdujących, jeden i ten sam.

Ponieważ surowica wytworzona zostaje przez uodpornienie zwierząt jadem prątków błoniczych, swoistych dla błonicy pierwotnej, samoistnej, dlatego też może ona przynieść skutek tylko w błonicy pierwotnej i tylko w tych przypadkach (nie zaś n. p. w dyfteryi szkarlatynowej) stosować ją należy.

Surowica ta nie zabija prątków w gardle się rozwijających, a działanie jej polega na przeciwdziałaniu jadom (toxynom), które prątki wytwarzają i zatruwają ustrój. Licznymi doświadczeniami stwierdzonem zostało, że po zastosowaniu surowicy błony już wytworzone łatwiej się oddzielają, nowe nie tak łatwo się wytwarzają; wynika stąd, że surowicę stosować należy wczas, t. j. zaraz po stwierdzeniu błonicy, a nie należy czekać na rozwój jej silniejszy.

Jeśli więc stwierdzimy pierwotną samoistną błonicę lub gdy spotkamy obok błonicy dławiec (laryngitis crouposa diphtherica), który tylko za błonicę krtani i tchawicy uważać musimy, należy przystąpić do zastosowania surowicy.

W tym celu najlepiej użyć strzykawki objętości 10 sz. ctm. z tłokiem asbestowym (według Strauss Colina), którą należy każdorazowo przed użyciem wysterylizować najlepiej przez wygotowanie, następnie miejsce, w którym mamy zastrzyknąć (a naj-

lepiej do tego nadaje się skóra klatki piersiowej w okolicy podżebrzy, lub, w razie objawów krupu i duszności, zewnętrzna strona ud), dokładnie obmyć wodą z mydłem, eterem, alkoholem i 3% kw. karbol., wreszcie igłę strzykawki naciągniętej surowicą wbić dość głęboko przez skórę w tkankę podskórną i powoli tłok strzykawki uciskając, cofać trochę igłę ku tyłowi tak długo, aż cała ilość (10 sz. cm.) surowicy przedostanie się pod skórę. — Wstrzykiwać należy zawsze całą ilość, wynoszącą zwykle około 10 ctm. sz.; mniejsze dawki nie odnoszą żadnego skutku, w ciężkich przypadkach należy nawet rozpocząć od dawki podwójnej. Przez kilka godzin po wstrzyknięciu trwa uczucie bólu, a raczej napięcia, później jednak, t. j. w 24 godzin, zwykle nie ma żadnych innych śladów prócz znaku w miejscu ukłęcia.

Przebieg błonicy po zastrzyknięciu jest zwykle znacznie krótszy, mimo to jednak rzadko kiedy obejdzie się bez wstrzyknięcia drugiej lub nieraz i kilku następnych dawek.

W dalszem postępowaniu kierujemy się wogóle przebiegiem błonicy, jeśli naloty, gorączka i t. d. ustąpiły, wtedy dawki nie ponawiamy, jeśli zaś naloty przed wstrzyknięciem stwierdzone utrzymują się jeszcze w 24—48 godzin po zastrzyknięciu, lub nawet się rozszerzają, jeśli dostrzeżemy objawy zajęcia krupowego krtani, jeśli podnosi się gorączka, wtedy należałoby dawkę powtarzać, aż dopóki te objawy lub powikłania nie ustąpią.

Jeśli, jak się to często przytrafia, spotykamy się z przypadkiem, w którym obok błonicy gardła spotykamy już rozwinięty dławiec (krup) z przypadkami stenozy, wtedy zastrzyknięcie surowicy stenozy nie usunie i wtedy wykonanie tracheotomii względnie intubacji musi iść ręką w rękę z leczeniem swoistem, przyczynowem zapomocą surowicy. Ale i w tych przypadkach zauważyć można przy tem podwójnem leczeniu znacznie pomyślniejszy przebieg dławca, nie tak częsty krup zstępujący, wydzielinę więcej płynną i t. d.

Z ubocznych objawów i następstw zastrzyknięcia najczęściej przytrafia się swędząca wysypka, podobna do pokrzywki (urticaria) lub drobna wysypka, podobna do płonicy, której towarzyszy podniesienie ciepłoty; zauważono także pojawianie się bólów stawach i obrzęki tychże, przypadki te jednak szybko bez żadnych następstw ustępowały.



UWAGI SĄDOWO-LEKARSKIE

przez

Doc. Dra Leona Wachholza.

I. O świadectwach lekarskich i sądowo-lekarskich.

Świadectwa lekarskie wydawane przez lekarza na żądanie osób prywatnych a nie władz muszą być opatrzone marką stemplową na 50 kr. Świadectwa stwierdzające przebyta ospę lub dokonane szczepienie ochronne tejsze, również i świadectwa mające na celu usprawiedliwienie ucznia z jego nieobecności w szkole i t. d. lub z jego opóźnienia się w złożeniu egzaminu w należytych czasie, są wolne od stempla (rozp. z d. 29 Czerwca 1834, L. gub. 39736 i obwieszczenie gub. z d. 4 Grudnia 1894 L. 75852). Opinie lekarskie co do istnienia choroby umysłowej w celu umieszczenia umysłowo chorego w jednym z krajowych zakładów dla obłąkanych mogą wydawać c. k. lekarze powiatowi, i fizycy miast Lwowa i Krakowa (wolne od stempla).

Świadectwa sądowo-lekarskie czyli tak zwane visa et reperta, podlegają jako wydawane osobom prywatnym ostępowaniu marką na 50 kr. Forma ich odpowiada w zupełności formie protokołu oględzin sądowo-lekarskich.

Świadectwo sądowo-lekarskie składa się pod względem formy z trzech części: pierwsza powinna zawierać imię, nazwisko, wiek, stan, miejsce zamieszkania osoby badanej, wreszcie i miejsce, w którym lekarz ją bada. Po tym wstępie następują krótkie a możliwie dokładne wywiady co do istoty zająścia objawów podmiotowych i co do osób, które w niem czynny udział brały. Jeżeli osoba poddana badaniu jest nieletnią, nieprzytomną lub dotkniętą chorobą umysłową, zasięga się wywiadów od osób ją otaczających.

Drugą część stanowi wynik przedmiotowego badania i część tę dzieli się wedle potrzeby na oznaczone liczbami porządkowymi ustępy a to w tym celu, aby się można na nie w orzeczeniu powołać. W części tej zwraca się uwagę na wszelkie szczegóły, podobnie jak w zwykłym badaniu klinicznym, zacytnając od uwag co do ogólnego odżywienia i budowy ciała osoby badanej, co do stanu ciepłoty ciała, tętna, wrodzonych lub nabytych zboczeń, wreszcie co do chwilowych stanów z resztą fizyologicznych, jak np. ciąży. Po tych uwagach następuje opis ściśle przedmiotowy, zrozumiały nawet dla nielekarza, tyczący się znalezionych śladów uszkodzeń cielesnych lub innych za-

burzeń. W opisie tym należy unikać zwrotów, stanowiących raczej rozpoznanie jak wierny opis stanu, w jakim badany się znajdował w chwili badania. Jeżeli badanie przedmiotowe nie stwierdza zmian anatomicznych dla objawów podmiotowo uczuwanych przez badanego, należy w miejscu odpowiedniem podnieść ujemny wynik badania przedmiotowego.

Trzecią i ostatnią częścią świadectwa jest orzeczenie, które stanowi właściwe rozpoznanie zaburzeń w protokole opisanych, jakoteż i ocenę ich sądowo-lekarską. Ocenę sądowo-lekarską uszkodzeń ciała podaje się na podstawie znajomości odnośnych paragrafów obecnego kod. karn., stosując się nadto do wymagań §. 132 ust. o postępowaniu karnem z dnia 23 Maja 1873: „znawcy mają wyrzec w szczególności, które ze znalezionych obrażeń ciała lub nadwreżeń zdrowia same przez się lub w związku z innemi bezwzględnie albo ze względu na szczególne okoliczności przypadku, należy uważać za lekkie, ciężkie lub dla życia niebezpieczne; jakie skutki uszkodzenia takie zwykle za sobą pociągają i jakie w obecnym przypadku szczególnym złąd nastąpiły, tudzież jakimi środkami albo narządami i w jaki sposób takowe zadane były“.

Świadectwo sądowo-lekarskie.

Stempel
50 ct.

Mar yanna R. lat 23, żona rolnika z Mogiły podaje, iż ją dnia 4 lutego b. r. pobili Jan B. i Magdalena jego żona z Mogiły kołkiem z płotu i ręką.

Badanie z dnia dzisiejszego wykazuje:

1) Kobieta wzrostu średniego, prawidłowej budowy, dość dobrze odżywiona, nieokazująca ogólnych objawów chorobowych.

2) Na twarzy, a mianowicie na grzbiecie nosa dwa otarcia przyskórka, wielkości ziarna grochu, podobne zdrapania na górnej wardze po stronie prawej i tuż koło kąta ust prawego, wreszcie smugowate zdrapanie w środku brody, wszystkie strupkiem zaschłej krwi pokryte.

3) Na grzbiecie, wzdłuż całej prawej łopatki, smugowate zasinienie.

4) Kończyna górna prawa przedstawia się o kilka ctm. krótszą w porównaniu z kończyną górną lewą; badana, kończyną tą nie może poruszać, a przy usiłowaniu ruchów biernych ramieniem, doznaje mocnego bólu. Ramię prawe okazuje się prawie w połowie swej długości obrzmiałe, zasiniałe i kątowato zgięte. Kąt zgięcia tego zwrócony jest rozwartością swą ku wewnątrz. Przy badaniu dotykiem czuje się w miejscu tego zgięcia trzeszczenie i wyraźną nieprawidłową ruchomość kości; badanie to sprawia dotkliwy ból.

5) Zresztą na ciele nie ma innych śladów obrażeń.

ORZECZENIE.

1) Obrażenie opisane pod l. 4 przedstawia się jako złamanie kości ramieniowej prawej prawie w połowie trzonu tejże i stanowi uszkodzenie ciała ciężkie połączone z upośledzeniem zdrowia i niezdolnością do pracy, które trwają zwykle w tych przypadkach przez więcej, jak dni 30. Okoliczności tej czy upośledzenie zdrowia potrwa w danym przypadku przez więcej jak 30 dni, na razie stanowczo rozstrzygnąć nie można. Rozstrzygnięcie to będzie możliwem dopiero po zdjęciu opatrunku ustalającego.

2) Obrażenia opisane pod l. 2 i 3 stanowią uszkodzenia ciała lekkie tak razem wzięte, jak i każde z osobna, połączone z upośledzeniem zdrowia około 7 dni trwającym.

3) Złamanie kości ramieniowej mogło być następstwem uderzenia ciałem twardem, tępem, ciężkiem, z siłą użytą np. kołem z płotu, otarcia przyskórka na twarzy były zadane najpodobniej do prawdy paznokciami palców.

Co niniejszem, jako zgodne z zasadami nauki lekarskiej, do wiadomości c. k. Sądu podaję.

Dr X. X.

Kraków, d. . . 1894.

UWAGI

o oględzinach i seceyi sądowej zwłok.

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1855 r. Nr 26 dz. u. p. zamieszcza dokładne przepisy, odnoszące się do sposobu wykonania oględzin i seceyi sądowej zwłok (*vide* Zbiór ustaw Dra Olpińskiego lub Podręcznik ustawy o postępowaniu karnem w przekładzie prof. Dra Bojarskiego). Oględzin i seceyi zwłok dokonują dwaj lekarze zazwyczaj w ten sposób, iż jeden (młodszy) wykonywa seceyę, drugi (starszy) dyktuje protokół seceyi.

Gdy jednak jasno jest zrozumiałem, iż obducent lepiej ze stanu znalezionego w zwłokach zdaje sobie sprawę, przeto właściwszem i więcej wskazanem jest, aby obducent sam protokół w miarę postępu seceyi dyktował. Protokół seceyi winien być wiernym odbiciem znalezionego stanu rzeczy i winien zawierać opis wszelkich czynności obducenta skierowanych ku możliwie ścisłemu wywiązaniu się z zadania swego. Protokół powinien być podanym w formie zwiezłej, łatwo nawet dla nielekarza zrozumiałej; stanowić ma on wierny opis stanu narządów zwłok, nigdy zaś gotowego rozpoznania. Protokół składa się z 3 części: 1) z nagłówka; 2) z opisu oględzin zewnętrznych; 3) z opisu oględzin wewnętrznych.

W przypadkach, w których zależy na stwierdzeniu tożsamości osoby, należy oględziny zewnętrzne ciała poprzedzić dokładnym a systematycznym opisem odzieży, w jaką zwłoki są przybrane.

W przybliżeniu można podać następujący szemat dla sekcji:

A. Oględziny zewnętrzne.

- 1) Zwłoki — płeć (mężczyzny... kobiety... dziecka płci...), wiek, długość ciała, odżywienie, budowa (zboczenia w budowie).
- 2) Zmiany pośmiertne tj. stężenie pośmiertne utrzymuje się (lub nie) w kończynach górnych... dolnych; plamy pośmiertne... ich umiejscowienie... rozległość... barwa nacięciem stwierdzone.
- 3) Zabarwienie powłok (zielone ze zgnilizny i t. d.
- 4) W razie stwierdzenia tożsamości zwłok; włosy głowy, ich długość, zabarwienie, inne właściwości, włosy zarostu twarzy... kolor tęczyówek, opis twarzy i reszty ciała, szczególnych znaków i t. d. np. na rękach jako dowód zatrudnienia.
- 5) Zachowanie się żrenic (rozszerzone, zwężone, równomiernie lub nie), spojówki (obecność wynaczyniówek), naturalne otwory jam ciała jak otwory uszne, nosowe, ust, pochwy i odbytu zawierają ciała obce... treść... lub nie. Z otworów... czuć woń podobną do... W jamie ust... język... zęby. Części płciowe zewnętrzne...
- 6) Opis uszkodzeń, blizn znalezionych (każde uszkodzenie z osobna oznaczać literami porządkowymi a, b, c, i t. d.
- 7) Oprócz wyżej opisanych śladów uszkodzenia, innych się nie spotyka.

B. Oględziny wewnętrzne.

(Sekcję należy wykonać w zwykłym anatomicznym porządku nawet w przypadkach otruc bez względu na odmienny dla tych ostatnich istniejący regulamin pruski z dnia 6 stycznia 1875 r.).

8) Powłoki czaszkowe po stronie wewnętrznej okazują... sklepienie czaszki budowa jego... grubość kości... okazuje... Opona twarda... zatoki żyłne zawierają krew płynną... skrzepy... Opony miękkie okazują... pod niemi... zwoje mózgowe powierzchowne... Mózg zbitości... na rozkroju... zawartość krwi... komórki... ich rozmiary... zawartość... wyściółka ich... sploty naczyń... zwoje mózgu podstawowe... mózdzek... most Varola... rdzeń przedłużony... naczynia na podstawie mózgu... ich grubość... zawartość... Podstawa czaszki po oddzieleniu opony twardej okazuje... Jamy bębnekowe (w razie potrzeby) zawierają...

9) Krtani i tchawica z przodu in situ rozcięta zawiera... Mięśnie szyi... naczynia wielkie szyi... gruczoł tarczowy... język i gardło... nagłośnia... wewnątrz krtani... przelyk... gardziel w górnej części...

10) Mięśnie klatki piersiowej i brzucha... rozwinięte... stan przepony do brzegu żebra... po stronie prawej... po lewej...

11) Ułożenie trzew w klatce piersiowej... worki opłucnowe zawierają... płuca wolne lub przyrośnięte... opłucne płuca... pod niemi... miąższ płuc powietrzny lub nie (w których częściach)... na rozkroju płuco prawe... wejście rozkroju... zbi-

tość... dobywa się treść... za uciskiem... z przeciętych oskrzeli... płuco lewe... opłucne ścienne... gruczoły przyoskrzelowe...

12) Worek osierdziowy wolny... zrosnięty z... zawiera... serce wielkości... pod osierdziem... przebieg naczyń wieńcowych (prosty lub kręty)... komórka lewa zawiera... zastawka dwudzielna... przedsionek lewy... komórka i przedsionek prawy... zastawka trójdzielna... mięsień sercowy... jego grubość... zabarwienie... zbitość... nitki ścięgniste... mięśnie brodawkowe na rozkroju... tętnica płucna zawiera... zastawki jej... aorta wstępująca zawiera... błona wewnętrzna jej ściany... zastawki jej... ujścia tętnic wieńcowych i ich drożność... Tchawica i oskrzela z tyłu rozcięta w całą długość okazują... dolna część gardziela.

13) Ułożenie trzew w jamie brzusznej... zawartość worka otrzewnowego... otrzewna jelit... ścięgna... krezka... gruczoły krezkowe...

14) Wątroba wielkości... brzegi jej... powierzchnia... jej torebka... na rozkroju... powierzchnia... zbitość... zawartość krwi... zabarwienie... woreczek żółciowy... żółć... przewód żółciowy...

15) Śledziona, wielkość... torebka... na rozkroju... zbitość... ilość krwi...

16) Nerka prawa i lewa wielkość... torebki... powierzchnia nerek po złuszczeniu torebek... na rozkroju rysunek... istota korowa... piramidy... miedniczki... moczowody...

17) Pęcherz moczowy zawiera... barwa moczu... (w przypadkach otruc wypuścić czystym cewnikiem mocz do czystego naczynia i przechować)... błona śluzowa pęcherza...

18) Pęcherzyki nasienne... jajniki... macica... jej wielkość... część pochwowa... ujście zewnętrzne... jama macicy... zawiera... pochwa...

19) Żołądek (w przypadkach otrucia podwiązać u wpustu odźwiernika i otworzyć nad naczyniem) ściana zewnętrzna żołądka... zawartość żołądka... jakość treści... oddziaływanie błona śluzowa...

20) Dwunastnica zawiera... jej błona śluzowa...

21) Trzustka... na rozkroju...

22) Jelita cienkie... treść... błona śluzowa...

23) Jelita grube...

24) Gruczoły zaotrzewnowe...

25) Aorta zstępująca piersiowa... brzuszna...

26) Po wyjęciu trzew okazują żebra... kręgosłup... kości miednicy... kości kończyn...

27) (W razie potrzeby). Po otwarciu jamy kręgowej okazuje rdzeń... jego opony...

W przypadkach sekcyi zwłok noworodków należy w oględzinach zewnętrznych podać cechy odnoszące się do okoliczności, czy dziecie jest donoszonym lub nie, a więc: 1) długość zwłok (długość podana w ctm. podzielona przez 5 wyraża miesiąc życia płodowego w drugiej połowie ciąży). 2) Obwód główki, wymiary prosty, skośny, wielki, dwuciemienny, dwuskroniowy, szerokość barków, miednicy, rozmiary ciemienia.

3) stan włosów główki, obecność meszku, stan chrząstek nosa i małżowin usznych, stan paznokci, jąder w mosznach (u płodów męskich) rozwój podściółki tłuszczowej, stan jąder kostnych w dolnej nasadzie kości udowej i ich rozmiar.

Nadto podaje się cechy, po których poznaje się noworodka: a więc: 1) obecność krwi i mazidła skórniego na powłokach ciała; 2) stan pepowiny, oba jej końce; 3) stan przedgłowia; 4) obecność smółki. Celem wyjaśnienia pytania z § 130 p. k. czy dziecko urodziło się żywym należy wykonać tak zwane próby życia tj. próbę hydrostatyczną Schreiera i żołądkowo-jelitową Breslaua.

Po ukończeniu sekcji mają obducenti wydać swe zdanie, czyli orzeczenie w sposób ogólny bez motywów tj. bez powoływania się na odnośne ustępy protokołu. O ile protokół przedstawiał tylko opis przedmiotowego stanu sekcją stwierdzonego, o tyle orzeczenie stanowi podmiotowy sąd obducentów. Orzeczenie powinno być odpowiedzią na pytania objęte § 129 ustawy o postępowaniu karnem, a więc powinno mieścić objaśnienie co w danym przypadku było bezpośrednią (najbliższą) przyczyną śmierci i co tę wywołało. Jeśli przyczyny śmierci sekcya nie dostarczyła, należy to wyraźnie w orzeczeniu zaznaczyć. W przypadkach powikłanych, w których nadto zachodzi potrzeba dokonania dalszych badań np. spektralnych, mikroskopowych itd. lub w których ważnemi dla orzeczenia stają się pewne wskazówki przez śledztwo uzyskać się mające, ograniczyć się należy tylko do tymczasowego orzeczenia, zastrzegając sobie na później orzeczenie dokładne i motywowane.

W każdym orzeczeniu należy po wyjaśnieniu przyczyny śmierci podać, czy ona była wynikiem własnej winy denata, przypadku czy też czynnego udziału drugiej osoby. Jeśli na zwłokach stwierdza się obrażenia, wówczas należy podać w orzeczeniu, czy one powstały za życia, czy też po śmierci, następnie czy je zadała druga osoba; w tym ostatnim razie, należy odpowiedzieć na pytania (§ 129 p. k.): „1) czy czyn ten drugiej osoby spowodził śmierć a) już ze swej natury w ogólności, b) lub z powodu właściwego osobistego usposobienia lub z powodu szczególnego stanu obrażonego; c) z powodu okoliczności przypadkowych, wśród których czyn spełniono; albo d) z powodu przyczyn, które przypadkiem nastąpiły, lub czynem samym były wywołane lub z niego wynikły i czy e) śmierci można było zapobiedz wczesną i stosowną pomocą lekarską.“

UWAGA. Na mocy § 359 u. k. jest obowiązany każdy lekarz uczynić doniesienie w przypadkach zbrodni, a doniesienie to podobnie jak i załączone doń świadectwa lekarskie, mające stanowić dowód i poparcie doniesienia, są wolne od stempla.





WAŻNIEJSZE
KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZAKŁADY
zdrojowo-kąpielowe, wodolecznicze,
galaktoterapeutyczne, klimatyczne, kąpieliska morskie
i sanatoria,
skreślił
Dr M. ZIELENIEWSKI *).

Skrócenia: C. = Celsius.

L. Zkł. = lekarz zakładu.

L. L. = lekarze.

m. = miasto.

mtr. = metrów,

n. p. m. = nad powierzchnią morza.

p. kąp. = pora kąpielowa.

p. pob. = pora pobytu.

p. zdroj. = pora zdrojowa

St. k. ż. = stacya kolei żelaznej.

St. klim. = stacya klimatyczna.

wtrz. = wewnątrznie.

wś. = wieś.

Zkł. = zakład.

ztrz. = zewnątrznie.

Abbazia przy morzu Adryatyckiem, obecnie bardzo modna St. klim. zimowa, dopiero w r. 1884 otwarta, imponuje drożyną tu panującą. P. pob. od 15 IX do 15 V.

Abano górno-Włochy, 10 kilm. od Padwy, 31 mtr. n. p. m. cieplice słono jodobromowe, 36—82° C.

*) Wyciąg z przygotowanego do druku manuskryptu p. t.: „*Słownik balneologiczny*. — Opis zakładów zdrojowo-kąpielowych, hydropatycznych, galaktoterapeutycznych, klimatycznych, kąpielisk morskich i szczególnych sanatoryów pod względem: topograficznym, historycznym, klimatologicznym, balneoterapeutycznym, statystycznym i ekonomiczno-finansowym.”

Abas-Tuman Ces. rossyjsk. Kaukaz, 1270 m. n. p. m. ma dwie grupy źródeł mineralnych, z tych 1sza obejmuje 3 źródła cieplicy obojętnej do 48° C. zwane Bogatyrskimi; 2ga zaś grupa ma 3 źródła od 33° do 40° C. słabo solankowe, zwane przeciw zolzowemi. Urządzenia zdrojowe są należyte, pomieszkania dla gości dostateczne. P. zdr. od 1. VI do 1. IX.

Aequi Piemont, 140 mtr. n. p. m. liczne słono-siarczane cieplicze źródła, 36—75° C.

Adelheitsquelle = Heilbrunnen Bawarya, 774 mtr. n. p. m. szczawa jodobromowa słona, przeważnie do rozsyłki używana.

Ahrweiler w Prusach nadreńsk. źródło znane pod imieniem Apollinarisbrunnen, szczawa alkaliczna, w ogromnej ilości (rocznie do 10 milionów flaszek) na handel rozsyłana przez Towarzystwo akcyjne angielskie, dzierzawiące źródło wspomniane. Jestto dowód, co może angielska reklama, skoro blachy ten towar tak wielki ma odbył.

Aix-les-Bains Sabaudya, 258 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 45° C. znakomite balneotechniczne urządzenia kąpielne przez cały rok do użycia.

Ajaccio Korsyka, St. klim. zimowa. p. pob. od 15 X do 30. IV.

Akwizgran = Aachen Prusy nadreńskie, 176 mtr. n. p. m. silne cieplice alkaliczno-murjatyeczno-siarczane, 45—50° C. urządzenia kąpielne i na porę zimową.

Algier północ Afryka St. klim. zimowa. p. pob. od 1 XI do 15. IV.

Altupka w Cesar. rossyjskiem na południowym pobrzeżu półwyspu krymskiego, własność ziemska ks. Woroncowa, osłonięta grzbiem Jajły, dosięgającej swym wierzchołkiem wysokości 1189 metr. n. p. m., jest wybornem kąpieliskiem morskiem a najprzedniejszą stacją klimatyczną rossyjską. Powietrze na ogół bardzo łagodne, jednostajnie ciepłe, iście pomorskie. Brak uprzyjemnień wynagradzają przechadzki po wspaniałym parku i tarasowo rozłożonych uroczych ogrodach właściciela.

Amelié-les-Bains Francya, 222 mtr. n. p. m. słynne z balneotechnicznych swych urządzeń i z łagodnego klimatu cieplice siarczane, od 44° do 61° C. Właściwa pora kąp. od 1. V do 30. X, jednak i przez cały rok do użycia.

Arco Tyrol południowy, 93 mtr. n. p. m. St. klim. zimowa, niedawno zaprowadzona. p. pob. od 1. IX do 16. V.

Arnstadt Turyngia, 300 mtr. n. p. m. silna jodobromowa solanka, 24 $\frac{0}{10}$ soli kuchen. zawierająca.

Aussee Styrya (Salzkammergut), 650 mtr. n. p. m. silna solanka, 24.5 $\frac{0}{10}$ soli kuchennej zawierająca.

Baden pod Wiedniem czyli Baden rakuski, 218 mtr. n. p. m. cieplice ziemno siarczane, 26—33. 7° C. Dr. Kümmerling.

Baden w Szwajcaryi czyli Baden helwecki, 382 mtr. n. p. m. cieplice ziemno słono siarczane, 48° C., urządzenia lazienkowe i na porę zimową. P. kąp. od 15. V do 30. IX.

Baden-Baden czyli Cieplice szwabskie w W. Ks. Baden-skiem, 200 mtr. n. p. m. cieplice solankowe, 65—68° C. najwy-

tworniejsze i najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, klimat bardzo łagodny, licznie używane jako St. klim. przejściowa.

Badenweiler w W. ks. Badeńskim, 422 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 26-4° C. klimat łagodny. P. kąp. od 1. V do 1. X.

Bagnères de Luchon Francya (depart. gór. Garonny), 628 mtr. n. p. m. pyrenejskie cieplice siarczane, 16-68° C. znakomite balneotechniczne urządzenia. P. kąp. od 15. V do 15. X.

Bardów = Bartfeld półn. Węgry, na pograniczu Galicyi, 310 mtr. n. p. m. szczawy wapniowo żelaziste, urządzenia balneotechniczne przestarzałe, w ostatnim czasie nieco ulepszone. Pobyt tani.

Baréges Francya (Pyreneje), 1232 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 18-8° do 45-3° C.

Bath w Anglii, z Londynu w 3 g. do dojeżdżenia, 3 źródła cieplicy wapniowej, od 42° do 47° C., bardzo licznie odwiedzanej (rocznie około 30.000 osób). Pobyt drogi.

Berka w W. Ks. Sasko-Weimarskiem, nieznaczne źródła siarczane i żelaziste, przeważnie klimatyczne uzdrowisko 268 m. n. p. m. było ulubionem miejscem pobytu Goethego.

Bex Szwajcarya, 435 mtr. n. p. m. silna solanka 17%, tudzież St. klim. przejściowa.

Biaritz Francya, w zatoce Biskajskiej, kąpielisko morskie. Pobyt bardzo drogi. Pora kąpiel. od 1 V do 15 X.

Bilin w Czechach 2 mile od Cieplic czeskich (Teplitz-Schönan), silne szczawy alkaliczne, do dwóch milionów flaszek corocznie rozsyłane, pozyskały obecnie urządzony zakład zdrojowo-kąpielowy.

Birsztany Litwa (gubern. wileńska), solanka od 0 do 3%, urządzenia zdrojowe i kąpielne w ostatnim czasie znakomicie ulepszone zabiegami i starannością Dra Rodeckiego L. zakład. Ceny wszystkiego bardzo umiarkowane. Pora kąpielowa od 15. V do 15. IX.

Bocklet Bawarya, 1 godz. od Kissingen, 195 mtr. n. p. m. silne żelaziste źródło, bardzo zamożne w kwas węglowy. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Bojarka wieś, pół godz. od Kijowa, zakład kumysowy, własność i kierownictwo Dra Sadowskiego, całorocznie otwarty od 1. V do 1. IX.

Bordighera półn. Włochy, nad zatoką genueńską, St. klim. zimowa, rywalizująca ze sąsiednią San-Remo. P. pob. od 15. X do 15. V.

Bormio = Worms górne Włochy, 1375 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 35-40° C. pora kąpielowa tylko w Lipcu i Sierpniu.

Botzen połud. Tyrol, 260 mtr. n. p. m. St. klim. przejściowa (niekorzystna) i winogradowe uzdrowisko.

Borszek w Siedmiogrodzie, 881 m. n. p. m., liczne tujejsze szczawy alkaliczno-żelaziste, w kwas węglowy wolny bardzo zamożne, używane są tu w rodzimej ich ciepłocie 9° do 11° C. mającej, w zbiornikach zwanych „Lobogo“ (znaczy pieniawa).

Urządzenia kąpielne prymitywne, klimat ostry. P. zdr. kąpielna tylko od 1. VII do 31. VIII. Rozsyłka wód bardzo wielka.

Borżum Ces. rosyjsk. Kaukaz, 798 mtr. n. p. m. źródła alkaliczno muryatyczne ciepłe, 20—30° C. składem chemicznym zbliżone do Vichy.

Buda = Ofen = Budapest stolica Węgier, cieplice słabo siarczane, 45—63° C. wspaniałe urządzenie t. z. Kaiserbad, Raitzenbad i Lucasbad, pensjonat w zimowym sezonie od osoby od 2 Złr. dziennie. W pobliżu Budy są bardzo liczne źródła wód gorzkich, z nich najważniejsze: Hunyady, Attila, Deak, Rakoczy i Wiktorya.

Bourbonne les Bains Francya (Wogezy), 272 mtr. n. p. m. silne słone cieplice, 58—66° C. poczytane i nazywane francuskim Wiesbadenem. P. zdr. od 15. V do 15. X.

Bournemont w Anglii uzdrowisko klimatyczne nadmorskie, wielkim obszarem lasów otoczone, ciepłota powietrza zimą przeciętnie + 8.2° C. Korzystne stosunki klimatyczne spowodowały zaprowadzenie od r. 1838 zakładu klimatyczno-leczniczego, posiadającego obecnie 700 wspaniałych will dla chorych.

Buśko Król. polskie (powiat Stopnicki), Zakład zdrojowo-kąpielowy wód solno alkaliczno siarczanych, LL. Dr. Dymnicki Grabowski, Majkowski, L. zakł. i Szpitala, Dr Radziszewski tudzież Dr. Sulimierski. P. kap. od 15. V do 30. IX.

Burtscheid Prusy nadreńskie, niedaleko Akwizgranu, cieplice z akwizgrańskimi identyczne, 59—74° C. P. zdr. od 1. V do 30. IX; jednak łazienki i wśród zimy otwarte.

Buzias m. w Kr. Węgierskiem 132 mtr. n. p. m., bardzo silne szczawy alkaliczno iście żelaziste, własność fundacyjna pod zarządem Ministerstwa wyznań i oświaty. Kąpiele ogrzewane systemem Czernicky'ego. Rozsyłka wód do Anglii i do Ameryki bardzo wielka. Pobyt tani. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Cairo = Kair (Afryka Egipt), St. klim. zimowa, powietrze gorące, uniarkowano wilgotne, rano i wieczór gwałtowny spadek ciepłoty. P. pob. od 15. X do 15. IV.

Cannes Francya, tuż nad morzem Śródziemnem, St. klim. zimowa znakomita. P. pob. w celu klimatyczn. od 1. X do 1. V, dla kąpiel morskich od 1. V do 30. X.

Canstatt Król. wirtemberskie, 218 mtr. n. p. m. solanka od 0 do 2‰, 8—20° C. niemiecka St. klim. przejściowa. P. zdr. od 1. V do 15. X.

Carlsbad = Karlsbad Czechy, 386 mtr. n. p. m. naj-słynniejsze cieplice alkaliczno glauberskie, 42—73° C. Dr. Dr. Polacy: Hassewicz, Hochberger, Kretowicz, Stiche, Toepfer, Tugendhat i Ziembicki.

Catania Sycylia, najcieplejsza miejscowość w Europie, St. klim. zimowa. P. pob. od 15. XI do 30. III.

Charlottenbrunn Śląsk pruski, 440 mtr. n. p. m. szczawa ziemno żelazista. P. zdr. od 15. V do 1. X.

Churwalden Szwajcarya, 1217 mtr. n. p. m. St. klim. górską bardzo licznie uczęszczana. P. pob. od 1. V do 30. IX.

Cauterets Francya, (depart. wysokich Pyrenejów), 992 mtr. n. p. m. słynne cieplice siarczane, 15—55° C. P. kap. od 15. VI do 15. IX.

Ciechocinek Król. polskie, st. k. ż. warszawsko-bydgoskiej, solanka $0\frac{1}{2}$ — $4\frac{0}{10}$, Dr. Dr. Arnstein, Asterblum, Certowicz, Cięgliński, Górski, Lewenstein, Lubowski, L. Zkl. Pajewski, Rupert, Stockmann, Tannenbaum i Wolberg.

Cieplíce czeskie = Teplitz - Schönaú Czechy, 220 mtr. n. p. m. słynne cieplíce obojętne, 32 — 48° C. Lek. Dr. Hanakowski.

Cieplíce trenczyńskie = Trenczyn - Trencsin - Teplitz Król. węgierskie, 259 mtr. n. p. m. cieplíce siarczane, 38 — 40° C. L. Dr. Filipkiewicz.

Cieplíce warażyńskie = Töplitz - Warasdin = Warażyń Kroczyca, 274 mtr. n. p. m. cieplíce ziemno siarczane, 57° C.

Colberg = Kołobrzeg Prusy pomorskie, kąpielisko morskie i solankowe 4 — $5\frac{0}{10}$ soli kuchennej zawierające, wzajemnego połączenia obu rodzajów kąpiel następujące. Kuchnia na ogół fatalna. P. kap. od 15. VI do 30. IX.

Contrexeville Francya (Wogezy), 342 mtr. n. p. m. wybitnie ziemne źródła.

Cranz = Kranzkuhren po polsku **Koło** Prusy zachodnie, 4 mile od Królewea, morskie kąpiele, bardzo uczęszczane przez Polaków. P. kap. od 15. VI do 20. IX.

Cudowa = Kudowa Śląsk pruski, 412 mtr. n. p. m. szczyawy alkaliczno ziemno żelaziste.

Davos dwie obok siebie miejscowości: Davos-Dörfli i Davos am Platz, Szwajcarya, 1570 mtr. n. p. m. najznakomitsza klimatyczna alpejska zimowa St. przez cały rok do używania. Pensjonat od osoby 10—15 frank. dz. Od kilku lat jest tu dobrze urządzone Sanatorium Dr. Turbanna przeważnie dla chorób płucnych.

Dieppe Francya (Normandia), wyborne morskie kąpielisko. P. kap. od 1. VI do 30. IX.

Driburg Westfalia, 200 mtr. n. p. m. szczyawy alkaliczno ziemno żelaziste. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Dorna - Watra zwykle **Dorna**, Bukowina w Karpatach, wysokość n. p. m.? szczyawy alkaliczno żelaziste, urządzenia nędzne, nielicznie uczęszczane.

Druskieniki Litwa (guber. grodzieńska), 17 kilm. od St. k. ż. warszawsko-petersburskiej, Porzecze, 200 mtr. n. p. m. solanka $1\frac{0}{10}$, L. L. Bujakowski i Szebietowski. Zakład zdrojowo-kąpielny znakomity. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Druźbaki, niemiec. **Rauschenbach**, węgiers. **Felső-Ruszbach**, dwie wsie: Druźbaki niżnie i wyżnie, Węgry (Spiż), wysokość n. p. m.? cieplica wapniowa, 24 . 2° C. już w r. 1541 opisana po łacinie przez Wernhnera, a po polsku w r. 1640 przez Petricego, w 17 wieku przez magnatów polskich licznie odwiedzane, obecnie bardzo mało przez chorych uczęszczane. Pobyt nader tani.

Eaux-Bonnes Francya (depart. doln. Pyrenejów), 748 mtr. n. p. m. cieplíce siarczane, $32\frac{0}{10}$ C. P. kap. od 15. V do 15. IX.

Eaux - chaudes Francya (depart. doln. Pyrenejów), 675 mtr. n. p. m. cieplíce siarczane, 11 — 36° C. o 6 kilm. od poprzednich odległe. P. kap. od 15. VI do 15. IX.

Eilsen w Ks. Lippe-Schaumburg 88 mtr. n. p. m. najsilniejsze z niemieckich wód siarczanych zimnych. Urządzenia balneotechniczne wyborne. P. zdr. kąpielna od 1. VI do 1. IX.

Elmen w Prusach 48 mtr. n. p. m. bardzo silna solanka w kwas węglowy zamożna. Jest tu zakład leczniczy dla dzieci (Augusta Heilanstalt) za opłatą miesięcznie 60 do 75 mrk.

Elster Saksonija, 457 mtr. n. p. m. alkaliczno słono żelaziste wody, identyczne z Francensbadem, wyborne balneotechniczne urządzenia, L. polak Dr. Błociszewski.

Ems Ks. Nassauskie, 91 mtr. n. p. m. słynne cieplice słono alkaliczne, 23—46° C. nader wielki export ich wód. Pobyt drogi.

Ernsdorf zobacz **Jaworze**.

Essentuki Ces. rossyjsk. Kaukaz, 24 źródeł, stanowiących dwie grupy: zdroje alkaliczno słone, a z tych dwa najważniejsze, oznaczone Nr. 17 i 18, na miejscu i do rozsyłki używane, składem chemicznym zbliżone do Luchaczowie; nadto jest tu zdroj siarczany zimny. Dr. Badde tudzież Prof. Drowie Woskreszynsky i Alexejew podnieśli bardzo ważne ujemne strony źródeł essentuckich mianowicie Nr 20, 21 i 22 oznaczonych. P. zdr. od 15. V do 10. IX.

Euganejskie zdroje Włochy w zachodniej stronie Padwy, dawniejsze podmorskie wulkaniczne wzgórza ujawniły tu liczne i silne cieplice ziemno słone, 60—70° C. w miejscowościach: Abano, Bataglii i St. Pietro Montagnone.

Eupatoria w Ces. rossyjskiem, m. na półwyspie krymskim, nad szeroką i otwartą zatoką, stepem otoczone, jest kąpieliskiem morskiem. Wśród lata nieznośne upały. Ciepłota wody w morzu dochodzi latem do 25° C. Najsposobniejszy czas do kąpiei w morzu stanowi Październik i Listopad.

Fachingen Prusy (okrąg rządowy Wiesbaden), 112 mtr. n. p. m. wyborna czysta alkaliczna szczawa, zamożna w kwas węglowy, mnogo rozsyłana do dyetetycz. i leczniczego użycia. Nie ma tu urządzonego zakładu zdrojowego.

Falkenstein Prusy (prow. Hessén-Nassau), 440 mtr. n. p. m. Sanatorium dla chorych piersiów., wzorowo urządzone, kierownik Dr. Dettweiler, pensjonat od osoby 9—12 marek dziennie.

Fellathalquellen Karyntya, 598 mtr. n. p. m. proste alkalicz. szczawy, z niemieckich najzamożniejsze w dwuwęglan sodowy, mnogo na handel rozsyłane.

Flinsberg Szlask pruski, 528 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste, tudzież St. klim. górską leśną. P. pob. od 15. V do 30. IX.

Frankenhausen Turyngia, 115 mtr. n. p. m. solanka 2‰, Sanatorium dla skrufulicz. dzieci od 2 do 4 lat, za cztero tygodniowy pobyt 60 mrk. od chorego.

Francensbad Czechy, 3½ klm. od m. Eger, zkąd dawna nazwa Eger-Francensbad, 423 mtr. n. p. m. alkaliczno słono żelaziste szczawy, zamożne w kwas węglowy, wzorowe balneotechniczne urządzenia kąpielne. Z tutejszej borowiny wysoko w skutkach cenionej wyrabia firma H. Mattoniego sól i ług borowinowy, a oba te przetwory, licznie w handel rozsyłane, zastosowywane są na kąpiele. LL. Polacy: Dembicki, Kittel i Rosner Jan.

Friedrichshall w Ks. Sasko-Meiningen, dawniejsza salsina i zdroj słono-gorzki, powszechnie znana woda gorzka p. i. „Friedrichshallerbitterwasser“ ze skutków rozwalniających.

Friedrichsroda m. w Ks. Sasko-Coburg-Gotha, ulubiona w Niemczech, letnia klimatyczna miejscowość, 430 mtr. n. p. m., corocznie przez 5.000 osób odwiedzana. P. pob. od 15. V do 15. IX.

Fürstenhof Styrya, prywatny folwark przy m. Kapfenbergu, 533 mtr. n. p. m. Zkl. hydropatyczny Dra Czerwińskiego, przeważnie przez Polaków uczęszczany, pensjonat 30 do 40 Złr. tygodniowo od osoby.

Gainfarn przy m. Vöslau pod Wiedniem, 200 mtr. n. p. m. Zakł. hydropatyczny Dra Friedmanna, pensjonat 50 Złr. tygodniowo od osoby.

Gais Szwajcarya (kant. Appenzell), 935 mtr. n. p. m. najdawniejszy zkl. galaktoterapeutyczny, pensjonat 4—6½ frank. dziennie od osoby. P. pob. od 1. VI do 1. X.

Gastein = Wildbad-Gastein i Hof-Gastein po pols. Gastuń, Austrya (Ks. Salzburgskie), 960 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 24--48° C. klimat czysto alpejski. Najodpowiedniejszą p. pob. jest Lipiec i Sierpień.

Giesshübl-Puchstein pod Karlsbadem, Czechy, 340 mtr. n. p. m. znakomita prosta szczawa alkaliczna, export roczny do dyetetycznego użytku około 8 milionów flaszek, napełnianie wzorowe. Jest tu Zakład hydropatyczny.

Gleichenberg Styrya, 248 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. muryatyczne, klimat łagodny, urządzenia balneotechniczne wzorowe, LL. Polacy: Brühl i Bulikowski. P. pob. od 1. V do 30. IX.

Gmunden Austrya górna, 415 mtr. n. p. m. St. klim. powietrzna letnia, kąpiele solankowe z wody słonej Ebenesee, 24% soli kuchen. zawierającej. P. pob. od 1. VI do 30. IX.

Goczałkowice Śląsk pruski, ¼ godz. od St. k. ż. Pszczyny (Pless), 266 mtr. n. p. m. solanka jodobromowa, 3% soli kuchennej, znaczny export stężonej solanki i soli zdrojowej.

Goriatszewodzk Ces. rosyjs. Kaukaz, w górach kabardyńskich, cieplice siarczane 87-90° C. gorące.

Görbersdorf Śląsk pruski, 450 mtr. n. p. m. Sanatorium dla chorych piersiowych, ś. p. Dra Brehmera, obecnie pod kierunkiem Dra Aechtermanna, cały rok otwarte. Pensjonat czterotygodniowy 300 marek. Obok poprzedniego zakładu jest drugi Dra Römplera nieco tańszy.

Gräfenberg Śląsk austriacki, 580 mtr. n. p. m. przez swego założyciela Priessnitza najdawniejszy i powszechnie znany Zkl. hydropatyczny, cały rok otwarty.

Gries połudn. Tyrol, 270 mtr. n. p. m. ¼ g. od Botzen, St. klim. zimowa i uzdrowisko winogrodowe. P. pob. od 15. IX do 30. IV.

Griesbach W. ks. Badeńskie, 496 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste. P. pob. od 15. V do 15. IX.

Grodzisko Król. pols., St. k. ż. warszaw. wiedeńskiej, Zkl. kąpielowo leczniczy, dom zdrowia z wygodami, żywienie

dietetyczne z kuchni zakładu, L. i właścicielem Zkł. był ś. p. Dr. Bojasiński, konsultantem Dr. Tokarski.

Źródło **Gubera** w Srebrenicy w Bośni, ztamtąd woda zawierająca arsen i żelazo.

Hall rakuski, Górna Austria, 376 mtr. n. p. m. jodobromowa solanka 1‰.

Hall tyrolski, Tyrol, 537 mtr. n. p. m. solanka 26‰, urządzenia kąpielne łącznie.

Hall = **Schwäbisch Hall** król. Wirtembergs, 290 mtr. n. p. m. solanka 2 ¼ ‰.

Hallstadt Austria (Salzkammergut przy Ischlu), solanka 27‰, wysokość n. p. m.?

Harkany połud. Węgry, 90 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 62° C. Szczególną własnością tutejszej cieplicy jest wydobywający się z niej tlen siarczek węgla (Kohlenoxydsulfid), który zapalony pali się niebieskawą barwą.

Helgoland wyspa m. północnego, kąpielisko morskie. p. kap. od 1. VI do 1. X.

Heluan w Egipcie, 25 kilm. od Kairu, st. klim. zimowa i cieplice siarczane 32° C. Urządzenia balneotechniczne i pomieszkania należyte. Pora pob. do leczenia klimatycznych od 15. IX do 15. IV; zaś dla kąpeli od 1. V do 1. VI. Koszt pięcioletniego pobytu około 3.000 franków.

Heringsdorf na wyspie Usedom w Pomeranii, ulubione kąpielisko morza wschodniego, od łądu wysokopiennym lasem otoczone, licznie uczęszczane od 15. V do 30. IX.

Herkulesbad zobacz **Mehadia**.

Homburg Ks. Nassauskie (okrąg rządowy Wiesbaden), 189 mtr. n. p. m. źródła żelazisto glaubers. i żelazisto słone, klimat dobry a urządzenia wspaniałe. P. zdr. od 1. V do 1. XI.

Hyerès Francja, 1 godz. od Toulonu, 100 mtr. n. p. m. St. klm., dzienne wahania ciepłoty gwałtowne, przeto dla chorych piersiowych miejscowość nieodpowiednia. P. pob. od 1. X do 1. V, jednak najwięcej chorych wyjeżdża już na początku Marca, z powodu panujących o tej porze wiatrów.

Ingol w Ces. rosyjskiem (gub. jenijskiej), wielkie jezioro słone o 350 kilm. od Tomska oddalone. zbadane r. 1890/91 przez Prof. Dr. Zaleskiego, ciepłota 20—22° C., którego jeziora woda i muł używane są od miejscowej ludności na kąpiele. Nie ma dotychczas urządzeń kąpielnych ani pomieszczeń.

Inowrocław po niemiecku **Inowrazlaw** Ks. Poznańskie, m. powiatowe, od r. 1876 urządzony Zkł. silnych kąpiel solankowych 25‰, własność Towarzystwa akcyjnego, zawiązanego staraniem Dr. Dr. Wilkońskiego, Grabowskiego i Rakowskiego. L. L. Krzymiński i Przybyszewski.

Interlaken Szwajcarya (kant. Bern.), 568 mtr. n. p. m. St. klim. podalpejska i uzdrowisko galaktoterapeutyczne, licznie uczęszczane osobliwie od Kwietnia do Września. Koszt dzienny w pensjonacie od osoby 8 do 12 Zlr.

Ischl Austria (Salzkammergut), 484 mtr. n. p. m. solanka 24‰, klimat łagodny, wilgotno ciepły. P. zdr. od 1. VI do 30. IX. Pobyt drogi.

Iwonicz Galicya, St. k. ż. transversalnej, o 2 mile oddalanej od zakładu zdrojowego, w którym od r. 1892 rozpoczęto wydobywanie oleju skalnego dziennie po 150 metryczn. cetnr. z ujmą przeznaczonemu i celowi leczniczego zdrojowiska. 410 mtr. n. p. m. szczawy jodobromowo słone, opisywane od r. 1630, około 400 pokoiów gościnnych, 3 gmachy lazienkowe z 114 wannami do kąpieli. Zkl. Dr. Dembicki, tudzież Dr. Rościszewski P. zdr. od 15. V. do 1. X.

Jastrzębie niemiec. **Königsdorf - Jastrzemb** Szląsk pruski. 250 mtr. n. p. m. wody słone brom zawierające, L. Zakł. Dr. Witeczak wybornie polski język posiadający.

Jaszczurówka Galicya w Tatrach przy Zakopanem, ad-tynencya wsi Poronina, 908 mtr. n. p. m. jedyna polska cieplica obojętna 21° C. kąpiele w zbiorniku, hotel wygodnie urządzone.

Jaworze niemiec. **Ernsdorf** Szląsk austrijski u stóp Beskidu, 1 mila od Bielska, 360 mtr. n. p. m. Zkl. żętyczny, a głównie wodolecznicy, obecnie co do swych urządzeń ulepszone, którego dzierżawcą i kierownikiem Dr. Czop

Johannisbad Czechy, 651 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 29° C. St. klim. powietrzna letnia. P. zdr. od 16. V do 30. IX.

Juliuszhal Brunświk, 317 mtr. n. p. m. solanka 6%, St. klimatycz. powietrzna na lato. P. zdr. od 25. V do 1. X.

Karlsbad zobacz **Carlsbad**.

Kaltenleutgeben Austrya, 2 godz. od Wiednia, pierwszorzedny w Austrii Zkl. hydropatyczny, własność Prof. Dra Winternitza, mogący współcześnie pomieścić około 900 chorych, racjonalnie i wzorowo prowadzony, pensjonat od osoby 50 Złr. tygodniowo.

Kamionka Podole rossyjs. miasteczko nad Dniestrem, jedyne polskie uzdrowisko winogrodowe. Dr. Dr. Bociański, Kotsowski.

Kisłowodzk Ces. rosyjsk. Kaukaz, guber. Stawropolska, 864 mtr. n. p. m., liczne i rozmaite źródła, z tych najważniejszy zdroj Narsan (w narzeczu krajowem ma znaczyć olbrzymie źródło), szczawa alkaliczno słono żelazista z ogromną ilością kwasu węglowego, (w 1000 częściach wody 1.81419); 83 hektolitrow na 1 minutę wody dostarczająca, mieszkania i gmachy zdrojowe są odpowiednie a nawet wspaniałe. P. zdr. od 15. VI do 1. X.

Kissingen Bawarya, 190 mtr. n. p. m. pierwszorzedne zdrojowisko pod względem balneotechn. urządzeń i komfortu, znakomite szczawy żelazisto słone, 10—20° C. L. Dr. Chłapowski. Posiada zakłady: hydropatyczny, dyetetyczny i pneumatyczny. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Kołobrzeg zobacz **Colberg**. Dr. Weissenberg (po polsku).

Königswart Czechy, 1 godz. od Maryenbadu, 632 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste w kw. węglowy zamożne.

Kösen Prusy (prow. saska), 110 mtr. n. p. m. solanka 5%, zamożna w siarkany alkaliczne i wapniowe, uznana za północno-niemiecki ogródek dziecięcy. Jest tu lecznica dla dzieci imienia Cesarzowej Augusty Wiktorii o 36 łózkach dla chorych, a o 40 łózkach dla kolonii wakacyjnej.

Köstritz Saksonia, 170 mtr. n. p. m. 22% solankowe kąpiele, tudzież gorące piaskowe, tak urządzone, iż chory leżąc, na świeżem powietrzu może przebywać. P. zdr. od 15. V do 1. X.

Korytnica Węgry, komitat lipowski, w Karpatach, 847 mtr. n. p. m. źródło ziemno żelaziste, klimat iście karpacki.

Krankenheil przy Tölz (górną Bawaryą), 650 mtr. n. p. m. jodosodowo alkaliczne źródło, z których przyrządzane kąpiele wzmacniają solą zdrojową i takież mydłem, bywają zazwyczaj zastósowane zbyt gorąco i długo. P. zdr. od 15. V do 1. X.

Krapina-Töplitz Kroacja, 160 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 41—43° C.

Krasnobród w. Król. polskiem, gub. lubelska, pow. zamojski, St. k. ż. nadwiślańskiej Rejowiec, od r. 1888 Zkł. kumysowy i uzdrowisko klimatyczne z pensjonatem dla chorych piersiowych, utrzymanie miesięczne z kumysowem leczeniem od 75 do 100 r. s. L. Zkł. Dr. Skłodowski.

Kranz zobacz **Cranz**.

Kreuth Bawaryja, 812 mtr. n. p. m. pierwszorzędny zakład galaktoterapeutyczny niemiecki, idyliczne położenie, pyszne lasy, najstaranniejsze promenady wolne od kurzu, klimat ostry, wachania dziennej ciepłoty gwałtowne, wyborna żentyca. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Kreuznach Bawaryja, 106 mtr. n. p. m. słaba solanka, odrobine jodku i bromku sodu zawierająca, o ciepłocie 8—30° C. zasilana 6 źródłami słonemi, pochodzącemi z miejscowości Münster am Stein, o 25 minut od Kreuznach odległej, ogromny export wyrabianego lugu i soli zdrojowej. P. zdr. od 1. V do 1. X.

Królewica m. portowe w Kroacji, po Kroacku Kraljevica, niemiecku Königshafen, włosku Porto-re, nad m. Adryatykiem, o 1 godzinę drogi oddalone od Fiumy, kąpielisko morską od 4 lat założone, klimat ten sam jak w Abbazy, pożytk bardzo tani. Dr. F. Grodecki wydał monografię tej miejscowości p. t. „*Porto-re-Kraljevica*) — *Seebad u. Klimatische Station-Susak 1893. 8^o str. 83 z ilustracyą*“.

Krondorf Czechy, 1 mila od Karlsbadu, prosta szczawa alkaliczna, corocznie około 1 miliona flaszek do dyetetycznego użycia rozsyłana, napelnianie wzorowe.

Krynica Galicya, St. k. ż. Muszyna-Krynica, 589 mtr. n. p. m. z filialnym źródłem w Slotwinach, nadto zakład hydropatyczny pod kierunkiem Dra Ebersa, z pensjonatem od osoby dziennie 5—7 Zlr. tudzież zakład dyetetyczny własność Dra Skórczewskiego, za opłatą tygodniową od osoby 24—42 Zlr., wreszcie pensjonat dla pań P. Burzyńskiej, 18 źródeł szczawy alkaliczno ziemno żelazistej, bardzo zamożnej w kw. węglowy, wzorowe urządzenia balneotechniczne kąpiel: mineralnych, borowinowych i suchych gazowych, L. Zkł. Dr. Kopff, nadto Dr. Dr. Askenazy, Blatteis, Cercha, Ebers, Gembarzewski, Glücksmann, Lorentski, Kmietowicz, Michalik i Skórczewski; 1500 pokoi gościnnych, 2 gmachy lazienkowe o 100 wannach, klimat podalpejski, na miejscu wyrób pastylek krynickich i wyciągu z igliwia świerkowego na kąpiele balsamiczne przez H. Nitribitta miejscowego aptekarza. P. zdr. od 5. IV do 30. IX.

Krzeszowice w ks. Krakowskiem, St. k. ż. 24 kiln. od Krakowa, zakład kąpielny wód siarczanych, Lekarz Zakładu Dr. Dura.

Kudowa zobacz **Cudowa**.

Kumagorsk Ces. rossyjs. Kaukaz, źródł siarczany 30·5° C. ciepły. Nie ma tu urządzeń zdrojowokąpielnych.

Landeck Szląsk pruski, 452 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 22—29° C. nieco siarkowodu i siarczku sodu zawierające, L. Zł. Dr. Ostrowicz, Dr. Pomorski wśród sezonu. P. zdr. od 15. V do 15. IX.

Langenbrücken W. ks. Badeńskie, 138 mtr. n. p. m. zimne wody siarczane. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Lenk Szwajcarya, kanton Wallis, 1414 mtr. n. p. m., zdroje ciepłcze wapniowe 45° do 51° C. mające, używane na kąpiele wspólne w zbiornikach, mieszczących na raz 50 osób, aż dotychczas zbyt długo od 1 do 5 godzin trwających. Cena kąpieli 2 fr. P. kap. od końca V do początku IX miesiąca.

Levico Tyrol południowy, 533 mtr. n. p. m. zdroje z siarkanem żelaza, zawierające niedokwas miedzi i arsen, używane przeważnie do rozsyłki. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Libawa kąpielisko morskie w Bałtyku. P. kap. od 15 V do 1. IX.

Lipik Slawonia, 158 mtr. n. p. m. alk. muriat. jodowa cieplica, 46—63° C. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Lippsringe Prusy (Westwalia), 136 mtr. n. p. m. wody ziemno żelaziste, tutejsze gazy źródłane: z tlenu, azotu i kw. węglowego złożone, używane są do wzięwań. P. zdr. od 15 V do 15. IX.

Lubień Galicya 3 mile od Lwowa, 275 m. n. p. m. bardzo obfite zimne źródła siarczane. L. Zł. Dr. Radecki.

Lubownia nowa Węgry (Spiż), 556 m. n. p. m. Zakład zdrojowy w pięknym i rozległym parku, szczawy alkali z ziemno żelaziste. Pobyt bardzo tani. Tutejszy zamek pamiętny jest przytulkiem Jana Kazimierza i wytechnieniem Jana Sobieskiego w powrocie z pod Wiednia.

Luchaczowice Morawia, 508 mtr. n. p. m., szczawa słono jodobromowa, na miejscu zwykle z żetycą lub z mlekiem wewnątrznie używana. P. zdr. od 18. V do 30. IX.

Lugano Szwajcarya, kanton Tessyński, 275 mtr. n. p. m. cenna st. klim. przejściowa.

Madeira północ. Afryka z. m. Funchal, słynna St. klim. południowa wilgotno gorąca, pobyt tu zwykle wymagany do 2 lat, pensjonat najtańszy tygodniowo 12—15 fnt. szterl. od osoby.

Maryenbad Czechy, 640 mtr. n. p. m. położenie zakładu idylliczne, klimat wilgotny, ranki i wieczory chłodne, alkaliczno glauberskie zimne zdroje w g. węglowy zamożne, wzorowe urządzenia balneotechniczne. L. Zakł. Prof. Kisch, znany balneolog, L. L. Polacy: Dobieszewski, Fraenkel, Harajewicz jun., Kaufman i Prager. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Maryówka zakład hydropatyczny 6 kilon. od Lwowa, świeżo (1892) a przez cały rok otwarty, własność E. Brajera, koszt tygodniowego pobytu od 25 Złr. i wyżej.

Mehadia = **Herkulasbad** przy **Mehadii** Węgry (Banat), 174 mtr. n. p. m. Słynne cieplice siarczane 39—40° C.

Meinberg w ks. Lippe-Detmold, 210 mtr. n. p. m. ziemno i słono siarczane źródło, kąpiele: siarczano mulowe i gazowe. P. zdr. od 20. V do 10. IX.

Mentona = **Mentone** połud. Francya, 1 godz. k. ż. od Nizy, w zatoce genueńskiej, St. klim. nader korzystnie położona, umiarkowano wilgotna a względnie ciepła, pensjonat dziennie od osoby 10 franków. P. pob. od 1. X do 30. IV.

Meran wraz ze sąsiednimi gminami: Ober- i Untermais tudzież Gratsch, połudn. Tyrol 319 mtr. n. p. m. Uznana i znakomita St. klim. zimowa, p. pob. od 15. IX do 15. V, w pensjonatach wyborna kuchnia, 4—5 Zlr. dziennie od osoby, wiosną leczenia galaktoterapeutyczne, jesienią winogrodowe. Lekarz polak Dr. Binder i Brühl.

Michailowodzkie źródła Ces. rossyjsk. Kaukaz 254 mtr. n. p. m. cieplice siarczane i słono siarczane o temperaturze od 55° do 68° C. najchłodniejszy zaś źródło ma 28° C.

Misdroy Pomerania, dobre i ulubione kąpielisko morskie, lecznica prywatna dla zolżowych dzieci. P. kąp. od 20. VI do 20. IX.

Mishor w Ces. rossyjskiem na południowym brzegu półwyspu krymskiego wieś tatarska, kąpielisko morskie. Obok rzeczzonej wsi jest posiadłość hr. Szuwałowa, otoczona ogrodami i winnicami, a w niej 4 wille do pomieszczenia gości kąpielowych. Pobyt spokojny iście sielski.

Mondorf W. ks. Luxemburskie, 198 mtr. n. p. m. 1—15‰, cieplica bromowo solankowa, 24° C. przeważnie na kąpiele używana.

Morgentheim król. Wirtemberskie 191 mtr. n. p. m. Zakład od miasta 1000 kroków odległy od swego źródła Carlsquelle, nazwany Carlsbadem, ma wodę słono gorzką, którą w podparowanym stanie na handel rozsyłają.

Monsummano Włochy (prowincya Lucca), oprócz cieplice siarczanych 40—50° C., posiada grotę z naturalną parą, służącą na kąpiele gazowo-parowe. Pobyt od Maja do Września.

Mont-Dore Francya (depart. Puy-de-Dôme), 1046 mtr. n. p. m. klimat zmienny i ostry, cieplice solankowe 42—45° C. ze śladem arsenu. Pobyt drogi, w pensjonacie 15 fr. dziennie od osoby.

Montreux Szwajcarya (nad jeziorem Genewskiem kant. Waadt), wspólna miejscowość z 20 sąsiednich gmin złożona, 979 mtr. n. p. m. St. klim. zimowa, o wiele chłodniejsza, jak Meran. Zetyczne tudzież winogrodowe leczenie. P. pob. od 1. IX do 15. V.

Morszyn Galicya (obwód Stryjski), 316 mtr. n. p. m. oprócz słonych źródeł, znakomite słono gorzkie źródło, wyrób odnośnej soli zdrojowej do picia i na kąpiele, zakład zdrojowy jest własnością „Towarzystwa lekarzy galicyjsk.“ stanowiąc fundusz wdów i sierót pozostałych po lekarzach. Dr. Tyszkowski.

Münster am Stein Prusy (Prowincya nadreńska) 100 mtr. n. p. m., niedaleko Kreuzuachu, zakład kąpiele słonych bardzo dobrze urządzonych. Własność rządowa.

Nałęczów Król. polskie, o 10 kilm. od Lublina, źródło ziemno-żelaziste, skapę w kwas węglowy, zakłady: kąpielny, hydropatyczny (przeważnie) i kumysowy, pensjonat dziennie 3½ do 5 r. s. od osoby, Dr. Chmielewski Dyrektor Zł. tudzież Dr. Dr. Chełchowski, Puławski, Saczewicz.

Nauheim Ks. Hessen-Darmstadt, 140 mtr. n. p. m. naj-silniejsza niemiecka cieplica solankowa, nader zamożna w kw. węglowy, 35° C. położenie rozkoszne, urządzenia balneotechniczne wyborne. Dr. Jankowski.

Nenndorf Prusy (prowincja Hessen-Nassau), 71 mtr. n. p. m. zimne wody siarczane, z niemieckich najsilniejsze, tudzież solanka 6% wzorowe urządzenia balneotechniczne. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Nervi Włochy przy Genui. St. klim. południowa, pensjonat 10—12 frank. dziennie od osoby. P. pob. od 1. X do 1. V.

Neuenabr Prusy nadreńskie, 87 mtr. n. p. m. cieplice alkaliczne 20—40° C. analogiczne z Ems i Vichy, klimat łagodny. P. kap. od 1. V do 15. IX.

Nieklan Król. polskie, St. k. ż. iwanogrodzko-dąbrowskiej tegoż nazwiska, świeżo otwarty Zł. hydropatyczny w wил-lach hr. Platera, okolica leśna, kierownik Dr. Misiewicz.

Niemirów Galicya (obwód żółkiewski), zimne siarczane źródło, zakład kąpielny opuszczony.

Niederlangenau Szląsk pruski, 359 mtr. n. p. m. szczawa alkaliczno-żelazista.

Niederselters zobacz **Selters**.

Nizza = Nice Francya (depart. Alp. morskich), tuż przy morzu Śródziemnem, ulubiona St. klimat, południowa, umiarko-wano wilgotno ciepła, pensjonat od 10 do 20 frank. dziennie, L. polak Dr. Tymowski. P. pob. od 1. X do 1. V.

Norderney Prusy (Hanowers.), wyspa m. północnego, najznakomitsze niemieckie kąpielisko morskie, lecznica dla zół-zowych chorych, pensjonat w hotelach 50 marek tygodniowo od osoby. P. kap. od 1. V do 15. IX. Dr. Paniński.

Nowe Miasto nad Pilicą Król. pols. gub. Piotrkowska. Zakład wodoleczn. Dra Bilińskiego, pensjonat od 2 r. 20 k. do 3 r. s. dzien. od osoby, L. L. Dr. Dr. Bieliński, Niedzielski i Skowroński.

Nowy Szmeks po węgiersku **Uj-Tatrafured**, Węgry w Karpatach, 1060 mtr. n. p. m. zakład wodoleczniczy i sanato-ryum dla chorób piersiowych Dra Szontagha.

Obersalzbrunn Szląsk pruski, 380 mtr. n. p. m. szczawy słono-alkaliczne, galaktoterapija, klimat przystry i wilgotny, pobyt tani. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Odessa w Ces. rosyjsk., m. portowe na północnem po-brzeżu morza Czarnego, kąpielisko morskie. Ciepłota wody w mor-zu waha latem od 15° do 26° C., średnia jej temperatura 15° do 18° C. W Odeskiej zatoce są trzy naturalne słone jeziora („li-many“): Kujalnicki, Chadżybejski i Klein-liebentalski^a), służące na kąpiele słonomulowe. Najlepsza pora do namienionych kąpieł jest od 20. VI do 15. VIII. Ocenienie działania i skutków (fizio-logicznych i terapeutycznych) kąpieł limanów zawdzięczamy ś. p. Drowi Mocutkowskiemu. Dr. Kozłowski.

Ofen (Buda) wraz z Pesztem Budapeszt, Cieplice budyńskie, Węgry, na prawym brzegu Dunaju, liczne źródła gorące od 45° do 63° C. termy siarczane słabe. Urządzenia kąpielne wspaniałe, przez cały rok otwarte.

Oyenhausem = Rehme-Oyenhausem Prusy (Westfalia), 134 mtr. n. p. m. cieplice słone w kw. węglowy żarłoczne. 26—31° C. od 3‰ do 9‰ soli kuchennej zawierające. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Ostenda = Ostende Belgia, najwięcej uczęszczane kąpielisko morskie, wspaniałe i zbytkowne urządzenia, pobyt drogi, Zakład zbyt ruchliwy i bez spokoju.

Palermo stolica Sycylii, krajobraz pyszny, bogatą roślinnością umajony, klimat ogółem wilgotno ciepły, St. klimat. południowa, pensjonat w hotelu 15 lir. dziennie. P. pob. od 15. X do 30. IV.

Pau Francya (depart. niższych Pyrenejów), 207 mtr. n. p. m. St. klimatycz zimowa, cieplejsza o 2° C. od Meranu. pensjonat 10 frank. od osoby dziennie. P. pob. od 1. X do 15. IV.

Piatigorsk Ces. rosyjsk. Kaukaz, guber. Stawropolska, 993 mtr. n. p. m. 20 źródeł siarczanej ciepłej o temperaturze od 29·3° do 51·25° C. tudzież źródła alkaliczno żelaziste 11° R. mające, urządzenia kąpielne należyte nawet zbytkowne. P. pob. od 1. V do 1. X.

Petersthal W. ks. Badeńskie, 421 mtr. n. p. m. jedna z t. z. Kniebischäder, najznakomitsze szczawy alkalicz. ziemno żelaziste. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Pfäfers zobacz **Ragatz-Pfäfers**.

Piszczany = Pystjan Węgry (komitat Neutra), 135 mtr. n. p. m. Cieplice siarczane 57—75° C. Tutejszy muł zdrojowy terapeutycznie ważny i bardzo używany na kąpiele. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Plombières Francya (Wogezy), 421 mtr. n. p. m. liczne źródła ciepłe obojętne od 19 do 69° C. kąpiele wybornie urządzone. P. zdr. od końca V do połowy X.

Pontresina Szwajcarya (kant. Graubinden), 1828 mtr. n. p. m. Schronisko letnie, mimo wielkiego wzniesienia, klimat łagodny, liczne hotele i pensjonaty, od 6 do 10 frank. dziennie od osoby. P. p. od 1. V do 30. IX.

Psekups Ces. rosyjsk. 50 kilometr. od m. Jekatinodaru, cieplice alkaliczno siarczane od 30·5° do 52·2° C. z tych najsilniejsze do kąpiel źródła: Alexandra, Maryi i Michała.

Pustomyty Galicya, 1 mila ode Lwowa, wody siarczane zimne, od r. 1879 skromny zakładzik zdrojowo kąpielny.

Püllna wieś w Czechach, źródła wody gorzkiej, mnogo w handel rozsyłanej.

Pyrmont ks. Waldeck, 130 mtr. n. p. m. liczne źródła trzech rodzajów: proste szczawy, wody słone 4‰, a najważniejsze silne żelaziste źródła, bardzo żarłoczne w kwas węglowy, pobyt drogi. P. zdr. od 15. V do 30. X.

Rabka Galicya, St. k. z. transversalnej, 500 mtr. n. p. m. najsilniejsze z europejskich źródła słono jodobromowe, w tutejszym zakładzie jest od r. 1887 „lecznica dla dzieci skrofulicznych“

założona przez Tow. Opieki Szpitalnej w Krakowie; na miejscu wyrób soli zdrojowej i ługu; klimat podgórski, powietrze czyste. L. Zkł. Dr. Głuchowski, Kaden, Dr. Momidłowski. P. zdr. od 15. V do 1. X.

Ragatz-Pfäfers Szwajcarya (kant. St. Gallen), dwa zdrojowiska: Pfäfers 685 mtr. a Ragatz 521 mtr. n. p. m. których cieplice obojętne 38° C. służą wspólnie do użycia, pensjonat od 7 do 10 frank. dziennie. Ragatz zajmują osoby zamożne; zaś Pfäfers stanu średniego, spokoju szukające.

Rehme zobacz **Oeynhausien**.

Reichenhall Bawarya, 457 mtr. n. p. m. podalpejskie zdrojowisko, stosunki klimatyczne pomyślne, dobra solanka 24% do kąpiel, tudzież zdroj pitny solankowy (Trinksoole) i woda gorzka przyrządzana z żóły reichenhalskiej, g. kw. węglowynu wysyczonej, nadto wyborna zentyca i soki ze świeżych ziół wyciśnione, jakoteż znakomity zakład aeropneumatyczny i inhalacyjny po wziewań solankowych i balsamicznych (własność Macka) pod kierunkiem znakomitego pneumoterapeuty Dr. G. Liebiga będący, a drugi zakład inhalacyjny (własność Lehmann) urządzone według systemu Jahra, służą za środki kuracyjne. Ogółem urządzenia balneotechniczne wzorowe, między lekarzami zdrojowemi Polak Dr. Zygm. Goldschmidt. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Reinerz Szlask pruski, 558 mtr. n. p. m. zdroje ziemno alkal. żelaziste, wyborna zentyca, klimat górski, kąpiele: mineralne, wodne i borowinowe znakomicie urządzone. P. zdr. od 1. V do 30. IX. Dr. Stan.

Roncegno połud. Tyrol, 535 mtr. n. p. m. zdroj arsenowo żelazisty, do picia i do kąpiel na miejscu używany.

Römerbad połud. Styrya, 237 mtr. n. p. m. obojętne cieplice 36—38° C. klimat łagodny.

Royat Francya (depart. Puy de Dome), 415 mtr. n. p. m. cieplice alkaliczno muryatyczne, 20—35° C. klimat dosyć ostry, częste deszcze i burze, pobyt bardzo drogi, zdrojowisko od arystokracji wielce uczęszczane, urządzenia balneotechniczne znakomite. P. zdr. od 15. VI do 15. IX.

Rożnów = Roznau Morawia, 400 mtr. n. p. m. zakład zentyczny, dosyć uczęszczany, liche urządzenia.

Ryga w Ces. rossyjk. (gub. inflancka), m. portowe i forteczne, pierwszorzędne rossyjskie kąpielisko morskie, jest tu zakład kumysowy i fabryka sztucznych wód mineralnych, tudzież wspaniały zakład hydropatyczny z pensjonatem. P. kap. od 15. V do 15. VIII.

Rymanów Galicya, (obwód sanocki), St. k. ż. transwersalnej, o milę od zakładu oddalona, 3 zdroje szczawu alkaliczno słono jodobromowej, od r. 1881 zakład kąpielny, wyrób soli zdrojowej, podczas lata kolonija wakacyjna dla ubogich dzieci ze Lwowa. L. Zkł. Dr. Dukiet, nadto Dr. Dr. Jodłowski, Krzyszkowski i Regiec. P. zdr. od 20. V do 20. IX.

Saidschütz Czechy, zdroj wody gorzkiej mnogo rozsyłanej.

Sandefjord kąpielisko morskie w Norwegii, cechujące się wielką ilością soli morskiej, nadto zdroj słono siarczany, użycie: mułu morskiego na kąpiele i na okłady, tudzież nacierań człon-

ków chorobą dotkniętych meduzami. Pobyt czterotygodniowy jednej osoby około 200 koron. P. zdr. od 1. VI do 1. IX.

Saki w Ces. rosyjsk. (gub. taurycka), 150 mtr. n. p. m. Czarnego. o 3 wiorsty od niego odległe, posiada naturalne słone jezioro (liman), używane na kąpiele słono mułowe i wodne. P. kap. od 1. VI do 15. VIII.

St. Honore Francya, 272 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 26—31° C. Wspaniałe balneotechniczne urządzenia.

St. Sauver Francya, 770 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 20—34° C. Najliczniej uczęszczane francuskie zdrojowisko.

St. Moritz Szwajcarya (kant. Graubünden), 1856 mtr. n. p. m. St. klim. alpejska i zakład silnych źródeł żelazistych, bardzo zamożnych w kwas węglowy, P. zdr. od 1. VI do 15. IX.

Salzbrunn = Obersalzbrunn Szlask pruski, 380 mtr. n. p. m. szczawy solno alkalicz. i żelaziste, nadto środki galakto-terapeutyczne, znaczna rozsyłka tutejszych wód, urządzenia znakomite, tani pobyt.

Salzschlirf Prusy (prow. Hessen-Nassau), 240 mtr. n. p. m. jodobromowa solanka 1⁰/₀, w kw. węglowy zamożna, tudzież źródł. gorzki sodowo siarczany.

Salzungen ks. Sasko-Meiningen, 250 mtr. n. p. m. silne solanki 26⁰/₀, korzystne klimatyczne położenie uczyniło to zdrojowisko niezmiernie ulubionem letniem schroniskiem dla osób zółzowych i nieżytno podlegających. P. zdr. od 15. V do 1. X.

San-Remo Włochy (Riviera di Ponente) w zatoce genueskiej, St. klim. południowa, która co do ochrony od wiatrów i jednostajności ciepłoty powietrznej przewyższa: Nizzę, Cannes i Hyeres. Uzdrowisko klim. zbyt świeże, stąd wiele do życzenia pozostawia, pensjonat w hotelach 10—12 frk. dziennie od osoby, P. pob. od 1. X do 30. IV. L. Dr. Ostrowicz. Poprzednio wiele lat bawił tu zimą Dr. Tymowski, obdarzając to uzdrowisko polskimi publikacyami.

Saxon = Saxon les Bains Szwajcarya (kant. Wallis), 620 mtr. n. p. m. klimat niezdrowy, cieplice jodowe 25° C. pensjonat od 8 do 12 fr. dziennie od osoby. P. p. od 1. V do 30. IX.

Scheweningen kąpielisko morza północnego w Holandyi, słynne z korzystnego położenia i wspaniałych swych urządzeń. Koszt czterotygodniowego pobytu jednej osoby 450 mrk. P. kąpielna od 15. VI do 15. X.

Schinzach Szwajcarya (kant. Aargau), 342 mtr. n. p. m. klimat łagodny, cieplice ziemno siarczane 28—34° C. nadto źródł. jodowy z Wildeg, ulubiony zakład od zamożnych, wyborne urządzenia balneotechniczne, L. Zł. Dr. Tymowski. P. zdr. od 15. V do 15. IX.

Schlangenbad Prusy (prow. Hessen-Nassau), 313 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 32° C. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Schwalbach = Langenschwalbach, 315 mtr. n. p. m. silne szczawy alk. żelaziste, wyborne urządzenia balneotechniczne, mnoga rozsyłka wód tutejszych. P. zdr. od 1. V do 15. IX.

Selters = Niederselters Prusy (prow. Hessen-Nassau), wieś, szczawa alkaliczna. export roczny około 4 miliony flaszek, Zł. zdrojowego tutaj niema.

Simaiz w Ces. rossyjsk. na południowym pobrzeżu półwyspu krymskiego 5 wiorst od Alupki, wyborne kąpielisko morskie i stacya klimatycznie lecznicza ciepła, klimat i roślinność jak w Alupce, podostatek mieszkań dla gości kąpielnych.

Sławijansk Ces. rossyjskie (gubernia Charkowska) zdroje i jeziora słone 6% do 10% soli zawierające, latem szpital wojskowy, klimat niekorzystny, pobyt nie tani a zbyt nudny. Pora zdrojowa kąpielna od połowy V do połowy VIII miesiąca.

Sławinek Król. polsk. pod Lublinem, wody alkaliczno ziemno żelaziste słabe, pozbawione gazu kwasu węglowego, skromny zakładzik zdrojowo kąpielowy, L. Zł. Dr. Olechowicz.

Sławuta Wołyn, St. k. ż. brzesko-kijowskiej, St. klimat. leśna i zakł. kumysowy, lecznica dla chorób piersiowych pod światłym kierunkiem Dra Dobrzyckiego, Dr. Przesmycki właściciel zakładu i konsultant, nadto Dr. Dzierzbicki. Zakład otwarty corocznie od 22. V do 22. IX. Pensjonat 6-cio tygodniowy 150 r. s. od osoby.

Slotwiny zobacz **Krynica**.

Soden Prusy (prow. Hessen-Nassau), 142 mtr. n. p. m. klimat łagodny, liczne źródła wód słonych w kw. węglowy zamożnych, 15—30° C. wyborne balneotechniczne urządzenia, pensjonat 36—45 mrk. tygod. od osoby. P. zdr. od 15. V do 15. IX.

Solec Król. polskie (powiat Stopnicki), wieś, źródł. zimny alkal. słono siarczany, z krajowych najsilniejszy co do siarkowodu i połączeń siarki, niesłusznie opuszczony, L. L. Dr. Dr. Daniewski i Siarczyński.

Spaa = Spa Belgia, 250 mtr. n. p. m. wytwórny zakład kąpielny silnych wód alkalicz. żelazistych, w kwas węglowy zamożnych, dawniej od arystokracji licznie odwiedzany, obecnie po zniesieniu banku gry mało uczęszczany, opłata czyli taxa zdrojowa na sezon od 50 do 100 frk. w miarę ilości osób. P. zdr. od 1. V do 30. IX.

Srebreńnica m. powiatowe w Bośni, źródła siarkanowo żelaziste arsen zawierające, 2 do 4 łyżek stołowych dziennie używane, wprowadzone w handel przez firmę H. Mattoniego.

Staraja-Russa w Ces. rossyjsk. (gub. Nowogrodzka), m. powiatowe, 37 mtr. n. p. m., zdroje słone 1% soli kuchennej zawierające, urządzenia odpowiednie. P. zdr. od 26. V do 20. VIII.

Steben = Untersteben Bawaria (okrąg rządowy Oberfranken), 750 mtr. n. p. m. najwyżej położone niemieckie zdrojowisko wód żelazistych, w kw. węglowy zamożnych, pobyt tani. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Stołopińskie wody Ces. rossyjskie (gub. Samarska) 210 kiln. od Samary, źródło słono siarczane a drugie żelaziste, tudzież słone jezioro, którego muł używają do kąpiel. Wyrób kumysu wielki i mnogie jego zastosowanie na miejscu.

Swośzowice Galicya, 10 kiln. od Krakowa, St. k. ż. transversalnej, dawniej słynne kopalnie siarki, zimne wapniowo siarczane zdroje ze zakładem kąpielnym, od niedawna restytuowanym. L. Zł. Dr. Tislowitz.

Szczawnica Galicya (obwód Nowo-Sandecki), 523 mtr. n. p. m. wieś, 42 kiln. od St. k. ż. transversalnej Stary Sącz,

składa się ze Szczawnicy niższej i wyższej tudzież ze środkowej adtynencyi zwanej Miodzius, klimat podgórski, zdrojowisko jest obecnie własnością Akademii Umiejętności, szczawy słono alkaliczne, bogate w kwas węglowy a z europejskich najzamożniejsze w dwuwęglan sodowy, ma: filialny zakład zdrojowo kąpielny na Miodziusiu. Zkł. hydropatyczny własność Dra Kołaczkowskiego i Zkł. inhalacyjny, należący do spadkobierców Dra Janochy, coroczny export wód około stotysięcy flaszek, L. Zkł. Dr Ściborowski, nadto Dr. Dr. Górski Ks., Hammerschlag, Kołaczkowski, Kruszyński, Korczyński Lud.

Szkleno Węgry, 1 godz. od Schemnitz, ziemne cieplice 30—56° C.

Szliacs Węgry (komitat Sohl) 300 mtr. n. p. m. proste ciepłe wody żelaziste 11—31° C. w kwas węglowy zamożne. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Szkló Galicya, 35 kilm. ode Lwowa, zimne wody siarczane, wysokość n. p. m.? ma 2 zkł. kąpielne: wojskowy i cywilny, urządzenia nędzne. Najpierwsza jego monografia Dra Erazma Syxta: „O cieplicach we Szkle wydana w r. 1527“.

Taraps-Schuls Szwajcarya (kanton Graubünden), 1180 mtr. n. p. m. klimat alpejski, bogaty zasób źródeł mineralnych: glauberskich i szczaw żelazistych.

Teodozja Ces. rosyjskie, kąpielisko morskie na południowo wschodnim brzegu m. Czarnego półwyspu krymskiego, klimat zdrowy, sposobność do używania kumysu i winogradowego leczenia.

Töplitz-Schönau zobacz **Cieplice czeskie.**

Trenczyn zobacz **Cieplice trenczyńskie.**

Truskawiec w Galicyi wsch., u stóp Karpat stryjskich, wieś oddalona od Drohobycza 8 kilm. st. kol. transw. Zakład leży w dolinie 420 mtr. n. p. m. własność spółki obywatelskiej (ks. Sapieha i hr. Żółtowscy) obecnie dzierżawiony przez grono młodych i energicznych (Barącz, Mizerski, Dr Pelczar i inż. Wyczyński. Różne zdroje: solanka 24%, 3 źródła słonoglauberskie, szczawa alkaliczno magnowa, borowina żelazista o cennych własnościach, liczne źródła siarcz. Łazienki mineralne o 3 klasach, borowinowe. Łazienki do kąp. z wody słodkiej i tusze. Zkł. inhalac. systemu Warsmutha. Zkł. przez nową spółkę odrestaurowany i z komfortem urządzony. Frekwencya gości 1200—1500 osób, ilość kąpeli wydanych do 20.000. L. L. zkł. Dr Plech i Dr Pelczar, oraz wolno praktykujący Dr Steynhaus. P. zdr. od 15. V do 30. X.

Tyflis Ces. rosyjskie m. gubernialne 440 mtr. n. p. m., liczne źródła cieplicze obojętne zaopatrujące łazienki całego miasta.

Urawel Ces. rosyjskie (gub. Tyfliska) 1583 mtr. n. p. m., zdroje alkaliczno żelaziste w miejscowości zdrowej i uroczej, często burzami nawiedzanej.

Vals Francya (depart. Ardeche), 10 źródeł alkalicznych, do wód Vichy składem chemicznym bardzo zbliżonych, lubo zimniejszych, 13—16° C. mających. export tych wód wielki, pobyt tańszy jak w Vichy.

Vevey Szwajcarya nad jeziorem genewskim, 380 mtr. n. p. m. St. klim. podalpejska, dobra na wiosnę i jesień, z wyjąt-

kiem Lipca i Sierpnia, nieodpowiednia na zimę dla chorych piersiowych, leczenia winogrodowe, pensjonat 7—15 franków dziennie od osoby.

Vichy Francya (depart. Allier), 230 mtr. n. p. m. najznakomitsze zdrojowisko francuskie, cieplice alkaliczne, 12—44° C. wspaniałe balneotechniczne urządzenia, ogromny wyrób soli zdrojowej i pastylek, pobyt drogi, rozsyłka wód corocznie do 3 milionów flaszek. Właściwa pora zdrojowa od 1. V. do 1. X, jednak zakład kąpielny jest cały rok otwarty. Dr. Biernawski.

Vöslau pod Wiedniem, cieplice obojętne, 24° C. wielce uczęszczane przez zamożnych mieszkańców Wiednia, przede wszystkim płeć żeńska tudzież leczenia winogrodowe.

Warmbrunn Szląsk pruski, 325 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 35—38° C. Urządzenia balneotechniczne dobre. P. zdr. od 1. V do 1. X.

Warnemünde w Ks. Meklemburg-Schwerin kąpielisko morskie, dobrze urządzone a ceny nader umiarkowane. Pora kąpielna od 15. VI do 15. IX.

Warażdyn zobacz **Cieplice warażyńskie**.

Wenecya morskie miasto nad Adryatykiem, zaledwo bardzo mało ponad poziom morza na wyspach i piaszczystych ławicach zbudowane, St. klim. zimowa, średnio ciepła, wilgotna, wolna od kurzu i wichrów, słoneczna. Średnia zimowa ciepłota o 1½ do 2° C. wyższa jak w Meranie lub w Montreux. Styczeń i luty są na pobyt najodpowiedniejsze. Ujemną stronę stanowi niedobra woda do picia; jesienią są tu dobre morskie kąpiele na Lido, pensjonat 7 do 10 frk. dziennie od osoby.

Weilbach Prusy (prow. Hessen-Nassau), 135 mtr. n. p. m. zimne wody alkaliczno siarczane, tudzież źródło sodowolitowy.

Westerland w północnym Szleswiku na wyspie Sylt. Kąpielisko morskie z najsilniejszemi falami, dobrze urządzone. Pensjonat (kompletny) od osoby tygodniowo 30 marek. Uczęszczanie do 8000 osób corocznie.

Wiesbaden Prusy, stolica ks. Nassauskiego, 117 mtr. n. p. m. cieplice solankowe 50—68° C. nie tylko na kąpiele ale i do picia zastosowane, 900 gabinetów łaziennych, zdrojowisko używane na stację klim. wiosenną, jesienną nawet i przez zimę, najliczniej uczęszczane niemieckie uzdrowisko, urządzenia kąpielne i na zimę, pensjonat od osoby miesięcznie od 100 mkk i wyżej, są tu i leczenia winogrodowe.

Wildbad król. Wirtembergskie, 400 mtr. n. p. m. obojętne cieplice, 33—37° C. używane na kąpiele i do picia, urządzenia balneotechniczne wyborne, pensjonat 10 do 15 marek dziennie od osoby. P. zdr. od 1. V do 1. X.

Wildungen ks. Waldeck, 228 mtr. n. p. m. szczawowy ziemno alkaliczny i źródło znakomity żelazisty. Eksport tutejszych wód mnogi. P. pobytu od 1. V do 1. X.

Wysowa Galicya (powiat Gorlice) 525 m. n. p. m. od r. 1882 zakład zdrojowo kąpielowy i żetyczny, szczawowy słono alkal. żelaziste, 6 głównych źródeł. Ł. Zakład. Dr. Jarosz. P. zdroj. od 1. VI do 1. X.

Zagwera Ces. rossyjskie gub. Tyfliska, źródł szczawy alkaliczno-żelazistej, składem chemicznym do źródła Kudowy zbliżony, wyłącznie na eksport służący z powodu trudnego dojazdu na miejsce.

Zakopane Galicya, wieś w Tatrach, 942 mtr. n. p. m. od stacyi k. ż. i transversalnej Chabówka o 43 kilom. odległe. Z inicyatywy i staraniem nieodżałowanej pamięci Dra Chałubińskiego St. leczniczo klimatyczna, klimat górski, korzystne na pobyt latem dla dotkniętych: maleryą, nieżytami oddechów, niedokrewnością, blednicą, neurastenią, tudzież dla ozdrowieńców po przebytych ciężkich chorobach. Są tu 2 Zakł. hydropatyczne: Dra Chramca i Dra Piaseckiego. L. Stacyi Dr Eliasza L. L. Buzdygan, Chramiec, Chwistek i Piasecki. Od r. 1892 jest tu „Dom zdrowia“ (własność i lekarskie kierownictwo Dra Chwistka) o 20 pokojach, latem i zimą otwarty, za kuracyę, stół i pomieszkanie z kompletną pościelą dziennie od Złr. 3 i wyżej. Obecnie Zakopane wchodzi w użycie i na pobyt zimowy dla chorych, tak zwanych piersiowych.

Zaizon Siedmiogród, 2 mile od Kronstadtu, 548 mtr. n. p. m. zdroje alkal. muryatyczno-jodowe.

Zoppot = Soboty Prusy, 12 kilom. od Gdańska, kąpielisko morskie od Polaków licznie uczęszczane. P. kąp. głównie od 15. VI do 30. IX.

Żegiestów Galicya (obwód sandecki), St. k. ż. transversalnej, wysokość n. p. m. ? szczawy alkal. ziemno-żelaziste, tudzież rzeczne kąpiele w Popradzie. L. Zakł. Dr. Hojnacki. P. zdr. od 15. V do 30. IX.

Żelenowodzk w Ces. rossyjsk. na Kaukazie, stannica kozacka 12 wiorst od Piatygorska a 18 wiorst od st. k. ż. Roztowowladykaukaskiej „Mineralnyja wody“, miejscowość leżąca 610 mtr. n. p. m. od niedawna zabudowywać się poczynająca. Źródeł mineralnych około 20 alkaliczno-żelazistych o ciepłocie 15° do 48° C. gmachów łaźiebnych 3, jest tu i kumysowy zakład. P. zdr. od 25. V do 15. IX.





NACZELNE WŁADZE SANITARNE.



Przy ministerstwie spraw wewn.

Dr Kusy Emanuel, c. k. Radea ministerjalny.

NAJWYŻSZA RADA ZDROWIA

(K. k. oberster Sanitätsrath).

na 3-lecie 1891—1894.

Przewodniczący:

Hofmann Edw., Rad. dw. Prof. Dr.

Zastępca przewodniczącego:

Vogl. August, r. d. Prof.

Członkowie zwyczajni:

Prof. Dr Albert Edw. r. d.
Prof. Dr Böhm Karol r. d.
Prof. Dr Braun Gustaw r. d.
Prof. Dr Drasche Antoni r. d.
Prof. Dr Gruber Maksymilian.
Prof. Dr Kratschmer Floryan,
l. szt.

Dr Kusy Eman. rad. min. j. w.
Prof. Dr Ludwig Ernest r. d.
Prof. Dr Polansky Stan.
Prof. Dr Weichselbaum Antoni.
Prof. Dr Widerhöfer Herman
r. d.
Dr Widersperg Gustaw.

Członkowie nadzwyczajni:

Prof. Dr Gruber Franciszek.
Dr Hellmann Alojzy (Aptekarz).
Prof. Dr Inama-Sternegg Karol,
sz. s.

Dr pr. Migerka Franc. r. m.
Plappart August r. m.
Dr Schlosser Teodor (Aptekarz).
Waldhaim Antoni (Aptekarz).

WŁADZE SANITARNE w GALICYI.

Departament sanitarny c. k. Namiestnictwa galic. we Lwowie.

Dr Merunowicz Józef, c. k. radca Namiestnictwa,
referent sanitarny krajowy.

Dr Lachowicz Zdzisław, c. k. lekarz powiatowy,
p. o. inspektora sanit.

Dr Barzycki Józef, c. k. insp. sanit., Radea cesarski.

Dr Broniowski Antoni, c. k. lek. pow.
 Dr Karpiński Stanisław, asyst. sanit.
 Harasymowicz Dyonizy, c. k. inspektor weterynaryjny.
 Timoftiewicz Ludwik, c. k. weteryn.
 Punicki Józef, c. k. Koncepista weteryn.

C. K. KRAJOWA RADA ZDROWIA.

Skład i zakres takowej, jako ciała obradującego i doradczego, oznaczony jest ustawą z dnia 30 Kwietnia 1870 r. dz. ust. p. Nr. 68 o organizacyi publicznej służby zdrowia.

Przewodniczący:

Czyżewicz Adam, Dr med. i mag. pol., c. k. prof. pol.
 i prym. szp. p. we Lwowie.

Zastępca przewodniczącego:

Opolski Wiktor, Dr med., prym. szp. p. we Lwowie.

Członkowie:

a) ze strony Rządu:

Dr Festenburg Edward.
 Dr Schramm Hilary.
 Prof. Dr Kadyi Henryk.
 Czyżewicz Adam j. w.
 Merunowicz Józef j. w.
 Widman Oskar, Dr med. i chir., prym. szp. p.
 Opolski Wiktor j. w.

b) ze strony Wydziału krajowego:

Merczyński Emil, Dr med.
 Ziembicki Grzegorz, Dr med., oper. szp. p.

c) Delegaci Izby lekarskich:

Prof. Dr Jakubowski Maciej z Krakowa,
 Dr Eckhardt Józef z Tarnopola (Iz. lw.).

Zastępcy:

Dr Plech Aureli z Jarosławia.
 Dr Wysocki Aleksander ze Złoczowa.



IZBY LEKARSKIE

z wyborów w dniu 30 Czerwca 1893 roku.

IZBA LEKARSKA w KRAKOWIE

ukonstytuowana w dniu 25 Lipca 1893 r.

Prezes:

Prof. Dr Maciej Leon Jakubowski z Krakowa.

Wiceprezes:

Dr Aureli Plech z Jarosławia.

Członkowie Wydziału:

Prof. Dr Henryk Jordan.

Prof. Dr Józef Łazarski.

Dr Stanisław Paszkowski.

Delegat do krajowej Rady zdrowia:

Prof. Dr M. L. Jakubowski.

Zastępca:

Dr Aureli Plech.

Członkowie Izby:

Dr Jan Gawlik ze Suchy.

Dr Stan. Jabłoński z Rzeszowa.

Dr Józef Skakalski z Podgórze.

Dr Jan Wain z Krosna.

Dr Józef Waleczyński z Tarnowa.

Zastępcy:

Dr Maksym. Kohn z Krakowa

Dr Aug. Kwaśnicki „

Prof. Dr Przem. Pieniążek „

Doc Dr Aleks. Zarewicz „

Dr Władysław Gedl z Wadowic.

Dr Winc. Świętek z Podgórze.

Dr Eugen. Neumann z Gorlic.

Dr Lud. Cwiklicer z Dobromila.

Dr Szymon Bernadzikowski

z Brzeska.

Dr F. Sędzielowski z Sędziszowa.

Dr Adolf Ditzius z Jarosławia.

Do Izby lekarskiej krakowskiej należą następujące powiaty: Bialski (1), Bocheński (3), Brzeski (7), Brzozowski (8), Chrzanowski (11), Dąbrowski (14), Dobromilski (15), Gorlicki (18), Grybowski (20), Jarosławski (23), Jasielski (24), Kolbuszowski (28), Krakowski (31), Krośnieński (32), Łańcucki (33), Limanowski (34), Liski (35), Mielecki (37), Myślenicki (39), Niski (41), Nowosądecki (42), Nowotarski (43), Pilzneński (44), Ropczycki (50), Rzeszowski (52), Sanocki (54), Tarnobrzski (61), Tarnowski (63), Wadowicki (67), Wielicki (68), Żywiecki (74).

IZBA LEKARSKA we LWOWIE

ukonstytuowana w dniu 24 Lipca 1893 r.

Prezes:

Dr Józef Różański ze Lwowa.

Wiceprezes:

Dr Leon Ziemiański z Przemyśla.

Członkowie Wydziału:

Dr Edward Gerárd Festenburg ze Lwowa.

Dr Hilary Schramm ze Lwowa.

Dr Bylicki Władysław ze Lwowa.

Delegat do krajowej Rady zdrowia:

Dr Józef Eckhardt z Tarnopola.

Zastępca:

Dr Aleksander Wysocki ze Złoczowa.

Członkowie Izby:

Prof. Dr A. Czyżewicz ze Lwowa.	Dr Apolinary Lachawiec ze Stanisławowa.
Dr Karol Muszkiet z Żółkwi.	Dr Lud. Lutyński z Jagielnicy.
Dr Alfred Biegelmajer ze Sambora.	Dr Gabryel Sysak z Kołomyi.

Zastępcy:

Dr Grzeg. Ziembicki ze Lwowa.	Dr Feliks Kretschmer z Drohomyża.
Dr Henryk Kadyi "	Dr Wiktor Lachowski z Drohomycza.
Dr Emil Merczyński "	Dr Mik. Podlusiński z Bolechowa.
Dr Wilhelm Pisek "	Dr Edw. Körner z Monasterzysk.
Dr Baz. Kiebusiński z Przemyśla.	Dr Kazim. Zgórski ze Lwowa.
Dr Miron Jajus ze Sokala.	
Dr Stanisław Sołtysik z Brodów.	

Do Izby lekarskiej lwowskiej należą następujące powiaty:

Bobrecki (2), Bohorodeczański (4), Borszczowski (5), Brodzki (6), Brzeżański (8), Buczański (10), Cieszanowski (12), Czortkowski (13), Doliniański (16), Drohobycki (17), Grodecki (19), Horodeński (21), Husiatyński (22), Jaworowski (25), Kałuski (26), Kamionecki (27), Kołomyjski (29), Kosowski (30), Lwowski (36), Mościcki (38), Nadworniański (40), Podhajecki (45), Przemyński (46), Przemyślański (47), Rawski (48), Rohatyński (49), Rudecki (51), Samborski (53), Skalański (55), Sniatyński (56), Sokalski (57), Stanisławowski (58), Staromiejski (59), Stryjski (60), Tarnopolski (62), Tłumacki (64), Trembowelski (65), Turczański (66), Zaleszczycki (69), Zbarazki (70), Złoczowski (71), Żółkiewski (72), Żydaczowski (73).

SŁUŻBA ZDROWIA w GALICYI.

Kraków.

Dr Ackermann Adam, Szpital
św. Łazarza.
Agatstein Józef, Zwierzyniec-
ka 23.
Aronsohn Jul., Dietla 66.
Bandrowski Jul., Rynek Nr 7
(dent.).
Baurowicz Al., Lubicz 19.
Bednarski Adam, Szp. św. Łaz.
Bielański G., Dolnych młyn. 3.
Biesiadzki Antoni, Dietla 91.
Blatteis Jakób, Radziwiłowska
15; w lecie w Krynicy.
Bobbiewicz Henryk, Mały Ry-
nek 3 (3—4).
Bohosiewicz Teod., Klin. chir.
Borzęcki Eug., Floryańska 37.
Bossowski Aleksander, Flory-
ańska 35 (3—4).
Braun Stan., Dietla 95. Tel. 221.
Browicz Tadeusz, Krupnicza
5 (3—4).
Brudzewski Kar, Klinika okul.
Budzynowski W., Szpital św.
Łazarza.
Bujwid Odo, Studencka 11.
Buszek Jan, Fizyk miasta, Ry-
nek A—B 39 (2—4). Tel. 168.
Buzdygan Mikołaj, Bracka 8
(3—4).
Cercha Maks., Sławkowska 4.
Cholewicz Franciszek, ś. Jana
4 (3—4).
Ciechanowski St., Starowiśł. 23.
Cieszewski Wł., Smoleńsk 11.
Cybulski Napoleon, Szczepań-
ska 11.
Czerny Edw., Karmelicka 33.
Domański Stanisław, Szcze-
pańska 9 (3—4). Tel. 108.

Dr Drobner Jak., Stradom 25
(1—3).
Drożdż Bolesław, ul. św. Jana
11 (2—4).
Dwernicki Stan. Szp. św. Łaz.
Eichhorn Ferdynand, Dietla
47. Tel. 120.
Eliasiewicz Z. Grzegórzec. 14.
Filimowski Antoni, Grodzka
39 (2—4). Tel. 93.
Filipkiewicz Stef., Kolej. 18.
Fränkiel Henryk, Grodzka 32.
Gabryszewski Antoni, Basz-
towa 4.
Gałuszka Józef, Łobzowska 25.
Gertler Norbert, Gertrudy 18.
Gluziński Wład. Antoni, Fran-
ciszkańska 1 (3—5). Tel. 123.
Górski Ks., Kanonicza 11.
Grażyński Edward, Radziwił-
łowska 17.
Gwiazdomorski J, Łobzowska
32 (Dom zdrowia). Tel. 67.
Haim Leopold, Długa 15.
Halban Leon, Łobzowska 10.
Harajewicz Jan, Podwale 14.
Harajewicz Władysław, Pod-
wale 14 (2—4).
Hirsch Dawid, Długa 10.
Hirsch Herman, Jasna 4.
Höflich Jan, Batorego 21.
Hojnacki Władysł., ul. Szew-
ska 25.
Jabłoński A., Batorego 10.
Jakubowski Maciej Leon, Pod-
wale 10 (3—4).
Janikiewicz St., Kl. ch. wewn.
Jarosz Wład., Batorego 1.
Jastrzębski Aleksander, Staro-
wiślna 14.
Jaworski Walery, Kopernika
2 (3—4).

Dr Jeż Walenty, (2—4), Klinika wewnętrzną.
 Jordan Henryk, Wiślna 5 (3—4). Tel. 210.
 Junger Jak., Krakowsk. 3 (2—4)
 Jurowicz Izidor, Stradom 17.
 Kaczyński St., Kopernika 12.
 Kaden Kaz., Kolej. 1 (3—4).
 Kaufmann Mich., Grodzka 32.
 Kaufmann Oskar, Dietla 73.
 Kędzior Wawrz., Klin. wewn.
 Kirschner Aron, Dietla 55.
 Kniaziolucki J., Łaziebną 3.
 Kohn Maksymil., Piarska 9 (3—4). Tel. 171.
 Kopff Leon, Szczepańs. 1 (3—4); w lecie w Krynicy.
 Korczyński Edward, ś. Krzyża 5 (3—5).
 Korczyński Ludomił, Mikołaj-ska 28.
 Kosiński Leopold, Krzyża 7.
 Kościński Franciszek, Szpi-tal ś. Łazarza (3—4).
 Kostanecki K., Batorego 16.
 Koy Stan., Floryańs. 3 (3—4). Tel. 218.
 Kozłowski Bron., Kl. chirurg.
 Kozłowski Sykst., Biskupia 14.
 Kramarzyński Karol, Pijarska 5 (3—4).
 Krasowski Stan., Klin. Chir.
 Królikowski Jan, Grzegórzeck.
 Krongold Wilh., Dietla 49.
 Kruszyński Kazim., św. Jana.
 Kryński Leon, Klinika chirurg.
 Tel. 29.
 Krzyształowicz Franc., Flory-
 ańska 29.
 Kurzyniec Wojciech, Szpital
 św. Łazarza.
 Kwaizer Władysław, Pędzi-
 chowska 10.
 Kwaśnicki August, Basztowa
 4 (3—4).
 Lang Otokar, Niecała 9.
 Langie Adam, Sławkowska 20
 (3—4).
 Lerner Szymon, Stradom 23.
 Lustgarten Lud., Grodzka 60.
 Lustig Samuel, Krakowska 35.
 Lux Waler., Kl. ch. wewn.

Dr Łazarski Józ., Starowiślna 8.
 Łepkowski Wincenty, Stra-
 szewskiego 27 (dentysta).
 Łopaciński Mich., Mikołajsk. 2.
 Majer Józef, Krupnicza 9.
 Majewski Tadeusz, Szpital ś.
 Łazarza.
 Małaczyński Roman, Szpital
 św. Łazarza.
 Marcisiewicz Feliks, Wiślna
 10 (3—5).
 Marowski Miecz. Szp. św. Łaz.
 Mars Ant., Szpitalna 19 (2—4).
 Tel. 35.
 Maczka Tomasz, Floryańska
 31 (2—4).
 Mendelsburg H., Wolska 17.
 Mikucki Wład., Pańska 6.
 Milewski Tad., Krzyża 7.
 Momiłowski Stanisław, Sław-
 kowska 12 (3—4).
 Münz Emil, Sebastyana 4.
 Murdzieński Franciszek, Flo-
 ryańska 53 (3—4). Tel. 102.
 Nowak Jul., Jabłonowskich 12.
 Nowak Wład., Szp. ś. Łazarza.
 Nowak Zygm., Starowiślna 19.
 Obaliński Alfred, Kolejowa
 7 (3—4). Tel. 55.
 Oettinger Józef, Rynek głó-
 wny 10 (3—5).
 Olszewski Bronisław, Szpital-
 na 20 (3—4).
 Pareński Stanisław, ś. Jana
 1 (3—5). Tel. 208.
 Paszkowski Stanisław, ś. An-
 ny 7 (3—4). Tel. 132.
 Piątkowski M., Szewska 15.
 Piętażek Przemysław, Bracka
 10 (3—5). Tel. 164.
 Piotrowski Juliusz, Batorego 4.
 Piotrowski Edw., Kolejowa 15.
 Ponikło Stan., dyr. Szp. św.
 Łaz. Bracka 5 (3—4). Tel. 192.
 Przybylski W., Krupnicza 19.
 Raczyński Jan, Szpital św.
 Ludwika (3—4). Tel. 170.
 Radecki Paweł, Mikołajska 8.
 Reiss Władysław, Szpital św.
 Łazarza.
 Rencki Rom., Starowiślna 27.
 Riedmüller Bol., Rynek 23.

Dr Rościszewski Erazm, Basztowa 26.
 Rosenblatt Emanuel, Basztowa 25 (3—4).
 Rosner Aleksander, Klinika położnicza. Tel. 27.
 Rosner Antoni, Rynek 22 (3—5). Tel. 82.
 Różecki Józef, Floryańska 24 (3—4).
 Ruff S., Dietla 58.
 Rutkowski Maks., Szpital św. Łazarza.
 Rydygier Ludwik, Wielopole 4 (3—4).
 Satkowski Zyg., Słowiańska 2.
 Schaitter Ign., Grodz. 62 (2—3). Tel. 87.
 Schoengut Stefan, Wiślna 10.
 Schuman Franciszek, Szpital św. Łazarza.
 Schneider Ludwik, Basztowa 18 (3—4).
 Schwarz Albin, Sławkowska 8 (3—5) l. p.
 Sciborowski Wład., Łazienna 3 (3—4); w lecie w Szczawnicy.
 Seifmann P.
 Siedlecki J., Rynek 45. Tel. 207.
 Sieradzki Włodzimierz, Szpital św. Łazarza.
 Simon Fryderyk, Kolejowa 15.
 Skobel Stanisław, Rynek gł. 23 (3—5).
 Skórczewski Bol., Batorego 24, w lecie w Krynicy.
 Skrzyński Stef., św. Marka 7.
 Sliwiński Michał, Mały Rynek 4 (3—4).
 Słapa Wilh., Kolejowa 4.
 Smolarski Władysław, Szpital św. Łazarza.
 Sokołowski Henr., Szewska 11 (2—4).
 Sołtysik Mieczysław Dietla 5.
 Spira Rafał, Dietla 52.
 Sroczyński Franciszek, Floryańska 9 (3—4).
 Stahr Eliasz, Szp. św. Łazarza
 Staniszewski Jp., Blich. 26.
 Steinberg Bernhard, Szpital św. Łazarza.

Dr Stopczński Aleksander, Kopernika 12, zakład chem.
 Surzycki Józef, Floryańska 13 (3—4). Telef. 156.
 Süsskind Albert, Stradom 18 (3—5).
 Switalski Ludwik, Sławkowska 27 (3—4).
 Szewczyk Józef, Franciszkańska 1.
 Szymkiewicz Kazim., Rynek gł. 26 (dentysta).
 Szymonowicz Wł. Łobzows. 10.
 Teichmann Ludwik, Floryańska 53.
 Tislowitz Paw., Krakows. 39.
 Tokarski St., Dietla 103.
 Torczyński Teofil, Szpital św. Łazarza.
 Trzeński Bogusł., Pijarska 2.
 Trzebiński Rudolf, Podwale 12 (3—4). Telef. 81.
 Tuszyński Ferdynand, Sławkowska 20.
 Wachtel Zygmunt, Grodzka 32.
 Walentowicz Andrzej, Poselska 7.
 Wernicki J., Rynek gł. 29.
 Wilkosz Aleksander, Mały Rynek 4 (3—4). Telef. 217.
 Wiszniewski Ludw., Szlak 40 (3—4). Telef. 211.
 Woszczyński Julian, Stolarska 13.
 Zanietowski Józ., Batorego 1.
 Zarewicz Aleksander, Floryańska 40 (2—4).
 Zeitner J., Mostowa 2 (2—5).
 Zieleniewski Michał, Szpitalna 32.
 Zoll Józef, Kolejowa 7.
 Żuławski Karol, Długa 82. Telef. 159.
 Żydłowicz Wład., Pijarska 3.

Dentyści:

Dr Lepkowski Wincenty, dentysta, Straszewskiego 27.
 Dr Szymkiewicz Kazimierz, Rynek gł. 26.
 Dr Łukaszewicz Karol, Sławkowska 16.

Drd Hrebenda Władysław, Szpitalna 17.
 Matuszewski Henryk, plac Dominikański 3.
 Dłużyński Jan, Floryańska 12.

Lwów.

Dr Arnold Winc., Szpital ś. Zofii.
 Aschkenazy Zygmunt, Chorażczyzna 13.
 Auerbach Emanuel, Skarbk. 2.
 Bałaban Teodor, Wałowa 7.
 Barański Antoni, prof. szkoły wet. Chorażczyzna 24.
 Barański Bogdan, ul. Łyczakowska.
 Barącz Roman, Teatralna 11.
 Beck Adolf.
 Berezowski Kazimierz, prym. w zakł. w. Brajer 6.
 Berger Henryk, Halicka 20.
 Berthlef Karol, pl. ś. Ducha 3.
 Bett Maks., Skarbkowska 3.
 Bienkowski Bogumił, dent., ul. Kościuszki 8.
 Bikeles Guttman, Halicka 10.
 Błotnicki Teod., pl. Smolki 3.
 Bodek Izidor, Jagiellońska 6.
 Bogdański Wład., Blachars. 1.
 Bylicki Wład., Kościuszki 7.
 Chądzyński Jan, e. pr. sz. p. Kopernika 3.
 Chomin Ant., Zimorowicza 3.
 Ciszka Edmund, Szpital p.
 Czarnik St., Łyczakowska 46.
 Czyżewicz Ad., prof. sz. r. z. Cłowa 2.
 Debiecki Kl., Piekarska 8.
 Dekański Stan., Dworzec kol.
 Dobiński Włodz., Puławs. 1.
 Dubanowicz Paweł, Ormiańska 33.
 Durst Adolf, Kaźmierz. 23.
 Ehrlich Dawid, Grodecka 58.
 Fechter Tadeusz, Szpital p.
 Elektorowicz Emil, l. m. Łyczakowska 6.
 Feiersztejn Izidor, Bator. 30.
 Feld Maurycy, Kotlarska 7.
 Festenburg Edward, Dominińska 11.
 Fiałkowski Lud., Syxstuska 1

Dr Fibich Stanisław, Szpital p.
 Frankowski Walery, Krakows.
 Frenkl, Szpital p.
 Fuchs Franc., dentysta, plac Maryacki 9.
 Fuchs Leon, Jagiellońska 18.
 Gaik Jan, Grodecka 40.
 Głuchowski Franciszek.
 Gluziński Lesław, Wałowa 14.
 Głowacki Bol., dyr. sz. p., Batorego 24.
 Gołębiowski Karol, Szpital p.
 Goński Andrzej, dentysta, Kopernika 4.
 Górnisiewicz A.
 Gostyński Józef, lekarz sądowy ul. Kościuszki 2.
 Gross Karol, ul. Boimów 9.
 Gwozdecki Teofil, Szpital p.
 Hellmann, ul. Jagiellońska 16.
 Henzel St., Brajerowska 16.
 Hoszard Franc., czł. W. kraj. Ossolińskich 4.
 Jana Stan., Czarnieckiego 8.
 Janda Franc., Pańska 21.
 Jasiński Wł., e. k. radca rz. l. z. kar. Kurkowa 3.
 Kaczorowski Bron., Sykstuska.
 Kadyj Henryk, ul. Zielona 15.
 Kicki Tytus, Kopernika 3.
 Kobyłański Ant., Strzelecka 2.
 Korman J., Karola Ludwika 21.
 Kosiński Franc., em. fiz. m. ul. Skarbkowska 37.
 Kossak Leon, Wałowa 29.
 Kowalski Edmund, Podzmeze.
 Kowalski Michał, Czarnieck. 1.
 Kowalewski Edmund, Szp. p.
 Krobicki Tadeusz, l. m. Skarbkowska 2.
 Krokiewicz Ant., Kopernika 8.
 Kropf Henryk, Szpital p.
 Krygowski Tadeusz, ulica 3ci Maja 10.
 Kucharski Piotr, sek. szpitala dziec. Akademicka 22.
 Kunzek Henryk, Szpital p.
 Kwiatkiewicz Stan., Pańska 6.
 Lachowicz Zdzisław, pl. Hallicki 14.
 Landau Fryderyk, Karola Ludwika 37.

- Dr Lateiner Em., Kopernika 9.
 Legeżyński Wiktor, Akademicka 22.
 Leńko Zenon, Szpital p.
 Liekendorf Ignacy, Plac Kapitulna 3.
 Lukas Ad., I. sąd. Blachar. 8.
 Łopacki Ludw., I. m. Chorażczyzna 13.
 Madejski Bolesław, Akademicka 10.
 Machek Em., Wałowa 4.
 Mahl Jakób, Jagiell. 24.
 Majewski Ad., I. z, hydr. Łyczakowska 43.
 Margulies Maks, Gródecka 3.
 Markiewicz D., Szpital pow.
 Mehrer Henr., Jagiell. 13.
 Merczyński Em., pr. s. d. Osolińskich 10.
 Merunowicz Józef, c. k. Protomedyk, Zamoyckiego 18.
 Mosing Kaz., Wałowa 13.
 Mrazek Bronisław, Szpital p.
 Mukowicz Edward, Kazimierzowska 24.
 Niemczynowski Tad., Szp. p.
 Obtułowicz Ferdynand, Plac Smolki 5.
 Opolski Wiktor, pr. szp. p. rad. zdr. Wałowa 13.
 Padalewski A., Akademicka 3.
 Pajęczkowski Włodzimierz Pl. Akadem. 2.
 Papée Jan, Rynek 10.
 Pawlikowski Ant., fiz. m. Chorażczyzna 2.
 Piotrowski Gustaw, Akademicka 5.
 Pisek Wilh., Jagiell. 12.
 Pivel Edward, Żulińskiego 12.
 Piżł Bronisław, Mikołaja 20.
 Podlewski K., Chorażcz. 16.
 Porycki Bronisław, Szpital p.
 Prebendowski Stanisław, Wałowa 3.
 Prus Jan, Kościuszki 7.
 Rapaport Józef, Grodecka 10.
 Rapp Leon, Wałowa 11.
 Reinhold Zygmunt, Jagiellońska 2.
 Reinhold Jon., Kopernika 5.
- Dr Reitzes D., Skarbkowska 27.
 Roicki Ant., Sokoła 1.
 Rosenzweig Leo, Sykstuska 6.
 Rosner Jan, Cłowa 2, w lecie Francensbad. (Steinhaus).
 Rosner Ig., I. m., Sykstuska 14.
 Rożański Józef, prym. szp. Kraszewskiego 11.
 Rubinstein Norbert, Łyczakowska.
 Sawicki Edward, prym. szp. Batorego 32.
 Schmelkes Maksymilian, Janowska 50.
 Schmidt Edm., I. m., Akademicka 11.
 Schney Jakób, Żółkiewska 69.
 Schramm Hilary, Sykstuska 22.
 Selzer Józef, Sykstuska 4.
 Serbeński Waleryan, Batorego 30.
 Sielski Szczes., Akademicka 8.
 Sieradzki Ant., Chorażczyzny 14 B.
 Silberstein Samuel, Sykstuska 34.
 Singer Menele, Kotlarska 1.
 Skalkowski Bronisław, Kościuszki.
 Smitowski Miecz., Sobieskiego 7.
 Smutny K., Chorażczyzna 14.
 Sochanik Stanisław, pl. Bernardyński 15.
 Sochański J., Pańska 2.
 Stachiewicz Teofil, Plac Maryacki 8.
 Stangenhaus Aleks., Szpital p.
 Stankiewicz Ferd., Pańska 27.
 Stark J., Pl. Gołuchowsk. 3.
 Stauber Salom., Żółkiewska 2.
 Steinhaus Józef, em. lek. pow., Sykstuska 21.
 Stella-Sawicki Jan, ins. szp. Kurnicka 13.
 Strojnowski Edw., Plac Maryacki 6 i 7.
 Świątkiewicz Mich., Grodzickich 1, pr. Szp.
 Szuszkiewicz Piotr, lek. polic. Kopernika 19.
 Szpilman Józef, doc. szk. wet

Dr Sztembarth Celestyn, sek. szp.
Batorego 26.
Szulistawski Ad., Kilińskiego 2.
Szydłowski Zdzisław, Sykstuska 22.
Taschmann Albert, Kornia-
tów 1.
Tatareczuch Władysław, 1. m.
Kołatąja 6.
Trzcieńiecki Kazimierz, Ko-
pernika 14.
Tyszecki T.
Tyszkowski Leon, Teatralna.
Uhma Czesław, Lindego 7.
Ustrzycki Julian, Halicka 10.
Wachholz Leon, Batorego 9.
Wachtel An., Czarnieckiego 4.
Wagner Arnold, Ossolińsk. 6.
Wallach Don, Kar. Ludw. 35.
Węchowski Tadeusz, Garn-
carska 16.
Weiss Lud., Kamińskiego 6.
Wolisch Alfred, Kościuszki.
Wechsler Emil, Wałowa 23.
Wehr Wiktor, 3-go Maja.
Weigel Józef, Akademicka 20.
Weiss Adolf, Akademicka 3,
(dentysta).
Wieżkowski Józef, chem. szp.
p., Skarbkowska 4.
Widman Oskar, pr. szp., Gro-
dzickich 2.
Wiktor Jan, 1. m., plac Strze-
lecki 2.
Willer Abr., pl. Gołuch. 3.
Zakreys Franc., Grodecka 50 B.
Zavadił Teofil, Wałowa 31.
Ziembicki Grzegorz, pr. szp.
3 Maja 5.
Zion Oswald, Kołatąja 3.
Zgórski Kazim., L. Sapiehy 27.
C. Beschloss Manisch v. Maksym.
Żółkiewska 29.
Chilf Sam., Sobieski 13.
Gabel Hil., Sobieskiego 26.
Gallasch Józef, Janowska 32.
Grabscheid Max, pl. Krakow-
ski 10.
Krainer Eman., pl. Krakow. 7.
Kurzer Lazar, pl. Krakow. 12.
Lateiner Jak., Żółkiewska 65.
Latainer Leon, Karol. Ludw. 31.

C. Letz Samuel, pl. Gołuchow-
skich 15.
Iisowski Maryan, dentysta pl.
Trybunalski 1.
Madeyski Edward, ortoped. pl.
Smolki 5.
Mark Sal., pl. Maryacki 8.
Rosenkranz Maur., Batorego 6.
Urich Sal., Pańska 27.
Weiss Ign., Akademicka 3.
Zawirski Konst., Batorego 14.
Zrogowski Jan, Batorego 6.
W. Barański Ant., Prof. Dr.
Bloch Anton.
Kadyi Henryk, Prof. Dr.
Kałkowski Józef.
Kubicki Leon, w. m. Bat. 7.
Kretowicz Paweł, n. szk. w.
Kulczycki Włodzim.
Królikowski Stanisław.
Langhaus Józef.
Markowski Tomasz.
Nowicki Józef.
W. Punicki Franciszek.
Prus Jan Dr.
Seifman Piotr, Dyr. sz. w.
Szpilman Joz. Dr. Prof.

1. Pow. Bialski.

D. Nycz Wincenty, Biała 1. p.
Bogdanik Józ., Biała pr. szp.
Kapelusz Eug., Biała 1. szp.
Kwieciński Maciej, Biała.
Hess Ernest, Biała.
Steuer Alfred, Biała.
Długolecki Ferd., Kęty 1. m.
Dworzański Karol „
Garbusiński Sabin, Kęty.
Łucki Sas Julian, Oświęcim.
Schlank Maurycy „ 1. m.
Słosarczyk Antoni, „
Wechsler Leopold, „
Keller Rajmund, Wilamowice.
Bednarski Józef, Bobrek.
C. Spelda Aleksander, Biała.
W. Krwawicz B., Dr. Biała w. p.
Orzechowski M., Oświęcim.

2. Pow. Bobrecki.

D. Dorożyński Jakób, Bóbrka.
1. p.
Bober Jan, Chodorów.

D. Gabryszewski Tad., Bóbrka.
Jalikowski Maryan, Strzeliska
nowe.

C. Sochacki Fel., Chodorów l. k.
Handt Izydor „ l. m.
Roth Wolf, Bóbrka.
Sternberg Bern., Strzeliska.
W. Łucki Joz., Bóbrka w. p.

3. Pow. Bocheński.

D. Dembowski Mieczysław, l. p.
Bochnia.
Fränkel Józef Bochnia.
Gasiorek Franciszek, Bochnia.
Górski Czesław, „ l. sal.
Nodzyński Bolesł., „ Sek. S.
Oświęcimski Sz., „ pr. sz.
Roth Alojzy
Rutowski Klemens, Łakta.

D. Piórko Ad., Niepołomice.
Dobrurowski Adam, Wiśnicz
l. domu karn.

C. Wieselmann Mor., Wiśnicz l. m.
Kohn F.

W. Fertig Zygm., Bochnia w. p.

4. Pow. Bohorodczański.

D. Bory Julian, as. sanitarny.
Ferensiewicz M., Bohorodczan.
Urich Teofil, l. o. Bohorodcz.
Beigel Abraham, Słotwina.
W. Misiura Jędrzej, w. p.

5. Pow. Borszczowski.

D. Tarnawski Apolinary, Borszczów, l. p.
Jarosiewicz Roman, Borszczów
Mosler Maks., Borszczów.
Feuerstein Lejz., Korolówka
Altmann Zygm., Jezierzany.
Kraus Adam, Mielnica.
Szajnowski Maryan, Skała.
Seidner Abraham, Skała.
C. Pöller Herman, Skała.
Mintzeles Lejs., Ujście biskup.
W. Rohr H., Borszczów w. p.

6. Pow. Brodzki.

D. Sobolewski Franc., Brody l. p.
Aufrecht Ozyasz, Brody.
Borzemski Antoni, Łukawiec,
p. Brody.

D. Kalach Feliks, Brody.
Leiblinger Fel., Brody, l. m.
Schapira Afeks., Brody l. sz.
Soltysik Stan., „ pr. sz.
Strumiński Adam, „
Madejski Wł., Pieniaki l. s.
Czerski Teofil, Toporów.
Landesberg Mojżesz, Założce.

C. Grünfeld Iz., Brody l. m.
Metanowski Dawid, Toporów.
Nussbaum Melchior, Podka-
mien l. m.

Rager Izydor, Założce.
Rosenbaum Leon, Łopatyn l. m.
W. Harasymowicz Dyon., w. p

7. Pow. Brzeski.

D. Pietrzycki Ant., Brzesko l. p.
Bernacki Franc., „
Bernadzikowski Sz., „
Michalik Kazimierz, Radłów.
Jarosz St., Szczurowa.
Łowczowski Wiktor, Wojnicz
l. m.

Kisielewski Józef, Zaklicz. l. m.
D. Kluczyński Zbig., Zaklicz.
C. Czernek Henr., Wojn. l. m.
W. Kisiel Daniel, w. p.

8. Pow. Brzeżański.

D. Skibicki Adam, lek. pow.
Teitelbaum Melech, Brzeżany.
Falk Bär, Brzeżany.
Uranowicz Tadeusz, l. m. „
Zauderer Albert, pr. szp. „
Barban Chaim, Kozowa.
C. Schenker E., Brzeż. sek. szp.
Łucyk Jakób, Kozłów.
W. Sigal H., w. p.

9. Pow. Brzozowski.

D. Lic Henr., Brzozów l. p.
Niziołek Paweł, Brzozów.
Sawicki Antoni, Dynów.
Meth Sz., Dynów.

10. Pow. Buczański.

D. Hirschler Miecz., Buczacz l. p.
Kroo Józef, „
Krzyżanowski Edw., „ l. m.
Nacht Fabiusz, „
Sokal Majer, Jazłowiec.

- D. Koerner Ed., Monasterzyska.
 Neuman Sal., Monasterzyska.
 Bobek Jan, Potok Złoty.
 C. Mosler Mojżesz, Buczacz.
 Feder Jak., Jazłowiec l. m.
 Adler Szymon, Monaster. l. m.
 W. Majkowski B., Buczacz w. p.

11. Pow. Chrzanowski.

- D. Berggrün Alfr., Chrzanów l. p.
 Hochbaum Oskar, „
 Klein Leon, „ l. m.
 Rieser Adolf, „
 Damski W., Jaworzno l. gór.
 Dura Józef, Krzeszowice l. s.
 Schneck Karol, Szczak. l. f.
 Steinkeller Hen., Trzebin. l. m.
 Medwey Aleks., Siersea.
 W. Ochnicz Michał, Chrzan. w. p.

12. Pow. Cieszanowski.

- D. Peters Józef, Cieszan. l. p.
 Jüngst Wacław, Narol l. o.
 Rosenblüth Ef., Lubaczów l. m.
 Szymański Henryk, Lubaczów
 Müldner Józef, Oleszyce.
 C. Rotter As., Cieszanów l. m.
 W. Serwacki Michał w. p.

13. Pow. Czortkowski.

- D. Wągrowski K., Czortków l. p.
 Bryliński Józef, Czortków.
 Bubeniczek Franc., em. lek.
 pułk. Czortków.
 Stoeckl Adolf, Czortków l. m.
 Lutyński L., Jagielnica l. fabr.
 Rosenzweig Lejzor, Jagielnica.
 C. Oestersetzer Ad., Czortków.
 W. Machalski, Czortków w. p.

14. Pow. Dąbrowski.

- D. Kramarzyński Mieczysław, Dąbrowa l. p.
 Millet Abraham, Dąbrowa.
 Ozimek Stanisław, „
 Zaręba Ant., l. m. sąd.
 Rudnicki Karol, Szczecin l. m.
 Przybyszowski W., Żabno.
 C. Kluczycki Wit., Mędrzechów
 W. Szczerba Jan, Dąbrowa w. p.

15. Pow. Dobromilski.

- D. Bińczewski Aleks., Dobromil l. p.
 Cwiklicer Ludw., Dobr. l. m. sa.
 Puchalski Szczepan, Dobromil.
 Marynowski Józef, Bircza.
 C. Brauner Leon, Dobrom.
 W. Dötsch Fr., w. p.

16. Pow. Doliniński.

- D. Borysiewicz Wikt., as. sanit.
 Kotłowski Stan., Dolina l. m.
 Wolfram Wilhelm, Dolina.
 Nowak Józef, Wygoda l. f.
 Podłuski Mikołaj, Bolechów
 l. m. i kol.
 C. Kujłowski Leon, Bolechów
 l. sal.
 Baumöhl Naf., Dolina.
 W. Fedorowicz Włó. w. p.

17. Pow. Drohobycki.

- D. Janowski Ignacy, Drohobycz
 l. p.
 Antoniewicz Włodzimierz,
 Drohobycz l. m.
 Feuerstein H., Drohobycz.
 Pelczar Zenon, Drohobycz.
 Tiegermann Em., Drohobycz.
 Friedmann Henr., Drohobycz.
 Wilder Izidor, „
 Lechowski Wik. „
 Bermann Dawid, Borysław.
 Löw Bernh., Borysław l. gór.
 Tenner Ignacy, Schodnica.
 C. Reich Baruch, Drohobycz l. m.
 Rosenöhl Joach. „ l. kol.
 Kelhofer Sam., Borysł. l. m.
 W. Gottlieb Aleksander, Drohobycz w. p.
 Chotiner Eleazar, Borysł. w. g.

18. Pow. Gorlicki.

- D. Frydman Z. Gorlice l. p.
 Bielewicz Feliks, „ l. m.
 Frühling Marc., „
 Grzybezyk Stan. „
 Kretowicz Walenty „
 Neumann Eugen. „
 Przesmycki Jan „

D. Wroński B., em. l. p.
 Katiński Ludwik, Biecz l. m.
 C. Koller Jerzy, Gorlice l. m.
 W. Janowicz St. w. p.

19. Pow. Grodecki.

D. Danielski Jan, Gródek l. p.
 Gawroński Aleksan., Gródek
 l. m. i kol.
 Mayer Józef, Gródek.
 C. Landau Ad., Gródek.
 Schöps Ignacy, Janów.
 Udziela Maryan, Janów l. okr.
 W. Ponicki Franc., Gródek w. p.

20. Pow. Grybowski.

D. Jendel Sausenhofen Ignacy,
 Grybów l. p.
 Déhm Rachmiel, Grybów.
 Jakubowski Adam, Grybów
 l. m.
 Orzechowski Józ., Ryglie l. m.
 Mikołajski Szczepan, Ciężko-
 wice l. m. i kol.
 W. Hirsch Herm., w. p.

21. Pow. Horodeński.

D. Schmidt Fil., Horodenka l. p.
 Palesten Henr., " l. m.
 Kanafass Ozyasz, Horodenka.
 Roszko Antoni, Horod. l. sz.
 Bujalski Maryan, Obertyn.
 C. Burnatowicz Rom., Obertyn
 l. m.
 W. Skuciński Jan w. p.

22. Pow. Husiatyński.

D. Pohorecki Władysław, Hu-
 siatyn l. p.
 Korolik Tomasz, Husiatyn.
 Auerhahn Wilh. Chorostków.
 Zrogowski Bronisław, Husiatyn.
 Sokal Józef, Kopeczyńce.
 Wilson Rysz., Kopeczyńce.
 C. Hladij Sz., Chorostk. l. m.
 Margules Elias, Husiatyn.
 Pomeranz Filip " "
 Rares Izidor, Husiatyn l. m.
 Siebner Nath., Kopyczyńce
 l. m.
 Sobelsohn Daw., Probużna l. m.
 W. Gródecki Miecz., Husiat. w. p.

23. Pow. Jarosławski.

D. Marynowski Miecz., Jarosław
 l. pow.
 Dietzius Adolf, Jarosław lek.
 m. kol.
 Feldmann Marek, Jarosław,
 Friedwald Abr., Jarosław.
 Kowenicki Adam, Jarosław.
 Meissels Zygm., Jarosław.
 Plech Aur., Jarosł. em. l. p.
 Rossberger Sal. Jarosław.
 Trzaskowski Julian, Jarosław.
 Turzański Grzeg. " l. m.
 Grossek Zenon, Moszczany.
 Schmeidler Leon, Radymn. l. k.
 Jastrzębski Walery, Sieniawa.
 Rodzoń Wład., Pruchnik.
 C. Ackerbauer Schmerl., Jarosł.
 Becher Salom., Jarosław.
 Thalheim Joachim, Pruchnik
 l. m.
 Reiss Adolf, Radymno l. m.
 Morecki Pink., Sieniawa l. m.
 W. Waśniewski Fr., Jarosł w. p.

24. Pow. Jasielski.

D. Biesiadecki Jan, Jasło l. p.
 Krzyszkowski Erazm, " a. s
 Ciegiewicz Stan. " "
 Hicner Aleks. " l. m.
 Kadyi Józef, Jasło s. sz.
 Macudziński Wal., Jasło pr. sz.
 Pawlicki Teodor, Jasło.
 Natter Wiktor, Frysztak.
 Łukasiewicz Wład., Kołaczyce.
 Brill Krystyn, Żmigród.
 C. Spiegel Em., Frysztak l. m.
 W. Pawlikiewicz Jan, Jasło w. p.

25. Pow. Jaworowski.

D. Hordyński Andrzej, Jawo-
 rów l. pow.
 Orski Jan, Jaworów.
 Gracka Józef, Krakowice l. s.
 C. Bendel Zygm., Jaworów.
 Gabel Rubin " "
 W. Bernstein Józ., Jaworów w. p.

26. Pow. Kałuski.

D. Wurst Adolf, Kałusz l. p.
 Kurowiec Jan "

D. Jastrzębski Julian, Wojniłów.
 Singer Salomon, " " l. kol.
 C. Kiczeles Herm., " " l. m.
 Finkelstein Maur. " " l. m.
 W. Nowak Jan, Kałusz w. p.

27. Pow. Kamionecki.

D. Gawlikowski St., lek. pow.
 Stupnicki Wł., Kamionka l. m.
 Czerkawski Jul., Dziedziłów.
 Blauer Teodor, Busk.
 Finkel Herman,
 Ciuk Aleks., Radziechów.
 Sochacki Leon, Stojanów.
 Biliński Włodz., Kamionka.
 Zaorski Bronisław, Busk.
 C. Raps Maks., Kamionka.
 Siegelbaum Jakób, Busk.
 Brand Jul., Radziechów.
 W. Kwieciński Stanisław, w. p.

28. Pow. Kolbuszowski.

D. Ciepielowski Kazim., Kolbuszowa l. p.
 Billig Elias, Kolbuszowa l. m.
 Woś Michał, Sokołów l. m.
 Bukowski Piotr, Sokołów.
 Dornfest Izydor, Sokołów.
 Szóstkiewicz St., Majdan l. m.
 W. Gnatowicz, Kolbuszowa w. p.

29. Pow. Kołomyjski.

D. Rosner Maks., Kołomyja l. p.
 Silberstein Izydor, Kołomyja.
 Głaczynski Wł., " pr. sz.
 Hulles Jakób " "
 Jaworski Bolesł " "
 Kobryński Włod., " "
 Piaskiewicz Wł., " l. m. i k.
 Rosenheck Sal. " "
 Sysak Gabriel " "
 Vincenz Aleksander, Peczeniżyn, pow. Kołomyja.
 Kumer L., Jabłonowo.
 Schorsz Józ. " l. pułk.
 Goldhaber J., Gwoździec.
 Morawski Mateusz, Gwoździec.
 C. Berger, Kołomyja.
 Reder Eman., " "
 Mazacz Jan, Peczeniżyn.
 Turner Hersch " "
 Zaleski Antoni " "

W. Wiliński, Kołomyja w. p.
 Hamerman " w. m.

30. Pow. Kosowski.

D. Coghen Antoni, Kosów l. p.
 Bażant Wacł., Kosów l. sal.
 Frisch Józef, Kosów.
 Skomorowski Jan, Kutry l. m.
 Soniewicki Teodor, Żabie.
 Goldhaber Meyer, Kossów.
 C. Rudich Leon, Kosów.
 Berger Adolf, Kutty.
 W. Gnatewicz Piotr, Kosów w. p.

31. Pow. Krakowski.

D. Bielański G., Kraków l. p.
 Haim Leopold, a. s.
 Komorowski B., Zwierzyniec.
 Malinowski G., Czernichów.

32. Pow. Krośniński.

D. Słaczka Antoni, Krosno l. p.
 Humiecki Mod., Krosno.
 Kocay Aleks., Krosno.
 Mazurkiewicz Dyon., Krosno l. m.
 Wain Jan, Krosno.
 Kropaczek Wilhelm, Dukla.
 Reiss Karol, Dukla l. m.
 Przyslopski Jakób, Korczyn l. gm.
 C. Horak Karol, Dukla.
 W. Szydłowski Zenon, w. p.

33. Pow. Łańcucki.

D. Witkowski Edw., Łańcut l. p.
 Fleszar Jan, Łańcut l. m.
 Żurawski Tomasz, Łańcut.
 Mach Seb., Kańczuga.
 Zasacki Stanisław, Kańczuga.
 Nidecki Apolin., Leżajsk l. m.
 Michalik Józef, Leżajsk.
 Zawilski Stanisław, Leżajsk.
 Ilowiecki Mat., Przeworsk.
 Koncewicz Jan " l. m.
 Smyczyński J., Przeworsk.
 Heftler Natan, Żółńia.
 C. Arzt Ignacy, Łańcut l. sk.
 Dobiasch Teod., Przew. l. m.
 W. Dulęba Maryan, Przew. w. p.
 Szymański Ant. " "

34. Pow. Limanowski.

- D. Ściborowski Kazim., l. p.
 Kruk Kazim., Limanowa.
 Herzig Naftali, Mszana. dolna.
 Odrobina Jerzy, Mszana l. k.
 Ellinger Stan., Mszana dolna.
 Wojtowicz Edmund, Mordarka.
 Orzeł Józef, Ujanowice.
 W. Atlas Herman w. p.

35. Pow. Liski.

- D. Jabłoński Jacek, Lisko l. p.
 Edelheit Zygm. „
 Robel Wiktor, Baligród l. m.
 Jaremkiewicz Mich., Ustrzyki.
 Lenartowicz Roman, „
 Dulęba, Lutowisko.
 C. Freysinger Józ., Lisko l. m.
 Propst Jakób, Lutowisko l. m.
 W. Rutkowski Kaz., w. p.

36. Pow. Lwowski.

- D. Obtułowicz Ferd., Lwów l. p
 Rozłucki Michał, Lwów a. s.
 Kolhberger, Kulpark. s. sz.
 Maliszewski H. „ pr. „
 Neusser Gust. „ dyr. sz.
 Pluciński Mich., Kulpark. p. sz.
 Kruszyński St. „ „
 Acker Sal., Szczerzec.
 Last Szym., „ l. m.
 Pilewski Oskar, Winniki.
 Stanowski Karol, l. f. Win-
 niki.
 C. Raps Manr., Jaryczów.

37. Pow. Mielecki.

- D. Warzycki Br., Mielec as. san.
 Iwański Karol, Mielec a. s.
 Kijas Błażej, Mielec em. l. p.
 Lorentski And., Radomyśl.
 Staniszewski Wład., Mielec.
 Sternberg Józef, Mielec.
 Jaroeki Piotr, Radomyśl.
 C. Schabus Em., Mielec l. m.
 W. Łukaszewski Andrzej w. p.

38. Pow. Mościska.

- D. Lebedowicz Em., Mościska
 l. p.
 Rokossowski M., Sądowa W.

- D. Jaciów Mik., Sądowa Wisznia.
 Kosz Kornel, Sądowa Wisznia.
 Langer Józef, Mościska.
 C. Korner Wilh., Mościska l. m.
 Raab Hen., Sąd. Wisznia l. m.
 W. Grochowski Kar. Mośc. w. p.

39. Pow. Myślenicki.

- Kniehynicki Klem., Myśle-
 nice, l. p.
 Bartmański Ferd. Myślenice.
 Łodziński Wikt., Myśl. l. m.
 Dereniowski Bol., Jordanów
 l. m.
 Uchacz Bł., Maków l. sk.
 Zduń Józef, Skawa.
 Zduń Jan, Raba wyżnia.
 W. Vergesslich Joz. w. p.

40. Pow. Nadworniański.

- D. Bednarski Jan l. p. Nadwórna.
 Bogdański Bronisl., Delatyn
 l. m. i sal.
 Regiec Jan, Majdan średni.
 Bibring Szym., Nadwórna.
 C. Feuerstein Maur., Nadwórna
 l. m.
 W. Fischer Joachim w. p.

41. Pow. Niski.

- D. Loewy Alojz., Nisko l. p.
 Bresiewicz Stan. Nisko l. g.
 Hernich Franc., Rudnik l. m.
 Hand Jonatan, Ulanów l. g.
 C. Hand Saul, Ulanów l. m.
 W. Piskorski Jan w. p.

42. Pow. Nowosądecki.

- D. Filewicz Jan, N. Sącz l. p.
 Czapliński St., N. Sącz pr. szp.
 Kijas Tadeusz, „
 Płochocki Tadeusz, „
 Lehman Józef, „
 Kołaczkowski J., w l. Szczawn.
 Kosterkiewicz Franc. „
 Kozubski Ludw., N. Sącz l. k.
 Ameisen Maurycy, „
 Zieliński Edward, „
 Mohr Dawid, „
 Richter Józef, „
 Silberman Leon, „
 Dziembowski Józef, Muszyna.

D. Solecki Jan, Muszyna l. kol.
 Kmietowicz Fr., Krynica l. g.
 Ebers Henryk, Krynica.
 Roth Władysław, Krynica.
 Chilewski Aleks., S. Sącz l. k.
 Gawelkiewicz Leop. " l. k.
 C. Zauderer Maur., N. Sącz.
 W. Sołtykiewicz Jan " w. p.
 Stuber Krystyn " w. m.

43. Pow. Nowotarski.

D. Blumenfeld Hen. N. Targ l. p.
 Schein Herman " l. m.
 Langsam Gutman, N. Targ.
 Hammerschlag Rudolf, Kroś-
 cienko.
 Chramiec And., Zakopane.
 Chwistek Bronisł. " "
 Piasecki Wenanty, Zakopane.
 Eliaszan Stanisław, " "
 Florkiewicz Wład., " "
 Grodecki F., Czarny Dunajec.
 W. Lubliner Leon, N. Targ w. p.

44. Pow. Pilzński.

D. Januszkiewicz Ignacy (syn.),
 Pilzno as. s.
 Mydlarski Wład., Pilzno.
 Czerwiński Kaz., Brzostek.
 Starachowicz Jan, Jodłowa.
 Januszkiewicz Ign. (ojc.) Pilzno
 Roth Józef, Zassów.
 W. Orzechowski Mar., Pilzno.
 Reiss Samuel, Czarna w. m.

45. Pow. Podhajecki.

D. Krzyżanowski Kalikst, Pod-
 hajce l. p.
 Choróbski Stan. pr. szp.
 Landau Aron, Podhajce.
 Lidechower Maur., Podhajce.
 Zirhoffer Karol, Wiśniowczyk
 l. o.
 W. Mikolaschek Jan, Podhajce
 w. p.

46. Pow. Przemyśki.

D. Dzikowski Zygmunt, Prze-
 myśl l. p.
 Ciechański Al., Przemyśl.
 Grabscheid Mojż., Przemyśl.
 Keller Maurycy, "

D. Kiebuziński Baz., Przemyśl.
 Kutna Samuel, " "
 Lityński Luc., " l. k.
 Madejski Józef pr. szp.
 Mannheim M., l. k. chor.
 Mayzel Tadeusz, Przemyśl.
 Michalik Franc., " "
 Pordes M., " "
 Schoeffer Franc., (dentysta).
 Szyszkowski Mich., Przemyśl.
 Smolarski Zygm., " l. m.
 Trybulec Franciszek, " "
 Ziemiański Leon, " "
 Salay Przem., em. l. sztab.
 Niezabitowski Stan., Dubiecko.
 Ruczka Stan., Niżankowice.
 C. Chilf Joach., Przemyśl (dent.).
 Schnitzer, " " "
 Biber Maur., " sek. szp.
 i więz.
 Salwer Joachim, Przemyśl.
 W. Fried Ferd., Przemyśl w. p.
 Kruk Herm. " w. m.

47. Pow. Przemyślański.

D. Waligórski Alb., Przemyślany
 l. p.
 Barbag Herman, " "
 Dolnicki Cyryl, Gliniany.
 Moch Jan, Hanaczów.
 C. Kostmann Ign., Przemyślany
 l. m.
 Kümmermann Sal., Gliniany.
 Sternberg Józef, Przemyślany.
 W. König Pinkas, w. p.

48. Pow. Rawski.

D. Lisiński Ludw., Rawa l. p.
 Dadlez Julian, " "
 Ożarowski Stanisław, Uhnów.
 C. Elner Mark., Niemir. l. m.
 Herold Izidor, Rawa.
 Hirsch Henryk, Lubycza.
 Kibitz Bernard, Uhnów.
 Kibitz Natan, Rawa.
 W. Weissberg Adolf, w. p.

49. Pow. Rohatyński.

D. Wasylewski Tyt., Rohatyn l. p.
 Schaff S., " "
 Terlecki Ant., " l. m.

D. Halarewicz B., Boleszowce
l. m.

Mossor Kazim., Bursztyn.

C. Goldschneider Jakób, Bukaczowce l. k.

Frost A., Bursztyn.

W. Weissberg Abr., Rohatyn
w. p.

50. Pow. Ropczycki.

D. Szczepański Włod., Ropcz. l. p.
Białkowski Wład. "

Roller Fryderyk, " l. m.

Bentkowski Zygm., Dębica.

Sędzielowski Fr. Sędziszów.

Kolasiński Alfons, "

C. Benda Ant., Dębica l. m i k.

Reiss Elias, Dębica.

Sztolzenberg Kar., Sędzisz.

W. Panek Jan, Dębica.

Kalakowski Wł., Sędziszów.

51. Pow. Rudecki.

D. Żelazowski Wiktor, l. p.

Śnieżek Ludwik, Rudki.

Maciulski Józef, Kołbajówce.

Jakliński Leon, Komarno l. sk.

C. Bardasch M., " l. m.

W. Andykowski Maryan, w. p.

52. Pow. Rzeszowski.

D. Barzycki Józ., Rzeszów l. p.

Teodorowicz Tadeusz a. s.

Bujniewicz Jakób, "

Elsner Hirsch, "

Fiałkowski Wojc., "

Jabłoński Stan., " pr.sz.

Kraus Herman, "

Niesiołowski Wł., "

Herz Emanuel, "

Segel Edward, "

Zagórski Ad., " l. m.

Sieniewicz Mich. Błażowa l. m.

Patryn Józef, Strzyżów l. w.

Szczepański Tyt., Strzyżów.

Biliński Mieczysław, Tyczyn.

C. Bernfeld Leon, Tyczyn l. m.

Herzum Józ., Głogów l. m.

Reiner Iz., Rzeszów.

Rotter Herm., "

W. Rasp Karol, Dr med. w. p.

53. Pow. Samborski.

D. Skalski Wł., Sambor l. p.

Biegelmayer Alf., " p. s.

Chrzaszczewski Woj., Sambor.

Klauber Adolf, "

Markiewicz Henryk, "

Omeis Jerzy, "

Waligórski Czesław, "

Dreifach Izidor, Łąka.

C. Luster Herm., Sambor.

Reis Leon, "

W. Rożankowski Jan, w. p.

54. Pow. Sanocki.

D. Czyżewicz Wład., Sanok l. p.

Drewniński M., " l. szp.

Kozłowski Emil, " l. m.

Zaleski Karol, " l. w.

Lemer Tytus, "

Krynicky Józef, "

Śmorągiewicz Kaz. " l. m.

Herzig Fryderyk.

Bielecki Ign., Rymanów.

Dukiet Józef, Rymanów.

Galant Józef, Zagórz l. k.

Jodłowski Jan, Zarszyn.

C. Stangenhaus Józ., Sanok s. szp.

Atlas Sal., Bukowsko l. m.

W. Olbrycht Piotr, San. w. p.

55. Pow. Skalański.

D. Lachowicz Engeniusz l. p.

Wojtkowski Jan, Grzymałów.

Sereth Izidor, Grzymałów.

Dawid Salom., Podwoleczyska.

Swiderski Bruno, "

Gottfried Mojżesz, Skala.

C. Bardach T., Grzymałów.

Berger Elias, Podwolecz.

Starwer Maurycy, Skala.

Metal Izaak, Podwolecz. l. m.

56. Pow. Śniatyński.

D. Werner Kar., Śniatyn l. p.

Senensieb Marek, Śniatyn.

Lic Feliks, Zabłotów.

Mehrer Izidor, Śniatyn l. m.

C. Pomeranz Izidor Śniatyn.

Berger Aron, Śniatyn.

W. Faulent Karol, Śniatyn w. p.

Prager Sam., Zabłot. w. m.

57. Pow. Sokalski.

D. Głowiński Winc., Sokal l. p.
 Jajus Miron, " l. m.
 Łuszczkiewicz J., "
 Urech Marek, "
 Wyspiański Gwido, " p. s.
 Kurasiewicz Józef, Bełz.
 Frostig Henryk, "
 Feuerstein El., Krystynopol
 l. m.

C. Markl Józef, Wareż l. m.
 Pordes Sal., Krystynopol.
 Blum Zygmunt, Bełz.
 W. Eitelberg Br., Sokal w. p.

58. Pow. Stanisławowski.

D. Wolański Kaj., Stanisł. l. p
 Żukotyński Fr., " a. s.
 Boral Henryk, "
 Brenner Karol, "
 Csessnak Julian, "
 Drzewicki Stefan, "
 Dawidowicz Emil, "
 Berghof Feliks, "
 Rubinstein Jakób, "
 Galusiński Ant. l. k. ch.
 Goldhaber Jak. l. k. ch.
 Konkolniak Grze., Stanisł. p. s.
 Pertak Maryan, " l. szp.
 Kopaczynski Wład. l. z. k.
 Lachawiec Apol., "
 Ochsenhorn Mojż., "
 Stefanicki Jan dent. "
 Ostafiński Maryan "
 Sztencel Bernard "
 Wnęgowicz Stanisł. "
 Żukowski Aleks. "
 Krzyształowicz Aug., Halicz
 l. m.
 Molezkowski Dyon., " l. k.
 Barb Leopold, Maryampol l. o.
 Blaustein Edw. Stanisławów.

C. Grader Maur., "
 Löwner Abraham "
 Hoffman Jan " l. sz.
 Klaar Szymon " l. k.
 Rosenbaum Max., "
 Sternschuss Henr., "
 Szczepkowski Tyt., " l. kar.
 W. Pawlikiewicz Jan, " w. p.
 Frucht Maurycy, " w. m.

59. Pow. Staromiejski.

D. Balicki Stan., l. p.
 Meżyk Jan, Chyrów lek. zakł.
 wychow. OO. Jezuitów.
 Zadurowicz Emil, Turka.
 C. Obuszkiewicz Stanisł., Stare
 miasto l. i wet. m.
 Schubert Mikołaj, Chyrów l. k.

60. Pow. Stryjski.

D. Serkowski Bol., Stryj l. p.
 Kronenberg K., " l. p.
 Jeż Andrzej, " l. m.
 Stahlberger Teodor "
 Meisels Jul., "
 Czarnecki Julian, "
 Papieski Antoni, "
 Michalski Wiktor, Skole.
 Friedländer Mendel, Skole.
 Mironowicz Kor., " l. s.
 Lippel Jakób, Stryj.
 Peczenik Leon, Stryj.
 C. König Iz., Stryj sek. szp.
 Rosenberg Nach., Stryj.
 Temple Dym., Stryj l. m.
 Kräuterblüth Jak., Skole.
 W. Smołuchowski Jan, w. p.

61. Pow. Tarnobrzeski.

D. Momidłowski Walery, Tarno-
 brzeg l. p.
 Machalski Leon, Tarnobrzeg
 em. lek. pow.
 Orzechowski Leonard. "
 Reifer Ad., Tarnobrzeg l. m.
 Radziński K., Rozwadów.
 Dumaire Wł., Rozwadów "
 Hochstim Adolf, Rozwadów.
 Bąkowski Teofil, Baranów.
 Kuzniar W., Grębów l. o.
 C. Hellmann Tob., Tarnobrzeg.
 W. Zörner Ferd., w. p.

62. Pow. Tarnopolski.

D. Gładyszowski Emil, Tarno-
 pol l. p.
 Eckhard Józ., Tarnopol p. s.
 Leibling Izyd., " l. m.
 Moszkowicz Jak. "
 Ochsenhorn Chaim.
 Münzer Maks., "

D. Rosenfeld A., Tarnopol. p. s. ż.
 Swistun Atan., „
 Szolayski Maryan, „
 Weissberg Zygm., „
 Brudziński Ludw., Mikulińce.
 Koller Bolesław, „
 Bloch Fr. „

C. Brauner Izydor, Tarnop. s. sz.
 Planer Jakób, „
 Stein Adolf (dentysta).
 W. Harasimowicz Stan., w. p.

63. Pow. Tarnowski.

D. Stanko Wojc., Tarnów. l. p.
 Hyżycki Cyryl, „ a. s.
 Ader Antschel, „
 Benoni Ferdynand, „
 Eberson Maurycy, „
 Glaser Leopold, „
 Gumowski Franc., „
 Glücksman Leon, „
 Józefczyk Tad., „
 Trammer Abrah., „
 Kowalski Henr., „
 Lerner Wilhelm, „
 Metzger Jan, „ l. m.
 Pilzer Herman, „ s. sz.
 Pochron Józef, „ l. sk.
 Schützer Leon, „ l. sz. iz.
 Skowroński Wł., „ p. s.
 Walczyński Józef, „ l. m.
 Wolfram Adolf, „
 Zbigniewicz Jan, „ s. sz.
 Kalisz Al., Tuchów l. m.
 Cymbler Walery, Radomyśl.
 W. Sikorski Narcyz, w. p.

64. Pow. Tłumacki.

D. Litwinowicz Orest, Tłum l. p.
 Hovurka Ant., l. f.
 Richter Arnold, Tłumacz l. m.
 Mieczulski Jan, Tyśmienica.
 Blumenblatt Leon, „
 Laszkiewicz J., l. o. Niżniów.
 C. Philip Herman, Ottynia l. k.

65. Pow. Trembowelski.

D. Kuhn Adolf, l. p.
 Olpiński Jul., Trembowla.
 Glücksmann Natan, Budzanów.
 Stoklassa Józ., Budz. l. m.
 Deutsch Z., Janów.

C. Fischer Leon, Trembowla.
 Hrazdilek Ed., Strusów.
 Neustein Joach., Tremb. l. m.
 Rosenstock Ign., Budzanów.
 W. Cielenkiewicz, w. p.

66. Pow. Turczański.

D. Stokłosiński Fr., Turka l. p.
 C. Kelhofer Sal., Turka.
 W. Panek Jan, w. p.

67. Pow. Wadowicki.

D. Zawadziński Stanisław, Wadowice l. p.
 Bukowski August, Wadowice.
 Gedl Władysław, „
 Opydo Franciszek, „
 Zborowski Józef, Andrychów.
 Żędzianowski Stan., „ l. m.
 Wiktor Michał, Andrychów.
 Lewandowski, Tłuczan.
 Tarchalski Józ., „ l. m.
 Gęslak Jan, Zebrzydowice l. s.
 Zatiokał Rud., Lanckorona.
 C. Erychleb Jan, Kalwarya.
 Weczerka August, Wadowice.
 W. Hryniewicz Em. „ w. p.

68. Pow. Wielicki.

D. Kownacki J., Wieliczka l. p.
 Podobiński Ant., „ l. m.
 Steiner Stan. „ l. sal.
 Szpitzel Jakób, Wieliczka.
 Malinowski Kasp., Dobczyce.
 Morawiecki Józef, Gdów.
 Aronsohn Sam., Podgórze.
 Bednarski A., Podgórze.
 Goldberger Izaak, „
 Kepler Paweł, Podgórze.
 Pancewicz Izydor, Podgórze.
 Pick Ludwik, Podgórze.
 Skalski Eu., Podgórze l. m.
 Świątek Winc., „ l. k.
 Nawrat Stanisł., Skawina.
 W. Sochaniewicz Teofil.

69. Pow. Zaleszczycki.

D. Friedberg Józef, l. p.
 Blutreich Izaak, Zaleszczyki.
 Sołowski Jan, „ p. sz.
 Kretz Ber., Tłuste l. m.
 Gilnreiner Michał, Uściczko.

C. Reischer Ignacy, Zaleszczyki
sek. sz. i l. m.

W. Gałek Józ., Zaleszcz w. p.

70. Pow. Zbarażki.

D. Nycz Henryk, Zbaraż a. s.
Baczyński Eust. Nowe sioło,
powiat Zbaraż.

Berger Michał, Zbaraż l. m.

C. Mantel Maur., „ l. sz.

Reisner Wilh., „ l. m.

W. Horodnicki Mikołaj w. p.

71. Pow. Złoczów.

D. Zaleski Eust., Złoczów l. p.

Gold Józef, „ a. s.

Heyne Bolesław „ l. m.

Stein Elias „ l. k.

Wysocki Aleks., „ p. s.

Bendel Samuel, „

Piotrowski Tomasz, Olesko.

Skórski Marj., Zborów l. m.

C. Aderschläger Izaak, Biały
Kamień l. m.

Hirschhorn F., Jezierna l. m.

Fuchs Mojż., Olesko l. m.

Raps Mayer, Pomorzany l. m.

Tokayer Jak., Pomorzany.

Petersil Józef, Zborów.

Bienenwald S., Sasów l. m.

Tischner Dion, Złoczów s. sz.

Deutscher Hen., Złoczów l. m.

Eskreis Markus „ s. sz.

W. Dorożyński T., Złoczów w. p.

72. Pow. Żółkiewski.

D. Opiński Jan, Żółkiew l. p.
Drzymalik Sylw., Żółkiew.

Muszkiet Karol „ p. sz.

Olejniki Mich., Mosty Wielkie.

Newestiuk Jakób, „

C. Elner Sal., Żółkiew s. sz.

W. Raff Chaskel, Żółkiew w. p.

73. Pow. Żydaczowski.

D. Goldhaber Adolf l. p.

Ortyński Włodz., Żydaczów.

Kraetschmar Fel., Drohowyż.

Mihowicz B., Rozdół.

Gozdecki Józ., Żurawno l. m.

C. Sakler Elias, Żurawno l. m.

Wehrn Leon, Mikołajów l. m.

W. Stupnicki A., Żydaczów w. p.

74. Pow. Żywiecki.

D. Szajna Józ., Żywiec as. s.

Idziński Wiktor, „ l. szp.

Miodoński F., Żywiec.

Seidler Ant., Żywiec l. sk.

Czop Zygm., Miłówka l. m.


Gawlik Jan, Sucha l. sk. i kol.

Janota Rud., Węg. górk.

Blumenfeld Joa., Zabłocie.

C. Klein Ad., Rajcza l. sk.

W. Bogdan Grzeg., Żywiec w. p.



ALFABETYCZNY SPIS LEKARZY.

Skrócenia przy końcu nazwisk:

Kr. oznacza **Kraków.**

L. „ **Lwów.**

Numera odnoszą się do powiatów.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A cker S. 36 | Berger H. L. | Bohosiewicz T. Kr. |
| Ackermann A. Kr. | Berger M. 70 | Boral H. 58 |
| Ader A. 63 | Berggrün A. 11 | Borzęcki Kr. |
| Agatstein I. Kr. | Berghof F. 58 | Borzemski A. 6 |
| Altmann Z. 5 | Bermann D. 17 | Bory J. 4 |
| Ameisen M. 42 | Bernacki F. 7 | Borysiewicz W. 16 |
| Antoniewicz W. 17 | Bernadzikowski S. 7 | Bossowski Al. Kr. |
| Arnold. W. L. | Berthleff K. L. | Braun S. Kr. |
| Aronsohn I. Kr. | Bett M. L. | Brenner 58. |
| Aronsohn S. 68 | Białkowski W. 50 | Bresiewicz S. 41 |
| Aschkenazy Z. L. | Bibring S. 40 | Brill K. 24 |
| Auerbach E. L. | Bieleński G. Kr. | Broniowski A. 57 |
| Auerhahn W. 22 | Bielecki J. 54 | Browicz T. Kr. |
| Aufrecht O. 6 | Bielewicz F. 18 | Brudzewski K. Kr. |
| | Biegelmajer A. 53 | Brudziński L. 62 |
| B aczyński E. 70 | Bieńczewski A. 15 | Bryliński J. 13 |
| Balicki S. 59 | Bieńkowski W. L. | Bubeniczek F. 13 |
| Ballaaban T. L. | Biesiadecki J. 24 | Budzynowski W. Kr. |
| Bandrowski J. Kr. | Biesiadzki A. Kr. | Bujalski M. 21 |
| Barański A. L. | Bikeles G. L. | Bujwid O. Kr. |
| Barański B. L. | Biliński Miecz. 52 | Bujniewicz J. 52 |
| Barącz R. L. | Biliński W. 27 | Bukowski A. 67 |
| Barbag H. 47 | Billig E. 28 | Bukowski P. 28 |
| Barb L. 58 | Blauer T. 27 | Buszek J. Kr. |
| Bartmański F. 39 | Blatteis J. Kr. | Buzdygan M. Kr. |
| Barzycki J. 52 | Blumenfeld H. 43 | Bylicki W. L. |
| Bažant W. 30 | Blumenfeld J. 74 | |
| Bąkowski T. 61 | Blumenblat L. 64 | C ercha M. Kr. |
| Bąrowicz A. Kr. | Blutreich J. 69 | Chadzyński J. L. |
| Beck A. L. | Błoch Fr. 62 | Chilewski A. 42 |
| Bednarski A. 68 | Błotnicki T. L. | Cholewicz F. Kr. |
| Bednarski J. 1. | Bobek J. 10 | Chomin A. L. |
| Bednarski J. 40 | Bober J. 2 | Choróbski S. 45 |
| Beigel A. 4 | Bobkiewicz H. Kr. | Chramiec A. 43 |
| Bendel S. 71 | Bodek I. L. | Chrzászczewski. 53 |
| Benoni F. 63 | Bogdanik. 1 | Chwistek Br. 43 |
| Bentkowski Z. 50 | Bogdański W. L. | Ciechanowski Kr. |
| Berezowski K. L. | Bogdański B. 40 | Ciechański A. 46 |

- Cieglewicz S. 24
 Ciepielowski K. 28
 Cieszewski Wł. Kr.
 Ciuk A. 27
 Coghén A. 30
 Csessnak J. 58
 Cwiklicer L. 15
 Cybulski N. Kr.
 Cymbler W. 63
 Czapliński S. 42
 Czarnecki J. 60
 Czarnik S. L.
 Czerkawski J. 27
 Czerny E. Kr.
 Czerski 6
 Czerwiński K. 44
 Czop Z. 74
 Czyżewicz A. L.
 Czyżewicz W. 54
 Dadlez J. 48
 Damski W. 11
 Danielski J. 19
 Dawid S. 55
 Dawidowicz E. 58
 Dębicki K. L.
 Dekański S. L.
 Dehm R. 20
 Dembowski M. 3
 Dereniowski B. 39
 Deutsch Z. 65
 Dietzius A. 23
 Długolecki F. 1
 Dobiński W. L.
 Dobruchowski A. 3
 Dolnicki C. 47
 Domański S. Kr.
 Dornfest J. 28
 Dorożyński J. 2
 Dreifach I. 53
 Drowiński M. 54
 Drobner J. Kr.
 Drożdż B. Kr.
 Drzewicki S. 58
 Drzymalik S. 72
 Dubanowicz P. L.
 Dukiet J. 54
 Dulęba 35
 Dumaire W. 61
 Dura S. 11
 Durst A. 26
 Dwernicki S. Kr.
 Dworzański K. 1
 Dziembowski J. 42
 Dzikowski Z. 46.
 Ebers H. 42
 Ebersson M. 63
 Eckhard J. 62
 Edelheit 35
 Ehrlich D. L.
 Eichhorn F. Kr.
 Eliasiewicz Z. Kr.
 Eliasz S. 43
 Elektrowicz E. L.
 Ellinger St. 34.
 Elsner H. 52.
 Falk K. 8
 Fechter T. L.
 Feld M. L.
 Feldmann M. 23
 Ferensiewicz M. 4
 Festenburg E. L.
 Feuerstein E. 57
 Feuerstein H. 17
 Feuerstein L. 5
 Fajersztajn I. L.
 Fiałkowski L. L.
 Fiałkowski N. 52
 Fibich S. L.
 Filewicz J. 42
 Filimowski A. Kr.
 Filipkiewicz S. Kr.
 Finkel H. 27
 Fleszar J. 33
 Florkiewicz W. 43
 Fraenkel J. 3
 Fraenkel L.
 Frankowski W. L.
 Fränkel H. Kr.
 Friedländer M. 60
 Friedberg J. 69
 Friedmann H. 17
 Friedwald A. 23
 Frisch J. 30
 Frostig H. 57
 Frühling M. 18
 Frydmann Z. 18
 Fuchs F. L.
 Fuchs L. L.
 Gaik J. L.
 Galant J. 54
 Galusiński A. 58
 Garbusiński S. 1
 Gałuszka J. Kr.
 Gasiorek F. 3
 Gawałkiewicz L. 42
 Gawlik J. 74
 Gawlikowski St. 27
 Gawroński A. 19
 Gertler N. Kr.
 Gedl W. 67
 Geślak J. 67
 Gilnreiner M. 69
 Glaser L. 63
 Gładyszowski E. 62
 Głuchowski F. L.
 Gluziński A. Kr.
 Gluziński L. L.
 Glücksmann N. 65
 Glücksmann L. 63
 Głaczyński W. 29
 Głowacki B. L.
 Głowiński W. 57
 Gold J. 71
 Goldberger I. 69
 Goldhaber M. 30
 Goldhaber I. 29
 Goldhaber I. 58
 Gołębiowski K. L.
 Gońka A. L.
 Górnisiewicz A. L.
 Górski C. 3
 Górski Ks. Kr.
 Gostyński J. L.
 Gotfried M. 55
 Gozdecki J. 73
 Grabscheid M. 46
 Gracka J. 25
 Grażyński E. Kr.
 Grodecki F. 43
 Gross K. L.
 Grossek Z. 23
 Grzybezyk S. 18
 Gumowski F. 63
 Gwozdecki T. L.
 Gwiazdomorski J. Kr.
 Haim L. Kr.
 Halarewicz B. 49
 Halban L. Kr.
 Hammerschlag R. 43

- Hand J. 41
 Harajewicz J. Kr.
 Harajewicz W. Kr.
 Heftler N. 33
 Hellmann. L.
 Henzel St. L.
 Hernich F. 41
 Herz E. 52
 Herzig N. 34
 Hess E. 1
 Heyne B. 71
 Hiener A. 24
 Hirsch D. Kr.
 Hirsch H. Kr.
 Hirschler M. 10
 Hochbaum O. 11
 Hochstim A. 61
 Hoefflich J. Kr.
 Hojnacki W. Kr.
 Hordyński A. 25
 Hoszard F. L.
 Hovurka A. 64
 Hulles J. 29
 Humiecki M. 32
 Hyżycki S. 63

Jabłoński A. Kr.
 Jabłoński J. 35
 Jabłoński S. 52
 Jaciow M. 38
 Jajus M. 57
 Jakliński L. 51
 Jakobi L. 60
 Jakubowski A. 20
 Jakubowski M. Kr.
 Jalikowski M. 2
 Jana S. L.
 Janda F. L.
 Janikiewicz St. Kr.
 Janota R. 74.
 Janowski J. 17
 Januszkiewicz J. o. 44
 Januszkiewicz J. s. 44
 Jaremkiewicz M. 35.
 Jaroeki P. 37
 Jarosiewicz R. 5
 Jarosz St. 7
 Jarosz W. Kr.
 Jaroszyński W. Kr.
 Jasiński W. L.
 Jastrzebski A. Kr.
- Jastrzebski J. 26
 Jastrzebski W. 23
 Jaworski W. Kr.
 Jaworski B. 29
 Jekes L. L.
 Jendl J. 20
 Jeż A. 60
 Jeż W. Kr.
 Jdziński W. 74
 Jłowicki M. 33
 Jodłowski J. 54
 Jordan H. Kr.
 Józefczyk T. 63
 Junger J. Kr.
 Jüngst W. 12
 Jurowicz J. Kr.
 Jwański K. 37.

Kaczorowski B. L.
 Kaczyński S. Kr.
 Kaden K. Kr.
 Kadyj J. 24
 Kadyj H. L.
 Kalach F. 6
 Kalisz A. 63
 Kanafas O. 21
 Kapelusz E. 1
 Karpiński S. L.
 Katyński L. 18
 Kaufmann M. Kr.
 Kaufmann O. Kr.
 Kędzior W. Kr.
 Keller M. 46
 Keller R. 1
 Kepler P. 68
 Kicki T. L.
 Kiebuziński B. 46
 Kijas B. 37
 Kijas T. 42
 Kirschner A. Kr.
 Kisielewski J. 7
 Klauber A. 53
 Klein L. 11
 Kluczyński Z. 7
 Kmietowicz F. 42
 Kniaziołucki Z. Kr.
 Kniehyniecki K. 39
 Kobryński W. 29
 Kobylański A. L.
 Kocay 32
 Koerner E. 10
 Kohn M. Kr.
- Kolasiński A. 50
 Kolberger 36
 Koller B. 62
 Kołaczkowski J. 42
 Komorowski B. 31
 Koncewicz J. 33
 Konkolniak G. 58
 Kopaczyński W.
 Kopff L. Kr.
 Korezyński E. Kr.
 Korezyński L. Kr.
 Korolik T. 22
 Korman J. L.
 Kosterkiewicz F. 42
 Kosiński F. L.
 Kosiński L. Kr.
 Kościński F. Kr.
 Kossak L. L.
 Kostanecki A. Kr.
 Kosz K. 38
 Kotłowski S. 16
 Kowalewski E. L.
 Kowalski H. 63
 Kowalski E. L.
 Kowalski K. L.
 Kowenicki A. 23
 Kownacki J. 68
 Koy S. Kr.
 Kozłowski B. Kr.
 Kozłowski S. Kr.
 Kozłowski E. 54
 Kozubski L. 42
 Kraetschmar F. 73
 Kraus A. 5
 Kraus H. 52
 Kramarzyński M. 14
 Kramarzyński K. Kr.
 Krasowski S. Kr.
 Kretowicz W. 18
 Kretz B. 69
 Krobicki T. L.
 Krokiewicz A. L.
 Królikowski J. Kr.
 Krongold W. Kr.
 Kronenberg K. 60
 Kroó J. 10
 Kropaczek F. 32
 Kropf H. L.
 Kruk K. 34
 Kruszyński St. 36
 Kruszyński K. Kr.
 Krygowski T. L.

- Krynicki J. 54
 Kryński L. **Kr.**
 Krzyszkowski E. 24
 Krzyształowicz. 58
 Krzyształowicz F. **Kr.**
 Krzyżanowski E. 10
 Krzyżanowski T. 45
 Kucharski P. **L.**
 Kuhn A. 65
 Kummer L. 29
 Kunzek H. **L.**
 Kurasiewicz J. 57
 Kurowiec J. 26
 Kutna S. 46
 Kurzyniec W. **Kr.**
 Kuźniar W. 61
 Kwaizer Wł. **Kr.**
 Kwaśnicki A. **Kr.**
 Kwiatkiewicz S. **L.**
 Kwieciński M. 1.
- L**achawiec A. 58
 Lachowicz E. 55
 Lachowicz Z. **L.**
 Landau A. 45
 Landau F. **L.**
 Landesberg M. 6
 Lang O. **Kr.**
 Langer J. 38
 Langie A. **Kr.**
 Langsam 43
 Last S. 36
 Laszkiewicz A. 64
 Lateiner E. **L.**
 Lebedowicz E. 38
 Lechowski W. 17
 Legeżyński W. **L.**
 Lehmann. 42
 Leiblinger F. 6
 Leiblinger J. 62
 Lemer T. 54
 Lenartowicz R. 35
 Leńko Z. **L.**
 Lerner S. **Kr.**
 Lerner W. 63
 Lewandowski J. 67
 Lic F. 56
 Lic H. 9
 Lickendorf I. **L.**
 Ljoewy A. 41
 Lppel J. 60
 Lidhower M. 45
- Lisiński L. 48
 Litwinowicz O. 64
 Lityński L. 46
 Lorentski A. 37
 Löw B. 17
 Lukas A. **L.**
 Lustig S. **Kr.**
 Lustgarten L. **Kr.**
 Lutyński L. 13.
 Lux W. **Kr.**
- Ł**azarski J. **Kr.**
 Łepkowski W. **Kr.**
 Łodziński W. 39
 Łopaciński M. **Kr.**
 Łopacki L. **L.**
 Łowczowski W. 7
 Łucki J. 1
 Łukasiewicz W. 24
 Łuszczkiewicz J. 57.
- M**ach S. 33
 Machalski L. 61
 Machek E. **L.**
 Maciulski J. 51
 Macudziński W. 24
 Mączka T. **Kr.**
 Madejski B. **L.**
 Madejski J. 46
 Madejski W. 6
 Mahl J. **L.**
 Majer J. **Kr.**
 Majewski A. **L.**
 Majewski J. **Kr.**
 Malinowski G. 31
 Malinowski K. 68
 Maliszewski H. 36
 Małaczyński R. **Kr.**
 Mannheim M. 46
 Marcisiewicz F. **Kr.**
 Margulies M. **L.**
 Marischler J. **Kr.**
 Markiewicz D. **L.**
 Markiewicz H. 53
 Marowski M. **Kr.**
 Mars A. **Kr.**
 Marynowski J. 15
 Marynowski M. 23
 Mayer J. 19
 Mayzel T. 46
 Mazurkiewicz D. 32
 Medwey A 11
- Mehrer H. **L.**
 Mehrer J. 56
 Meissels J. 60
 Meissels Z. 23
 Mendelsburg H. **Kr.**
 Merczyński E. **L.**
 Merunowicz J. **L.**
 Meth S. 9
 Metzger J. 63
 Meżyk J. 59
 Michalik Fr. 46
 Michalik J. 33
 Michalik K. 7
 Michalski W. 60
 Mieczulski J. 64
 Mihowicz Br. 73
 Mikołajski S. 20
 Milewski T. **Kr.**
 Millet A. 14
 Miodoński Fr. 74
 Mironowicz K. 60
 Moch J. 47
 Mohr D. 42
 Mołczkowski D. 58
 Momidłowski S. **Kr.**
 Momidłowski W. 61
 Morawiecki J. 68
 Morawski T. 29
 Mosler M. 5
 Mossing K. **L.**
 Mossor K. 49
 Moszkowicz J. 62
 Mrazek B. **L.**
 Mukowicz E. **L.**
 Müldner J. 12
 Münz E. **Kr.**
 Münzer M. 62
 Murdzieński F. **Kr.**
 Muszkiet K. 72
 Mydlarski W. 44.
- N**acht F. 10
 Natter W. 24
 Nawrat S. 68
 Neumann E. 18
 Neumann S. 10
 Neusser G. 36
 Newestiuk J. 72
 Nidecki A. 33
 Niemczynowski T. **L.**
 Niesiołowski W. 52
 Niezabitowski A. 46

- Niziołek P. 9
 Nodzyński B. 3
 Nowak Jul. **Kr.**
 Nowak Wład. **Kr.**
 Nowak J. 16
 Nowak Z. **Kr.**
 Nycz W. 1
 Nycz H. 70
- Obaliński A. Kr.**
 Obtulowicz F. **L.**
 Ochsenhorn M. 58
 Ochsenhorn Ch. 62
 Odrobina J. 34
 Oettinger J. **Kr.**
 Olejnik M. 62
 Olpiński J. 65
 Olszewski B. **Kr.**
 Omeis J. 53
 Opieński J. 72
 Opolski W. **L.**
 Opydo F. 67
 Orski J. 25
 Orzechowski J. 20
 Orzechowski L. 61
 Orzeł J. 34
 Ortyński W. 73
 Ostafiński M. 58
 Oświęcimski S. 3
 Ozimek S. 14
 Ożarowski 48
- Padalewski A. L.**
 Pajaczkowski W. **L.**
 Palesten H. 21
 Papee J. **L.**
 Panciewicz J. 68
 Papieski A. 60
 Pareński S. **Kr.**
 Paszkowski S. **Kr.**
 Patryn J. 52
 Pawlicki T. 24
 Pawlikowski A. **L.**
 Peczenik L. 60
 Pelczar Z. 17
 Pertak M. 58
 Peters J. 12
 Piasecki W. 43
 Piaskiewicz W. 29
 Piątkowski M. **Kr.**
 Pick L. 68
 Pieniążek P. **Kr.**
- Pietrzycki A. 7
 Pilzer H. 63
 Piotrowski E. **Kr.**
 Piotrowski G. **L.**
 Pilewski O. 36
 Piotrowski J. **Kr.**
 Piotrowski T. 71
 Piórko A. 3
 Pisek W. **L.**
 Pivel E. **L.**
 Piżl B. **L.**
 Plech A. 23
 Pluciński M. 36
 Płochocki T. 42
 Pochron J. 63
 Podlewski K. **L.**
 Podłuski M. 16
 Podobiński A. 68
 Pohorecki W. 22
 Poniąg S. **Kr.**
 Pordes M. 46
 Porycki B. **L.**
 Prebendowski S. **L.**
 Prus J. **L.**
 Przesmycki J. 18
 Przybylski W. **L.**
 Przysłowski J. 32
 Puchalski S. 15
- Raczyński J. Kr.**
 Radecki P. **Kr.**
 Rapaport J. **L.**
 Rapp L. **L.**
 Reifer A. 61
 Reinhold J. **L.**
 Reinhold Z. **L.**
 Reiss K. 32
 Reiss Wł. **Kr.**
 Regiec J. 40
 Reitzes D. **L.**
 Rencki R. **Kr.**
 Richter A. 64
 Richter J. 42
 Riedmüller B. **Kr.**
 Rieser 11
 Robel W. 35
 Rodzon W. 23.
 Roicki A. **L.**
 Rokossowski W. 38
 Roller F. 50
 Rościszewski E. **Kr.**
 Rosenblatt E. **Kr.**
- Rosenfeld A. 62
 Rosenzweig L. **L.**
 Rosner Al. **Kr.**
 Rosner An. **Kr.**
 Rosner Ig. **L.**
 Rosner J. **L.**
 Rosner M. 29
 Rosenblüth E. 12
 Rosenheck S. 29
 Rosenzweig J. 13
 Rossberger S. 23
 Roth J. 44
 Roszko A. 21
 Roth A. 3
 Roth W. 42
 Różecki J. **Kr.**
 Rozłucki M. 36
 Rożański J. **L.**
 Rubinstein J. 58
 Rubinstein B. **L.**
 Ruczka S. 46
 Rudnicki K. 14
 Ruff St. **Kr.**
 Rutkowski **Kr.**
 Rutowski K. 3
 Rydygier L. **Kr.**
- Salay 46**
 Satkowski Z. **Kr.**
 Sawicki A. 9
 Sawicki E. **L.**
 Sawicki S. **L.**
 Schaitter J. **Kr.**
 Schaff S. 49
 Schapira A. 6
 Schein H. 43
 Schlank M. 1
 Schmeidler L. 23
 Schmelkes M. **L.**
 Schmidt E. **L.**
 Schmidt F. 21
 Schoeffer F. 46
 Schneck K. 11
 Schneider L. **Kr.**
 Schney J. **L.**
 Schöngut S. **Kr.**
 Schorsch J. 29
 Schramm H. **L.**
 Schumann F. **K.**
 Schützer L. 63
 Schwarz A. **Kr.**
 Sciborowski K. 34

- Seiborowski W. Kr.
 Sędzielowski F. 50
 Seidler A. 74
 Seidner A. 5
 Seifmann P. Kr.
 Selzer J. L.
 Senensieb M. 56
 Serbeński W. L.
 Sereth J. 55
 Serkowski B. 60
 Siedlecki J. Kr.
 Sielski S. L.
 Sieniewicz M. 52
 Sieradzki A. L.
 Sieradzki W. Kr.
 Silbermann L. 42
 Silberstein J. 29
 Silberstein S. L.
 Simon F. Kr.
 Singer M. L.
 Singer S. 26
 Skakalski E. 68
 Skalski W. 53
 Skałkowski B. L.
 Skibicki A. 8
 Skobel S. Kr.
 Skomorowski J. 30
 Skórczewski B. Kr.
 Skórski M. 71
 Skowroński W. 63
 Skrzyński S. Kr.
 Ślaczka A. 32
 Sliwiński M. Kr.
 Słosarczyk A. 1
 Ślapa W. Kr.
 Smitowski M. L.
 Smolarski W. Kr.
 Smolarski Z. 46
 Smoragiewicz K. 54
 Smutny K. L.
 Śnieżek L. 51
 Sobolewski F. 6
 Sochacki Leon 27
 Sochanik S. L.
 Sochański J. L.
 Sokal M. 10
 Sokal J. 22
 Sokołowski H. Kr.
 Solecki J. 42
 Sołtysik M. Kr.
 Sołtysik S. 6
 Soniewicki T. 30
 Spira R. Kr.
 Spitzel J. 68
 Sroczyński F. Kr.
 Stachiewicz T. L.
 Stahlberger T. 60
 Stahr E. Kr.
 Stangenhaus A. L.
 Staniszewski J. Kr.
 Staniszewski W. 37
 Stankiewicz F. L.
 Stanko W. 63
 Stanowski K. 36
 Starachowicz J. 44
 Stark J. L.
 Stauber S. L.
 Stefanicki J. 58
 Stein E. 71
 Steiner S. 68
 Steinhaus J. L.
 Steinkeller H. 11
 Stenzel B. 58
 Sternberg J. 37
 Steuer A. 1
 Stoeckl 13
 Stoklassa J. 65
 Stokłosiński F. 66
 Stopezański A. Kr.
 Strojnowski E. L.
 Strumiński A. 6
 Stupnicki W. 27
 Surzycki J. Kr.
 Süsskind A. Kr.
 Świątek W. 68
 Świątkiewicz M. L.
 Switalski L. Kr.
 Swiderski B. 55
 Swistun A. 62
 Sysak G. 29
 Szajna J. 74
 Szajnowski M. 5
 Szewczyk J. Kr.
 Szpilmann J. L.
 Szymański H. 12
 Szymkiewicz K. Kr.
 Szymonowicz W. Kr.
 Szyszkowski W. 46
 Szczepański W. 50
 Szczepański T. 52
 Szołajski J. 62
 Szostkiewicz S. 28
 Sztembarth C. L.
 Szulistański R. L.
 Szuszkiewicz P. L.
 Szydłowski Z. L.
 Tarchalski J. 67
 Tarnawski A. 5
 Taschmann A. L.
 Tatarczuch W. L.
 Teichmann L. Kr.
 Teitelbaum M. 8
 Tenner J. 17
 Teodorowicz T. 5
 Terlecki A. 49
 Tiegermann Em. 17
 Tislowitz P. Kr.
 Tokarski St. Kr.
 Torczyński T. Kr.
 Trammer A. 63
 Trybulec F. 46
 Trzaskowski B. 23
 Trzebiecki K. L.
 Trzeciński B. Kr.
 Trzebicki R. Kr.
 Turzański G. 23
 Tuszyński F. Kr.
 Tyszecki T. L.
 Tyszkowski L. L.
 Uchacz B. 39
 Udziela M. 19
 Uhma Cz. L.
 Uranowicz T. 8
 Urech 57
 Ustrzycki J. L.
 Vincenz A. 29
 Wachholz L. L.
 Wachtel A. L.
 Wachtel Z. Kr.
 Wagner A. L.
 Wagrowski K. 13
 Wain J. 32
 Waleczyński J. 63
 Walentowicz A. Kr.
 Waligórski A. 47
 Waligórski C. 53
 Wallach D. L.
 Warzycki B. 37
 Wasylewski T. 49
 Węchowski L.
 Wechsler E. L.
 Wechsler L. 1

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Wehr W. L. | Woś M. 28 | Zborowski J. 67 |
| Weigel J. L. | Woszczyński J. Kr. | Zduń J. 39 (ojc.) |
| Weiss L. L. | Wroński B. 18 | Zduń J. 39 (syn) |
| Weissberg Z. 62 | Wurst A. 26 | Zeitner J. Kr. |
| Wenclewski T. L. | Wysocki A. 71 | Zennermann W. 52 |
| Werner K. 56 | Wyspiański G. 57 | Zgórski K. 88 |
| Wernicki J. Kr. | | Zieleniewski M. Kr. |
| Wiczkowski J. L. | Z adurówicz E. 59 | Zieliński E. 42 |
| Widmann O. L. | Zagórski A. 52 | Ziembicki G. L. |
| Wiktor J. L. | Zakreys F. L. | Ziemiański L. 46 |
| Wiktor M. 67 | Zaleski E. 71 | Zion O. L. |
| Wilkoś A. Kr. | Zaleski K. 54 | Zirhoffer K. 45 |
| Willer A. L. | Zanietowski J. Kr. | Zoll J. Kr. |
| Wilson R. 22 | Zaorski B. 27 | Zrogowski 22 |
| Wiszniewski L. Kr. | Zaremba A. 14 | |
| Witkowski E. 33 | Zarewicz A. Kr. | Ż elazowski W. 51 |
| Wnękiewicz S. 58 | Zasacki S. 33. | Żędzianowski S. 67 |
| Wojtkowski J. 55 | Zattokai R. 67 | Żukowski A. 58 |
| Wójtowicz E. 43 | Zauderer A. 8 | Żuławski K. Kr. |
| Wolański K. 58 | Zavadil T. L. | Żurawski T. 33 |
| Wolfram A. 16 | Zawadziński S. 67 | Żukotyński J. 58 |
| Wolisz A. L. | Zawilski S. 33 | Żydłowicz W. Kr. |
| | Zbigniewicz J. 63 | |



SPIS CHIRURGÓW.

Ackerbauer S. 23
Aderschläger J. 71
Adler S. 10
Arzt J. 33
Atlas S. 54

Bendl Z. 25
Bardach T. 55
Bardasz M. 51
Baumöhl N. 16
Becher S. 23
Benda A. 50
Bendel Z. 25
Berger A. 30
Berger A. 56
Berger E. 55
Berger 29
Bernfeld L. 52
Beschloss M. **L.**
Biber M. 46
Bienenwald S. 71
Blum Z. 57
Brand J. 27
Brauner J. 62
Brauner L. 15
Burnatowicz R. 21

Chilf J. 46
Chilf S. **L.**
Czernek H. 7

Deutsch H. 71
Dobijasz T. 33

Elner M. 48
Ellner S. 72
Erychleb J. 67
Eskreis M. 71

Feder J. 10
Feuerstein M. 40
Finkelstein M. 26
Fischer L. 65
Freysinger J. 5
Frost A. 49
Fuchs M. 71

Gabel H. **L.**
Gabel R. 25
Gallasch J. **L.**
Goldscheider J. 49
Grabscheid M. **L.**
Grader M. 58
Grünfeld J. 6

Hand S. 41
Handt J. 2
Hellman T. 61
Herold J. 48
Herzum J. 52
Hirsch H. 48
Hirschhorn F. 71
Hladij S. 22
Hoffman J. 58
Horak K. 32
Hrazdilek E. 65

Kelhofer S. 66
Kehlhofer S. 17
Kibitz B. 48

Kibitz N. 48
Kiezales H. 26
Klaar S. 58
Klein D. 74
Kluczycki W. 14
Kohn F. 3
Koller J. 18
König J. 60
Korner W. 38
Kostmann J. 47
Kräuterblüth J. 60
Kreiner E. **L.**
Kujłowski L. 16
Kurzer L. **L.**

Landau A. 19
Lateiner L. **L.**
Letz S. **L.**
Lisowski M. **L.**
Luster H. 53
Lwewner 58
Lucyk J. 8

Madejski E. **L.**
Margulles E. 22
Mantel M. 70
Mark S. **L.**
Markl J. 57
Mazacz 29
Metal J. 55
Metanowski D. 6
Minceles L. 5
Morecki P. 23
Mosler M. 10

Neustein J. 65
Nussbaum M. 6

Obuszkiewicz S. 59
Ostérsetzer A. 13

Philipp H. 64
Plahner J. 62
Pöller H. 5
Pomeranz F. 22
Pomeranz J. 56
Pordes S. 57
Probst J. 35.

Raab H. 38
Rager J. 6
Raps M. 27
Raps M. 36
Rares J. 22
Reder E. 29
Reich B. 17
Reiner J. 52
Reischer J. 69
Reisner W. 70
Reiss A. 23

Reiss E. 50
Reiss L. 53
Rosenbaum L. 6
Rosenbaum M. 58
Rosenberg N. 60
Rosenkranz M. L.
Rosenöhl J. 17
Rosenstock J. 65
Roth W. 2
Rotter A. 12
Rotter H. 52
Rudich L. 30

Sakler E. 73
Salver J. 46
Schabbus E. 37
Schenker E. 8
Scheps J. 19
Schnitzer P. 46
Schubert M. 59
Siebner N. 22
Siegelbaum J. 27
Sobelsohn D. 22
Sochacki F. 2
Spelda A. 1


Spiegel E. 24
Stangenhaus J. 54
Starwer M. 55
Sternberg B. 2
Sternberg J. 47
Sternschuss H. 58
Stolzenberg K. 50
Szczepkowski T. 58

Temple D. 60
Terner H. 29
Thalheim J. 23
Tischner D. 71
Tokayer J. 71

Urich S. L.

Weczerka A. 67
Wehrn L. 73
Weiss J. L.
Wieselmann M. 3.

Zaleski A. 29
Zauderer M. 42
Zawirski K. L.
Zrogowski J. L.



OGÓLNE PRZEPISY POCZTOWE.

Należytość za listy zwyczajne w całym państwie austr. do wagi 20 gr. ($\frac{6}{10}$ l. ct.) jest 5 ct., nad 20 do 250 gr. (15 l. ct.) 10 ct., listy takie mogą być przy oddaniu opłacone lub nie, a wtenczas za listy niefrankowane do 20 gr. 10 ct., od 20 do 250 gr. 15 ct., listy za mało frankowane podlegają tej samej opłacie, z tą różnicą, że wartość przyklepionych marek odlicza się.

Za listy, które w miejscach doręczane bywają, opłaca się: do 20 gr. 3 ct., od 20 do 250 gr. 6 ct. Za nieopłacone, opłaca odbiorca 6 ct. do 20 gr.; 9 ct. do 250 gr.

Listy kartkowe po 3 ct. dla doręczenia adresatom w miejscu nadania zamieszkałym, jakoteż listy kartkowe po 5 ct., które do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec przesyłane być mogą.

Karty korespondencyjne po 2 ct. mogą być przesyłane do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec — karty te można wysyłać zagranicę z dołączeniem odpowiedniej należytości. Karty korespondencyjne mogą być rekomendowane jak listy za opłatą 10 ct. za rekomendację, lub przyklepieniem marki 10 ct.

Na listy rekomendowane otrzymuje się receptis. Należytość rekomendacyjna do wszystkich krajów europejskich wynosi 10 ct., zaś 5 ct. w miejscu nadania (loco).

Jeżeli nadawca po upływie pewnego czasu nie otrzymał odpowiedzi, natenczas ma prawo zrobić zapytanie (reklamację) w urzędzie nadawczym za opłatą 10 ct. Jeżeli zaś był dołączony receptis zwrotny, natenczas reklamacja nie podlega żadnej opłacie; jeżeli pokaże się, że list zaginął, wtenczas ma prawo żądać wynagrodzenia 20 złr., gdy list był do miejsca w obrębie monarchii położonego adresowany, zaś 21 złr., gdy był za granicę wysłany.

Za granicę muszą być pieczętowane jedną lub dwiema pieczętkami, w kraju zaś mogą być tylko zalepiane. Listy rekomendowane do Prus i Niemiec mogą być posyłane na koszt adresata.

Druki. Do państwa Austriackiego, Bośni, Hercegowiny, ks. Lichtenstein oraz Niemiec wynosi opłata: do 50 gr. 2 ct., do 150 gr. 3 ct., do 250 gr. 5 ct., do 500 gr. 10 ct.; do 1 kilogr. 15 ct. Waga nie może przenosić kilogr. (2 fnt. ct.). Niedostatecznie opłaconych druków nie wysyła się, lecz zwrócone są oddawcom.

Listy pilne. Jeżeli oddawca życzy sobie, ażeby list natychmiast po odejściu do miejsca przeznaczenia był doręczonym, winien dopisać na kopercie po lewej stronie u dołu „*doręczyć zaraz przez umyślnego posłańca*“ (expres). Za to dopłaca się 15 ct., jeśli adresat mieszka w miejscu, gdzie się znajduje urząd

pocztowy. Za każde $7\frac{1}{2}$ kilometra (miał) odległości od urzędu pocztowego płaci się posłańcowi 50 ct., zawsze jednak adresat jest odpowiedzialny za uiszczenie przypadającej kwoty. Na kopercie można i godzinę oznaczyć, o której list musi być koniecznie wręczony. — Należytość uiszcza się przyklepianiem marek odpowiedniej wartości, zaś przy pieniężnych, gotówką. Za doręczenie awiza razem z przesyłką opłata wynosi 30 ct.

Taryfa opłaty listów.

Do	Należytość za opłatę				
	Listy		kor.kart.	Druki	
	za każde gr.	ent.		za każde gr.	ent.
Belgii, Bułgarii, Chin (p. Rosyę)	15	10	5	50	3
Danii i Islandyi	"	10	5	50	3
Egiptu	"	"	"	"	"
Niemiec z Alzacyą i Lotaryngią,	do 15	5	"	do 50	2
Helgoland i Luxemburg . . .				" 250	5
	nad 15	10	2	" 500	10
	-- 250			" 1000	15
Francyi z Algierem	15	10	5	50	3
Gibraltar przez Niemcy	15	10	5	50	3
Grecyi i wysp Japońskich, Korfu,					
Cefalonia, Zante	15	10	5	50	3
Wielkiej Brytanii i Irlandyi . .	15	10	5	50	3
Włoch	15	10	5	50	3
Czarnogóry	15	7	4	50	2
Niderlandów	15	10	5	50	3
Norwegii	15	10	5	50	3
Persyi przez Rosyę	"	"	"	"	"
Portugalii z Maderą i w. Azorskich	15	10	5	50	3
Rumunii (Mołdawii i Wołoszczyzny)	15	10	5	50	3
Rosyi z Polską	15	10	5	50	3
Stany Zjednocz. Północn. Ameryki	"	"	"	"	"
Szwajcaryi	15	10	5	50	3
Serbii (z Węgier)	15	5	4	50	2
(z Austrii)	15	7	3	50	2
Hiszpanii	15	10	5	50	3
Turcyi europ. i azyatyckiej przez					
Tryest, Belgrad, Orsowę . . .	15	10	5	50	3

" " Listy z pieniędzmi winny być zaopatrzone w kopercie trwałej pięcioma pieczęciami, w urzędowej zaś kopercie dwiema, lub też jeżeli wartość przenosi 500 złr., a waga 250 gramów, przynieść je można na pocztę, ale nie zapieczętowane, aby urzędnik mógł sprawdzić kwotę znajdującą się w nich, wten-

czas jednak portoryum musi być zaraz uiszczone i wynosi 50% więcej, niż zwyczajne.

Gotówkę brzęczącą posyłając, należy obwinąć w papier i przepieczerować wewnątrz koperty, aby się nie poruszała.

Opakowanie. Przedmioty małej wartości, którym przyciśnięcie nie szkodzi, nie przepuszczające tłuszczu lub wilgoci, nie przenoszące ciężaru 5 kilogr., na nie wielką odległość pakać można w papier mocny i obwiązać sznurkiem.

Powziątki pocztowe w kraju (Nachnahme). Wolno wysyłać przesyłki do wszystkich w kraju poczt monarchii austr., jakoteż węgierskiej za pobraniem do wysokości 500 zlr.

Przekazy pieniężne (Postanweisungen). Za pośrednictwem urzędów pocztowych można przekazywać wypłaty w kraju do wysokości 500 zlr. w. a.

Przesyłający opłaca porto przyklepieniem marki do 10 zlr. 5 ent., od 10 do 50 zlr. 10 ent., do 150 zlr. 20 ct., od 150 do 300 zlr. 30 ct., od 300 do 500 zlr. 50 ct.

Drogą zaś telegraficzną przyjmują i wypłacają przekazy pieniężne i znaczki pocztowe (Postanweisungen) do wysokości 500 zlr. w. a. Przy przesyłkach przekazów drogą telegraficzną opłata pocztowa jest ta sama, co przy przekazach zwykłych, z dodatkiem opłaty depeszy zawisłej od ilości słów.


Przekazy za granicę mogą być przesyłane do całych Niemiec, Szwajcaryi, Bawaryi i Wirttembergu, Bułgarii, Rumunii, Turcyi i Egiptu, jako też do Stanów zjednoczonych Ameryki, jak również ze wszystkich tych krajów do Monarchii austr. i węgierskiej. Blankiety są inne jak w kraju. Kwoty mogą być przesyłane do wysokości 200 zlr. albo 400 marek czyli 500 franków.

Zlecenia pocztowe. Za pośrednictwem urzędów pocztowych można ściągać od innych osób drobne wierzytelności do wysokości 500 zlr. Blankietów nabywa się w urzędach pocztowych po cenie $\frac{1}{2}$ centa; a dołączysz dokument (n. p. weksel, rachunek lub kwit itp., przesyła się w kopercie zapieczętowanej, jako opłacony list polecony pod adresem urzędu pocztowego, gdzie debent mieszka.

W razie uiszczenia kwoty na blankiecie wyrażonej, wydaje poczta adresatowi załączone dokumenta, a pieniądze przesyła wierzycielowi za przekazem, po straceniu zwykłej należności przekazowej.

Zlecenia pocztowe są do Niemiec dozwolone i do Bośni i Hercegowiny, Belgii, Egiptu, Francyi, Włoch, Luxemburgu, Niderland, Norwegii, Rumunii, Szwecyi, Tunisu i Turcyi; w takim razie wierzytelności obliczają się na austriacką monetę wedle kursu wiedeńskiego.

Na jednym blankiecie można najwyżej 5 zleceń naraz wysyłać, ale nie trzeba zapomnieć o dołączeniu dokumentu każdego zlecenia, gdyż w takim razie zlecenie musiałoby być zwrócone bez skutku po upływie dni 14.



PORADNIK TELEGRAFICZNY.

W depeszach europejskich 15, w poza europ. 10 liter stanowi jedno słowo, wyraz więcej liter liczący, liczy się za dwa. Pięć cyfer w europ., 3 cyfry w poza europ. depeszach, stanowią słowo.

Bliższe oznaczenie, w jaki sposób chce oddawca przesłać depeszę, można w sposób skrócony oznaczać, dwie takie zgłoski liczą się za słowo.

Mp. Depesza do rąk własnych adresata.

D. Pilno. Depesza taka ma pierwszeństwo przed innemi; (taksa potrójna).

Rp. Odpowiedź zapłacona. Należytość zależy od ilości żądanej odpowiedzi.

Rpd. Odpowiedź zapłacona pilna. Należytość jak przy depeszy pilnej.

Xp. Posłaniec zapłacony.

Na żądanie nadawcy, można otrzymać receptis za opłatą 5 ct.

Nadawca może zażądać wstrzymania depeszy, lub jeżeli już wysłana, wstrzymać doręczenie tejże, w pierwszym przypadku otrzymuje zwrot opłaty po strąceniu 25 ct., w drugim przypadku musi nadać nową depeszę.

Opłata składa się:

- I. W monarchii austro-węg., do ks. Lichtenstein, Bośni, Hercegowiny i do Niemiec za każde słowo 3 ct., opłata musi wynosić najmniej 30 ct., czyli że depesza złożona z mniej niż 10 słów kosztuje tak samo jak 10 słów 30 ct.
- II. Taksa ogólna przy depeszach zagranicznych wynosi 30 ct. a prócz tego za pojedyncze słowo:

Algier i Tunis	13 ct.
Ameryka północna	57 "
południowa	4 Złr. 45 "
Anglia	13 "
Belgia, Dania i Niderlandy	11 "
Czarnogóra, Niemcy Szwajcarya i Serbia	4 "
Bułgarya	9 "
Egipt	84 "
Francya	8 "
Grecya	22 "
Hiszpania i Turcyja eur.	14 "
Holandya	11 "
Portugalia	17 "
Rumunia	6 "
Rosya i Szwecya	12 "
Włochy	8 "

SKALA STEMPOWA.

SKALA I.

na weksle.

				złr. ct.
	Do	75	złr.	—05
nad 75	złr.	"	150	" —10
" 150	"	"	300	" —20
" 300	"	"	450	" —30
" 450	"	"	600	" —40
" 600	"	"	750	" —50
" 750	"	"	900	" —60
" 900	"	"	1050	" —70
" 1050	"	"	1200	" —80
" 1200	"	"	1350	" —90
" 1350	"	"	1500	" 1—
" 1500	"	"	3000	" 2—
" 3000	"	"	4500	" 3—
" 4500	"	"	6000	" 4—
" 6000	"	"	7500	" 5—
" 7500	"	"	9000	" 6—
" 9000	"	"	10500	" 7—
" 10500	"	"	12000	" 8—
" 12000	"	"	13500	" 9—

Od każdych zaś następnych 1500 złr. o 1 złr. więcej, przyczem jednak kwoty poniżej 1500 złr. uważane będą za pełne.

SKALA II.

kwity i dokumenta w sprawach prawnych.

				złr. ct.
	Do	20	złr.	—07
nad 20	złr.	"	40	" —13
" 40	"	"	60	" —19
" 60	"	"	100	" —32
" 100	"	"	200	" —63
" 200	"	"	300	" —94
" 300	"	"	400	" 1·25
" 400	"	"	800	" 2·50
" 800	"	"	1200	" 3·75
" 1200	"	"	1600	" 5—
" 1600	"	"	2000	" 6·25
" 2000	"	"	2400	" 7·50
" 2400	"	"	3200	" 10—
" 3200	"	"	4000	" 12·50
" 4000	"	"	4800	" 15—
" 4800	"	"	5600	" 17·50
" 5600	"	"	6400	" 20—
" 6400	"	"	7200	" 22·50
" 7200	"	"	8000	" 25—

Nad 8000 złr. od każdych 400 złr. opłaconą być ma należytość wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po złr. 1 ct. 25, przyczem sumy niżej 400 złr. uważają się jako pełne.

SKALA III.

ugody pożyczkowe, kontrakty służbowe, kwity na wygrane loteryjne.

				złr. ct.
	Do	10	złr.	—07
nad 10	złr.	"	20	" —13
" 20	"	"	30	" —19
" 30	"	"	50	" —32
" 50	"	"	100	" —63
" 100	"	"	150	" —94
" 150	"	"	200	" 1·25
" 200	"	"	400	" 2·50
" 400	"	"	600	" 3·75
" 600	"	"	800	" 5—

				złr. ct.
	Do	1000	złr.	6·25
nad 800	złr.	"	1200	" 7·50
" 1000	"	"	1600	" 10—
" 1200	"	"	2000	" 12·50
" 1600	"	"	2400	" 15—
" 2000	"	"	2800	" 17·50
" 2400	"	"	3200	" 20—
" 2800	"	"	3600	" 22·50
" 3200	"	"	4000	" 25—

Nad 4000 złr. od każdych 200 złr. opłacaną być ma należytość wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po 1 złr. 25 ct., przyczem sumy niżej 200 złr. uważają się jako pełne.

Notatnik

na rok

1896.

KWARTAŁ I.

Konstantego Wiszniewskiego

Aptekarza w Krakowie

Telefon Nr 31.

Wyroby farmaceutyczno-lekarskie :

Kołaczyki (Tabletki) z wyciągiem **Kaskarowym** polecane przez Tow. lek. Krak. na wniosek komisji tegoż Towarzystwa pismem z d. 4 kwietnia 1884 r. L. 308 i odznaczone na wystawach krakowskiej i lwowskiej. Jako lek przeczyszczający odznaczają się od innych środków zawierających aloes, że nie sprawia bólei i nie osłabia, a pobudza apetyt.

Zażywać można trzy razy dnia po 1, 2 do 3 jednorazowo.

Zażywa się: położywszy na język kołaczyk popija się wodą i połyka; nie czuje się smaku i obejdzie się bez opłata. Kołaczyki składają się z ekstraktu kaskarowego i kremortary, tym to składnikom zawdzięcza ten preparat tak wyborny skutek.

Zawsze na składzie gotowe są kołaczyki z węglanu guajakolu po 0·20 i po 0·50. Również po 0·50 z Hemoglobinu suchego, który równa się zupełnie w skutku z Pfeuferowskim, a jest łatwy do zażycia.

Na składzie jest także wyborne w smaku i skutku **Piwo** z ekstraktem słodowym, oraz ekstrakt słodowy gęsty w słoikach.

Również rozmaite **wina lecznicze**, wyrabiane na starej Maladze i winie Lacrima Christi.

Na składzie jest także **koniak leczniczy** stary w całych i pół-butelkach.

Także **Wina: Malaga, Lacrima Christi i Bold Cherry.**

STYCZEŃ.

1. Środa. Nowy Rok.

2. Czwartek.

Monachium 2:50
 Chini' sulfy 2:50
 Codari' 2:50
 Hrv, 2:50

STYCZEŃ.

3. Piątek.

4. Sobota.

STYCZEŃ.

5. Niedziela.

6. Poniedział. Trzech Króli.

STYCZEŃ.

7. Wtorek.

8. Środa.

STYCZEŃ.

9. Czwartek,

10. Piątek.

STYCZEŃ.

11. Sobota.

12. Niedziela.

STYCZEŃ.

13. Poniedziałek.

14. Wtorek.

STYCZEŃ.

15. Środa.

16. Czwartek.

STYCZEŃ.

17. Piątek.

18. Sobota.

STYCZEŃ.

19. Niedziela.

20. Poniedziałek.

STYCZEŃ.

21. Wtorek.

22. Środa.

STYCZEŃ.

23. Czwartek.

24. Piątek.

STYCZEŃ.

25. Sobota.

26. Niedziela.

STYCZEŃ.

27. Poniedziałek.

28. Wtorek.

STYCZEŃ.

29. Środa,

1899

30. Czwartek.

1899

STYCZEŃ.

31. Piątek.

LUTY.

1. Sobota.

2. Niedziela. Oczysz. NPM.

LUTY.

3. Poniedziałek.

4. Wtorek.

LUTY.

5. Środa.

6. Czwartek.

LUTY.

7. Piątek.

8. Sobota.

LUTY.

9. Niedziela.

10. Poniedziałek.

LUTY.

11. Wtorek.

12. Środa.

LUTY.

13. Czwartek.

14. Piątek.

LUTY.

15. Sobota.

16. Niedziela.

LUTY.

17. Poniedziałek.

18. Wtorek.

LUTY.

19. Środa.

20. Czwartek.

LUTY.

21. Piątek.

22. Sobota.

LUTY.

23. Niedziela.

24. Poniedziałek.

LUTY.

25. Wtorek.

26. Środa.

LUTY.

27. Czwartek.

28. Piątek.

MARZEC.

1. Niedziela. 2. Poniedziałek.

MARZEC.

3. Wtorek.

4. Środa.

MARZEC.

5. Czwartek.

6. Piątek.

MARZEC.

7. Sobota.

8. Niedziela.

MARZEC.

9. Poniedziałek.

10. Wtorek.

MARZEC.

11. Środa.

12. Czwartek.

MARZEC.

13. Piątek

14. Sobota.

MARZEC.

15. Niedziela.

16. Poniedziałek.

MARZEC.

17. Wtorek.

18. Środa.

MARZEC.

19. Czwartek.

20. Piątek.

MARZEC.

21. Sobota.

22. Niedziela.

MARZEC.

23. Poniedziałek.

24. Wtorek.

MARZEC.

25. Środa. Zwiast. N. P. M.

26. Czwartek.

MARZEC.

27. Piątek. 08

28. Sobota. 09

MARZEC.

28. 29. Niedziela. P. M.

30. Poniedziałek.

31. Wtorek.

1876. 18.

Narzędzia chirurgiczne

nadające się
do gotowania, sterylizowania.

Opaski i przyrządy ortopedyczne

według najnowszych systemów.

Materyały opatrunkowe

w paczkach, sterylizowane po skoń-
czonem opakowaniu.

Opatrunki kompletne

sterylizowane aseptyczne lub
antyseptyczne (jodoform) w czterech
różnych wielkościach sporządza

c. k. nadworny dostawca

J. ODELGA

w Wiedniu, VI. Schmalzhofgasse 18.

Cenniki rozsyła się na żądanie.

Salophen

Przeciwgośćcowy
Przeciw
nerwobólom,
influenzy i t. d.



Tannigen

Środek ściągający
dla jelit
w katarach
kiszkowych i t. d.

FARBENFABRIKEN

vormals

FRIEDR. BAYER & C^o

ELBERFELD.

LYCETOL.

PIPERAZIN.

Somatoza

o wybitnej wartości odżywczej dla osób
źle odżywionych w blednicy, gruźlicy,
krzywicy, raku żołądka i t. d. w czasie
rekonwalescencji.

Trional

Pewny
środek nasenny
w dawce 1·0—1·5
w filiżance
herbaty.

Aristol

Środek zabliźnia-
jący rany oparze-
linowe, wypryski
i t. d.

Europphen

Przeciwkilkowy,
szczególnie w ul-
cus molle, zamiast
jodoformu i t. d.

Notatnik

na rok

1896.

KWARTAŁ II.

PENSYONAT

przy zakładzie wodoleczniczym
na **Miedziusiu**
w **Szczawnicy**

z komfortem urządzonych 120 pokoi,
wodociągi, oświetlenie elektryczne, kuch-
nia dobra, wina doborowe i t. p.

Oplata za pensję z całodziennem utrzy-
maniem, kąpielami, mieszkaniem i po-
ścielą wynosi od 3 złr. 50 c. dziennie,
wyżej.

Dr. J. Kołaczkowski,
właściciel Zakładu.

KWIECIEŃ.

1. Środa.

2. Czwartek.

KWIECIEŃ.

3. Piątek.

4. Sobota.

KWIECIEŃ.

5. Niedziela. Wielk. Zmartw.

6. Poniedziałek. Wielkan.

KWIECIEŃ.

7. Wtorek. 8. Środa.

KWIECIEŃ.

9. Czwartek.

10. Piątek.

KWIECIEŃ.

11. Sobota.

12. Niedziela.

KWIECIEŃ.

13. Poniedziałek.

14. Wtorek.

K W I E C I E Ń.

15. Środa.

16. Czwartek.

KWIECIEŃ.

17. Piątek.

18. Sobota.

KWIECIEŃ.

19. Niedziela.

20. Poniedziałek.

KWIECIEŃ.

21. Wtorek.

22. Środa.

KWIECIEŃ.

23. Czwartek.

24. Piątek.

KWIECIEŃ.

25. Sobota.

26. Niedziela.

KWIECIEŃ.

27. Poniedziałek.

28. Wtorek.

K W I E C I E Ń.

29. Środa.

30. Czwartek.

1. Piątek.

2. Sobota.

3. Niedziela.

4. Poniedziałek.

5. Wtorek.

6. Środa.

2. Czwartek.

8. Piątek. **Stanisława bisk.**

M A J.

9. Sobota.

10. Niedziela.

MAJ.

9. w 11. Poniedziałek. 11

12. Wtorek.

13. Środa.

14. Czwartek. Wniebow. P.

15. Piątek.

16. Sobota.

17. Niedziela.

18. Poniedziałek.

MAJ.

19. Wtorek.

20. Środa.

21. Czwartek.

22. Piątek.

MAJ.

23. Sobota.

24. Niedziela. Zesł. Ducha ś.

MAJ.

25. Poniedz. Świąteczny.

26. Wtorek.

27. Środa.

28. Czwartek.

M A J.

29. Piątek.

30. Sobota.

CZERWIEC.

1. Poniedziałek. 222. 2. Wtorek.

CZERWIEC.

3. Środa.

4. Czwartek. **Boże Ciało.**

CZERWIEC.

5. Piątek.

6. Sobota.

CZERWIEC.

7. Niedziela.

8. Poniedziałek.

CZERWIEC.

9. Wtorek.

10. Środa.

CZERWIEC.

11. Czwartek.

12. Piątek.

CZERWIEC.

13. Sobota.

14. Niedziela.

CZERWIEC.

15. Poniedziałek.

16. Wtorek.

CZERWIEC.

17. Środa.

18. Czwartek.

CZERWIEC.

19. Piątek.

20. Sobota.

CZERWIEC.

21. Niedziela.

22. Poniedziałek.

CZERWIEC.

23. Wtorek.

24. Środa.

CZERWIEC.

25. Czwartek.

26. Piątek.

CZERWIEC.

27. Sobota.

28. Niedziela.

CZERWIEC.

29. Poniedz. **Piotra i Pawła.**

30. Wtorek.

ADRESA.

ADRESA.

Narzędzia chirurgiczne

nadające się
do gotowania, sterylizowania.

Opaski i przyrządy ortopedyczne

według najnowszych systemów.

Materyały opatrunkowe

w paczkach, sterylizowane po skoń-
czonem opakowaniu.

Opatrunki kompletne

sterylizowane aseptyczne lub
antyseptyczne (jodoform) w czterech
różnych wielkościach sporządza

c. k. nadworny dostawca

J. ODELGA

w Wiedniu, VI. Schmalzhofgasse 18.

Cenniki rozsyła się na żądanie.

Salophen

Przeciwościewy
Przeciw
nerwobólom,
influenzy i t. d.



Tannigen

Środek ściągający
dla jelit
w katarach
kiszkowych i t. d.

FARBENFABRIKEN

vormals

FRIEDR. BAYER & C^o

ELBERFELD.

LYCETOL.

PIPERAZIN.

Somatoza

o wybitnej wartości odżywczej dla osób
źle odżywionych w blednicy, gruźlicy,
krzywicy, raku żołądka i t. d. w czasie
rekonwalescencji.

Trional

Pewny

środek nasenny
w dawce 1·0—1·5
w filiżance
herbaty.

Aristol

Środek zabliznia-
jący rany oparze-
linowe, wypryski
i t. d.

Europphen

Przeciwkilowy,
szczególnie w ul-
cus molle, zamiast
jodoformu i t. d.

Notatnik

na rok

1896.

KWARTAŁ III.

Ludwik Knapiński

dostawca dla c. k. klinik Uniw. Jagiel.
narzędzi chirurgicznych
maszyn ortopedycznych
bandaży i instrumentów
do intubacyi.

Pierwsza fabryka w Galicyi
popierana przez Szanowną
Komisyę przemysłową Tow. Lek. Krak.

i odznaczona wielkimi medalami
srebrnemi za staranne wyrabia-
nie narzędzi odpowiadających
wszelkim wymaganiom tak co do
trwałości jakoteż dokładności.

Adres telegraficzny:
„Knapiński, Kraków“

Kraków, Sławkowska 4.

L I P I E C.

1. Środa.

2. Czwartek.

LIPIEC.

3. Piątek.

4. Sobota.

L I P I E C.

5. Niedziela.

6. Poniedziałek.

LIPIEC.

17. Wtorek.

8. Środa.

LIPIEC.

9. Czwartek.

10. Piątek.

LIPIEC.

11. Sobota.

12. Niedziela.

L I P I E C.

13. Poniedziałek.

14. Wtorek.

LIPIEC.

15. Środa.

16. Czwartek.

LIPIEC.

17. Piątek.

18. Sobota.

LIPIEC.

19. Niedziela.

20. Poniedziałek.

LIPIEC.

21. Wtorek.

22. Środa.

LIPIEC.

23. Czwartek.

24. Piątek.

LIPIEC.

25. Sobota.

26. Niedziela.

LIPIEC.

27. Poniedziałek.

28. Wtorek.

LIPIEC.

29. Środa. 30. Czwartek.

SIERPIEŃ.

1. Sobota.

2. Niedziela.

SIERPIEŃ.

3. Poniedziałek.

4. Wtorek.

SIERPIEŃ.

5. Środa.

6. Czwartek.

SIERPIEŃ.

7. Piątek.

8. Sobota.

SIERPIEŃ.

9. Niedziela.

10. Poniedziałek.

SIERPIEŃ.

11. Wtorek

12. Środa

SIERPIEŃ.

13. Czwartek.

14. Piątek.

SIERPIEŃ.

15. Sobota. Wniebowz.

16. Niedziela.

SIERPIEŃ.

17. Poniedziałek.

18. Wtorek.

SIERPIEŃ.

15. 19. Środa. 1907.

20. Czwartek.

SIERPIEŃ.

21. Piątek.

22. Sobota.

SIERPIEŃ.

23. Niedziela.

24. Poniedziałek.

SIERPIEŃ.

25. Wtorek.

26. Środa.

SIERPIEŃ.

23. Czwartek.

28. Piątek.

SIERPIEŃ.

29. Sobota. 30. Niedziela.

SIERPIEŃ.

31. Poniedziałek.

WRZESIEŃ.

1. Wtorek.

2. Środa.

WRZESIEŃ.

3. Czwartek. 4. Piątek.

WRZESIEŃ.

M. 9. W. 5. Sobota.

M. 6. Niedziela.

WRZESIEŃ.

7. Poniedziałek.

8. Wtorek. Narodz. N. P. M.

WRZESIEŃ.

9. Środa.

10. Czwartek.

WRZESIEŃ.

11. Piątek

12. Sobota.

WRZESIEŃ.

13. Niedziela.

14. Poniedziałek.

WRZESIEŃ.

15. Wtorek.

16. Środa.

WRZESIEŃ.

17. Czwartek.

18. Piątek.

WRZESIEŃ.

19. Sobota.

20. Niedziela.

WRZESIEŃ.

21. Poniedziałek.

22. Wtorek.

WRZESIEŃ.

23. Środa.

24. Czwartek.

WRZESIEŃ.

25. Piątek.

26. Sobota.

WRZESIEŃ.

27. Niedziela.

28. Poniedziałek.

WRZESIEŃ.

29. Wtorek.

30. Środa.

ADRESA.

Narzędzia chirurgiczne

nadające się
do gotowania, sterylizowania.

Opaski i przyrządy ortopedyczne
według najnowszych systemów.

Materyały opatrunkowe
w paczkach, sterylizowane po skoń-
czonem opakowaniu.

Opatrunki kompletne
sterylizowane aseptyczne lub
antyseptyczne (jodoform) w czterech
różnych wielkościach sporządza

c. k. nadworny dostawca

J. ODELGA

w Wiedniu, VI. Schmalzhofgasse 18.

Cenniki rozsyła się na żądanie.

Salophen

Przeciwościewy
Przeciw
nerwobólom,
influenzy i t. d.



Tannigen

Środek ściągający
dla jelit
w katarach
kiszkiowych i t. d.

FARBENFABRIKEN

vormals

FRIEDR. BAYER & C^o
ELBERFELD.

LYCETOL

PIPERAZIN.

Somatoza

o wybitnej wartości odżywczej dla osób
źle odżywionych w blednicy, gruźlicy,
krzywicy, raku żołądka i t. d. w czasie
rekonwalescencyi.

Trional

Pewny
środek nasenny
w dawce 1.0—1.5
w filiżance
herbaty.

Aristol

Środek zabliznia-
jący rany oparze-
linowe, wypryski
i t. d.

Europphen

Przeciwkłowy,
szczególnie w ul-
cus molle, zamiast
jodoformu i t. d.

Notatnik

na rok

1896.

KWARTAŁ IV.

Pierwsza krajowa fabryka
opatrunków chirurgicznych
M. L. Dobrowolskiego
magistra farmacyi,
w **PODGÓRZU**, ulica Kalwaryjska,
Telefon 200

nagrodzona medalem srebrnym na Wystawie krajowej
1887 roku,

premiowana dyplomem honorowym
na Wystawie przyrodniczo-lekarskiej 1888 roku
zostająca pod kontrolą

Komisji Przemysłowej krak. Tow. lekarskiego,
polecona przez

krakowskie Towarzystwo lekarskie,
wyrabia i sterylizuje wszystkie opatrunki
antyseptyczne, a dostarcza je niżej cen
fabryk zagranicznych. Sporządza też nie-
które przetwory farmaceutyczne oraz środki
dezynfekcyjne, jak: wapno karbolowe, torf
karbolowy i sublimatowy, a oblicza je przy
hurtownym odbiorze nadzwyczaj tanio.

Cennik przesyła na żądanie.

PP. Aptekarzom, Lekarzom i Zarządcom szpi-
tali przy znacznych stałych odbiorach opa-
trunków robi specjalne niskie oferty.

PAŹDZIERNIK.

1. Czwartek.

2. Piątek.

PAŹDZIERNIK.

3. Sobota.

4. Niedziela. NMP. Różańc.

PAŹDZIERNIK.

5. Poniedziałek.

6. Wtorek.

PAŹDZIERNIK.

7. Środa.

8. Czwartek.

PAŹDZIERNIK.

9. Piątek.

10. Sobota.

PAŹDZIERNIK.

11. Niedziela.

12. Poniedziałek.

PAŹDZIERNIK.

13. Wtorek.

14. Środa.

PAŹDZIERNIK.

15. Czwartek.

16. Piątek.

PAŹDZIERNIK.

17. Sobota.

18. Niedziela.

PAŹDZIERNIK.

19. Poniedziałek.

20. Wtorek.

PAŹDZIERNIK.

21. Środa.

22. Czwartek.

PAŹDZIERNIK.

23. Piątek.

24. Sobota.

PAŹDŹIERNIK.

25. Niedziela.

26. Poniedziałek.

PAŹDZIERNIK.

27. Wtorek.

26. Środa.

PAŹDZIERNIK.

29. Czwartek.

30. Piątek.

PAŹDZIERNIK.

30. Czwartek. 31. Sobota. 30. Piątek.

LISTOPAD.

1. Niedziela. Wszystk. Święt.

2. Poniedziałek.

LISTOPAD.

3. Wtorek.

4. Środa.

LISTOPAD.

5. Czwartek.

6. Piątek.

LISTOPAD.

7. Sobota.

8. Niedziela.

LISTOPAD.

9. Poniedziałek.

10. Wtorek.

LISTOPAD.

11. Środa.

12. Czwartek.

LISTOPAD.

13. Piątek.

14. Sobota.

LISTOPAD.

15. Niedziela.

16. Poniedziałek.

LISTOPAD.

17. Wtorek.

18. Środa.

LISTOPAD.

19. Czwartek.

20. Piątek.

LISTOPAD.

21. Sobota.

22. Niedziela.

LISTOPAD.

23. Poniedziałek.

24. Wtorek.

LISTOPAD.

25. Środa.

26. Czwartek.

LISTOPAD.

27. Piątek.

28. Sobota.

LISTOPAD.

29. Niedziela.

30. Poniedziałek.

GRUDZIEŃ.

1. Wtorek.

2. Środa.

GRUDZIEŃ.

3. Czwartek.

4. Piątek.

GRUDZIEŃ.

5. Sobota.

6. Niedziela.

GRUDZIEŃ.

7. Poniedziałek.

8. Wtorek. Niep. Pocz. NPM.

GRUDZIEŃ.

9. Środa.

10. Czwartek.

GRUDZIEŃ.

11. Piątek.

12. Sobota.

GRUDZIEŃ.

13. Niedziela.

14. Poniedziałek.

GRUDZIEŃ.

15. Wtorek.

16. Środa.

GRUDZIEŃ.

13. Czwartek.

14. Piątek.

GRUDZIEŃ.

19. Sobota

20. Niedziela. 12

GRUDZIEŃ.

21. Poniedziałek.

22. Wtorek.

GRUDZIEŃ.

23. Środa.

24. Czwartek.

GRUDZIEŃ.

25. Piątek. **Boże Narodz.**

26. Sobota. **Św. Szczepana.**

GRUDZIEŃ.

27. Niedziela.

28. Poniedziałek.


GRUDZIEŃ.

28. 11. **29.** Wtorek. 2267.

29. 12. **30.** Środa. 2268.

GRUDZIEŃ.

31. Czwartek.



ADRESA.

1881. G. 1000.



Narzędzia chirurgiczne

nadające się
do gotowania, sterylizowania.

Opaski i przyrządy ortopedyczne

według najnowszych systemów.

Materyały opatrunkowe

w paczkach, sterylizowane po skoń-
czonem opakowaniu.

Opatrunki kompletne

sterylizowane aseptyczne lub
antyseptyczne (jodoform) w czterech
różnych wielkościach sporządza

c. k. nadworny dostawca

J. ODELGA

w Wiedniu, VI. Schmalzhofgasse 18.

Cenniki rozsyła się na żądanie.

Salophen

Przeciwgośćcowy
Przeciw
nerwobólom,
influenzy i t. d.



Tannigen

Środek ściągający
dla jelit
w katarach
kiszkowych i t. d.

FARBENFABRIKEN

vormals

FRIEDR. BAYER & C^o

ELBERFELD.

LYCETOL.

PIPERAZIN.

Somatoza

o wybitnej wartości odżywczej dla osób
źle odżywionych w blednicy, gruźlicy,
krzywicy, raku żołądka i t. d. w czasie
rekonwalescencyi.

Trional

Pewny
środek nasenny
w dawce 1·0—1·5
w filiżance
herbaty.

Aristol

Środek zabliźnia-
jący rany oparze-
linowe, wypryski
i t. d.

Europen

Przeciwkifowy,
szczególnie w ul-
cus molle, zamiast
jodoformu i t. d.